

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU RAWAT JALAN (Studi di RSUD dr. Soeselo dan Puskesmas Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah)

NI LUH YUNI RATNAWATI -- E2A399109
(2002 - Skripsi)

Pasien TB Paru umumnya seringkali mengalami penurunan status gizi, bahkan dapat menjadi status gizi buruk. Bila tidak diimbangi dengan diet yang tepat. Beberapa faktor yang berhubungan dengan status gizi pada pasien TB Paru adalah tingkat kecukupan energi dan protein, perilaku pasien terhadap makanan dan kesehatan, lama menderita TB paru serta pendapatan perkapita pasien. Berdasarkan pengamatan secara non-empirik, banyak pasien TB Paru yang berobat di RSUD dr. Soeselo dan Puskesmas Slawi tergolong kurus.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status gizi pasien TB Paru rawat jalan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi tersebut. Untuk mengetahui hubungan itu digunakan uji korelasi antara v. hasil penelitian adalah penelitian explanatory dengan metode adalah survei pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua pasien TB Paru rawat jalan RSUD dr. Soeselo dan Puskesmas Slawi. Sample diambil dari populasi dengan kriteria tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76,6% responden mempunyai $IMT < 18,5$ (tergolong kurus), 56,7% responden tergolong miskin (pendapatan perkapita perbulan \leq Rp. 100.000), 96,7% responden mempunyai kecukupan energi kurang, 63,3% kecukupan protein baik, 63,3% skor perilaku baik, 60% responden menderita TB Paru > 6 bulan. Faktor-faktor tingkat kecukupan energi dan protein, perilaku responden terhadap makanan dan kesehatan, lama menderita, serta pendapatan perkapita tidak berhubungan secara bermakna ($p > 0,05$) dengan status gizi responden. Faktor perilaku pasien dan pendapatan perkapita setelah dikontrol oleh tingkat kecukupan energi dan protein tidak berhubungan bermakna dengan status gizi ($p > 0,05$). Disarankan untuk lebih menggalakkan penyuluhan gizi dan kesehatan untuk mendukung perbaikan status gizi baik pasien TB Paru serta melakukan penelitian lain untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pada pasien.

Kata Kunci: status gizi, tuberculosi paru