

**Program Studi Ilmu Keperawatan  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Diponegoro  
Riset Keperawatan, Maret 2010**

## **ABSTRAK**

**Fitriani Nur**

**Konsep Diri Ibu Dengan *Mola Hidatidosa* Pasca Kuretase Di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang**

**xiii + 73 halaman + 3 tabel + 2 gambar + 5 lampiran**

*Mola hidatidosa* merupakan kehamilan yang abnormal yang disebut dengan hamil anggur. *Mola hidatidosa* terjadi pada ibu dengan rentang usia 15 – 44 tahun. Penanganan *mola hidatidosa* dengan tindakan histerektomi dan tindakan kuretase. Pasca tindakan kuretase, muncul perubahan-perubahan konsep diri yang mengarah kepada konsep diri yang negatif maupun positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri pada ibu dengan *mola hidatidosa* pasca tindakan kuretase.

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan melibatkan 3 ibu sebagai informan. Pengambilan data dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada ibu dengan *mola hidatidosa* pasca kuretase mangalami stres yang bersumber dari perilaku suami, perasaan ibu, dan kesiapan memberitahukan kondisinya. Ibu *mola hidatidosa* pasca kuretase juga membutuhkan sumber dukungan dari suami, keluarga dan tetangga. Terjadinya perubahan konsep diri pada ibu dari konsep diri yang positif mengarah ke konsep diri negatif dan ibu juga memiliki mekanisme coping baik secara mental maupun fisik.

**Kata kunci : konsep diri, mola hidatidosa, kuretase**

**Daftar Pustaka : 33 (1993- 2010)**

**School of Nursing  
Medical school  
Diponegoro University  
Nursing Research, March 2010**

## **ABSTRACT**

**Fitriani Nur**

**Mother Self Concept with *Mola Hidatidosa* Post-Curettage in Ungaran Hospital Semarang Regency**

**xiii + 73 pages + 3 tables + 2 images + 5 appendixes**

*Mola hidatidosa* is an abnormal pregnancy which is known as grape pregnancy. It occurs in women with age of 15 - 44 years old. *Mola hidatidosa* is taken care of by hysterectomy and curettage actions. After curettage action, changes on self-concept that lead to positive and negative self-concept may occur. This research aimed to reveal the self concepts in women with *Mola hidatidosa* after curretage actions. The research used a qualitative method with phenomenological approach and involved three mothers as samples. The data were collected using purposive sampling technique. The results from the study showed that mothers with *mola hidatidosa* after curettage action experienced stress which resourced from their husband behaviours, mother's feeling and readiness of informing the condition. They also needed supports from their husband, family and neighbours. Self concept of mothers experienced changes from positive to negative self concept. Mother also had good physical and mental coping mechanisms.

**Keywords:** self-concept, *mola hidatidosa*, curettage

**Bibliography:** 33 (1993 - 2010)