

## **Diatom dan Paleolimnologi: Studi Komparasi Perjalanan Sejarah Danau Lac Saint-Augustine Quebec-City, Canada dan Danau Rawa Pening Indonesia**

**Diatom and Paleolimnology: Comparison Study of Historical Lakes Lac Saint-Augustine Quebec-City, Canada and Rawa Pening Indonesia**

**Tri Retnaningsih Soeprbowati<sup>1\*</sup> dan Suwarno Hadisusanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Diponegoro, Tembalang, Jl Prof. Soedarto. SH, Tembalang, Semarang  
E-mail: trsoeprbowati@yahoo.co.id \*Penulis untuk korespondensi*

<sup>2</sup>*Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

### **Abstract**

**Diatoms are a micro-alga dominates in the aquatic ecosystem. Their silicious cell wall able to preserve death diatoms in the sediment for long periods of time, therefore, diatoms have an important role in the paleolimnological analysis. Diatoms assemblages in the sediment layer express the water quality whenever the diatom lives. This article provides information how to apply diatom on the paleo-limnological analysis, supporting with the case study in the Lac Saint-Augustine Quebec-City Canada and Rawa Pening Lake Indonesia. Modern diatom and the water quality from spatial and temporal range are used as a calibration set. The diatoms of below layers, then, Weighted Averaging (WA) with the calibration set to reconstruct the water quality in the past. Previously, both in Canada and Indonesia, those lakes were oligotrophic and sharply change into eutrophic condition since a lot of human activities developed around the lakes (anthropogenic factors). Naturally, the maturity of lake can not avoid and the succession had been fast by eutrophication. Paleolimnological approach provides baseline data in the past to develop the appropriate lake management.**

**Key words: diatoms, paleolimnology, eutrophication**

Diterima: 29 Juli 2008, disetujui: 12 Januari 2009

### **Pendahuluan**

Diatom merupakan mikroalga uniseluler yang distribusinya sangat universal di semua tipe perairan. Diatom merupakan penyusun utama fitoplankton baik di ekosistem perairan tawar maupun laut dengan jumlah spesies terbesar dibandingkan komunitas mikroalga lainnya. Diatom mempunyai kontribusi 40 - 45% produktivitas laut sehingga lebih produktif dibandingkan dengan hutan hujan di seluruh dunia. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila diatom mempunyai peranan yang sangat penting dalam siklus silika dan karbon di alam sehingga kesinambungan perikanan

terjaga (Mann, 1999). Saat ini diketahui lebih dari 260 genus diatom hidup dengan lebih dari 100.000 spesies (Round *et al.*, 2000).

Diatom mempunyai keunikan dan sangat spesifik, karena arsitektur dan anatomi dinding selnya yang tersusun dari silika, menyebabkannya dapat tersimpan dalam kurun waktu yang sangat lama di dalam sedimen.

Penelitian diatom berkembang sangat pesat dimulai tahun 1703 ketika mikroskop ditemukan, hingga ketika Battarbee (1986) menyatakan potensi diatom sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Sejak tahun 1990-an penelitian tentang diatom sebagai bioindikator kualitas perairan banyak dilakukan

di berbagai negara hingga aplikasinya dalam paleorekonstruksi perubahan lingkungan. Hal ini seiring dengan perkembangan implementasi analisis statistik multivariat untuk analisis paleorekonstruksi (Smol, 1990).

Potensi diatom sebagai bioindikator lebih baik dibandingkan dengan kelompok organisme yang lainnya. Keunggulan tersebut karena distribusi luas, populasi variatif, penting dalam rantai makanan, dijumpai di hampir semua permukaan substrat (mampu merekam sejarah habitat), siklus hidup pendek dan reproduksi cepat, banyak spesies sensitif terhadap perubahan lingkungan, mampu merefleksikan perubahan kualitas air dalam jangka pendek dan panjang, mudah pencuplikan; pengelolaan dan identifikasinya (Gell *et al.*, 1999; Round *et al.*, 2000). Hal tersebut di atas memberi nilai tambah potensi diatom untuk biomonitoring ekosistem akuatik yang telah dikenal di seluruh dunia (John, 2000). Pemanfaatan diatom sebagai bioindikator perairan telah banyak diimplementasikan. Potensi diatom sebagai bioindikator banyak digunakan pada kegiatan paleorekonstruksi perubahan lingkungan. Pada mulanya digunakan foraminifera karena dinding selnya tersusun dari karbonat yang dapat memfosil. Tetapi foraminifera hanya dijumpai pada habitat laut sampai perairan payau sehingga tidak dapat diimplementasikan untuk perairan tawar (Soeprbowati *et al.*, 2000). Demikian juga Radiolaria ber dinding sel dari silika yang dapat memfosil, tetapi habitatnya pada laut dalam (Haslett, 2002).

Diatom telah digunakan untuk merekonstruksi gempa bumi yang telah menginduksi tsunami 300 tahun lalu yang terjadi di pantai Selatan Washington. Diatom juga telah diaplikasikan dalam analisis paleoekologi di Everglades National Park, Florida Bay, USA (Pyle *et al.*, 1998); analisis paleoekologi di Ealden Pond Massachusetts, USA, Danau Lac Saint Augustine di Quebec-City Canada (Pienitz *et al.*, 2006).

Paleolimnologi merupakan ilmu perairan tawar yang fokus pada interpretasi sekuen per lapisan sedimen dan proses diagenetik yang dapat mengubah rekaman tersebut. Tujuan kajian paleolimnologi adalah untuk memperoleh gambaran kondisi, perubahan

parameter, produktivitas di masa lampau (Wetzel, 2001). Paleolimnologi termasuk ilmu multidisiplin karena memanfaatkan informasi fisik, kimia dan biologi yang tersimpan di dalam profil sedimen untuk kegiatan rekonstruksi kondisi lingkungan di masa lampau khususnya perairan darat. Lebih luas lagi, paleolimnologi mengkaji tentang perubahan jangka panjang pada geomorfologi basin danau (Smoll, 2008). Pendekatan paleolimnologi sangat penting karena sangat efektif untuk menjawab permasalahan kualitas air. Dengan mengetahui kualitas perairan di masa lampau dapat memprediksi kualitas perairan di masa mendatang. Sejarah tidak hanya sekedar menceritakan kembali masa lampau, tetapi juga mempunyai makna yang lebih dalam sebagai pengingat dan pemeringat. Oleh karena itu maka paleolimnologi merupakan ilmu yang mempelajari masa lampau untuk menemukan masa depan dengan mempelajari sejarah karakteristik dan sifat perairan tawar, meliputi fisik, kimia, biologi, geografi, dan hidrologi yang tersimpan dalam inti sedimen.

Bioindikator untuk rekonstruksi harus organisme yang memiliki dinding sel yang tidak terdegradasi pada saat organisme mati dan mengendap. Permasalahan muncul, bagaimana diatom yang tersimpan dalam per lapisan sedimen mampu mengungkap perjalanan sejarah danau?

Permasalahan tersebut akan terjawab dalam artikel ini karena disusun dengan tujuan memberikan informasi peranan diatom dalam paleolimnologi, khususnya dalam mengungkap perubahan kualitas perairan danau dalam perjalanan waktu. Naskah ini mengungkap fakta tersebut dilengkapi dengan studi komparasi aplikasi diatom dalam analisis paleolimnologi dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem lentik khususnya di Danau Lac Saint-Augustine (Canada) yang dilakukan oleh Pienitz *et al.*, (2006), yang memiliki kesamaan dengan danau di Indonesia yang ada di daerah sub urban seperti Danau Rawa Pening. Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mendasar yang dibutuhkan oleh pengelola dan peneliti perairan sebagai landasan preservasi dan restorasi pengelolaan danau.

## Metode Penelitian

Bahan yang digunakan adalah hasil penelitian diatom di Danau Rawa Pening (Indonesia) dan danau subtropis (Canada). Metode yang digunakan dalam kajian ini membandingkan kondisi danau di daerah sub-urban Canada dan Indonesia. Data diatom dan kualitas air di Danau Lac Saint-Augustine Quebec Canada berasal dari Pienitzs *et al.*, (2006), dan Danau Rawa Pening (Jawa Tengah) diambil dari data Soeprbowati *et al.*, (2005). Perbandingan dilakukan secara deskriptif kualitatif, meskipun datanya adalah kuantitatif.

## Hasil dan Pembahasan

Analisis paleolimnologi pada umumnya dilakukan berdasarkan pengkajian informasi aspek biologi, kimia dan fisika yang terekam dalam sedimen. Kehandalan diatom sebagai bioindikator perubahan lingkungan mampu memberikan bukti bahwa aktivitas manusia merupakan faktor dominan yang menyebabkan adanya perubahan tersebut. Kualitas air di Danau Lac Saint-Augustine (Canada) mengalami deteriorasi serius, maka diambil kebijakan larangan olah raga air di danau ini pada musim panas seiring problem *cyanobacteria bloom*. Penelitian yang dilakukan Pienitz *et al.*, (2006) mengungkapkan bahwa sebelum ada aktivitas manusia danau dalam kondisi oligotrofik, namun kemudian menjadi sangat eutrofik sampai kini. Untuk mendeterminasi penyebab eutrofikasi maka dilakukan analisis fosil diatom, pigmentasi, geokimia yang digunakan sebagai indikator kualitas air, dan rekonstruksi kecenderungan konsentrasi P-total.

Eutrofikasi menjadi problem perairan yang muncul seiring dengan perkembangan pertanian, industri dan urbanisasi. Hal ini dapat terjadi di perairan manapun. Problem menjadi semakin serius apabila terjadi di ekosistem lentik (tergenang) seperti danau dan waduk karena waktu tinggal bahan pencemar dan masa pemulihan di danau lebih lama dibandingkan di ekosistem lotik (mengalir). Problem serupa juga banyak terjadi di Indonesia. Laju

eutrofikasi meningkat dengan pesat di ekosistem perairan lentik di seluruh Indonesia yang cenderung membuat pendangkalan danau.

Paleolimnologi danau cukup dalam dan tidak terganggu oleh manusia dapat membuktikan bahwa danau dapat berubah dari oligotrofik menjadi mesotrofik dan kemudian eutrofik. Kondisi ini dapat kembali dari eutrofik menjadi mesotrofik dan oligotrofik. Siklus ini dapat terjadi berulang-ulang berkaitan dengan perubahan iklim regional (Horne dan Goldman, 1994). Pendekatan paleolimnologi dapat digunakan untuk mengkaji respon ekosistem danau terhadap reduksi nutrien (Battarbee *et al.*, 2005). Hasil penelitian paleolimnologi dapat memberikan bukti bahwa banyak danau yang sangat dipengaruhi masukan nutrien, namun kebanyakan badan air secara alami merupakan perairan yang produktif, bahkan sebelum intervensi manusia (Smol, 2008).

Dalam analisis paleolimnologi, diperlukan informasi mengenai luas daerah tangkapan, *renewal time*, luas danau, kedalaman, kualitas air saat ini, dan kandungan klorofil. Data pendukung lain di Danau Lac Saint-Augustine juga diperlukan seperti dinamika populasi dan *land use* selama kurun lebih dari 100 tahun, sehingga dapat diketahui bahwa kenaikan populasi penduduk yang pesat sejak 1960 dan pembangunan *highway* pada 1977 berdampak pada eksplosif demografi. Hal tersebut didukung oleh foto udara pada 1937, 1953, 1987, dan 2002, sehingga perubahan *land-use* dapat diketahui secara cermat. Data base yang penting bagi pengelolaan wilayah seperti ini yang belum dimiliki oleh banyak ekosistem perairan di Indonesia.

Rekonstruksi perubahan lingkungan oleh faktor antropogenik dapat dilakukan melalui 8 tahapan: 1) Penentuan lokasi penelitian berdasarkan permasalahan yang spesifik pada lokasi tersebut. 2) Penentuan lokasi sampling harus representatif. 3) Pengambilan sampel sedimen pada lokasi terdalam dari danau yang mewakili profil perubahan danau. 4) Sub-seksi sampel sedimen dengan interval tertentu untuk keperluan digesti dan preparasi diatom. 5) *Radioactive dating* profil sedimen untuk mengetahui kronologinya. 6) Identifikasi dan penghitungan diatom pada tiap lapisan sedimen


dilakukan dengan menggunakan mikroskop. 7) Interpretasi data untuk pengkajian lingkungan. 8) Aplikasi model kalibrasi terhadap lingkungan sehingga dapat diperoleh informasi kondisi lingkungan pada masa sekarang dan masa lampau (Gambar 1).

Untuk kasus di Danau Lac Saint-Augustine, pencuplikan sedimen dengan corer sedalam 75 cm pada situs danau yang memiliki kedalaman maksimal yaitu 6,1 m. Sampel sedimen setebal 76 cm kemudian disubseksi dengan interval 0,5 cm untuk sampel 0 – 30 cm dan interval 1 cm untuk sampel 35 - 76 cm. Di Danau Rawa Pening pencuplikan dilakukan dengan *core barrel* yang dimodifikasi sedalam 30 cm pada lokasi dekat *inlet* danau. Sampel sedimen di sub-seksi 2 cm (Soeprbowati *et al.*, 2005).

Korelasi dikerjakan antara diatom modern (lapisan atas) dan kualitas lingkungan (kasus eutrofikasi berdasar N- dan P-total perairan). Rekonstruksi konsentrasi P-total pada lapisan bawah dilakukan oleh Pienitzs *et al.*, (2006) dengan membandingkan diatom modern - dari 81 danau dari negara bagian New England yang telah diukur kandungan P-total pada tahun 1991 dan 1994 dengan fosil diatom

yang diperoleh dari penelitian. *Diatom based inference model* untuk merekonstruksi kandungan P-total berdasarkan fosil diatom secara *Weighted Averaging partial least squares regression techniques*. Analogi derajat keasaman antara modern (kalibrasi) dan fosil (*core*) diuji dengan Program ANALOG. Apabila sampel fosil memiliki koefisien dissimilaritas < 75% berarti bagus, antara 75 – 90% kurang bagus dan yang lebih besar dari 95% tidak ada analogi. Selanjutnya dengan program CANOCO (*Canonical Correspondence Analysis*) untuk mengetahui ketepatan fosil untuk rekonstruksi variabel.


WA (*Weighted Averaging*) adalah proses fungsi transfer untuk estimasi kualitas air atau kimia air berdasarkan diatom (Koster *et al.*, 2004). Secara prinsip takson tertentu akan melimpah pada kondisi optimum untuk regenerasi dan nilai optimum variabel lingkungan dihitung mengacu rerata konsentrasi tiap lokasi. Tiap nilai variabel di *weighted*-kan dengan kelimpahan jenis diatom. Estimasi konsentrasi variabel berdasarkan fosil diatom di lapisan sedimen dilakukan inversi dari persamaan WA-nya.



**Gambar 1.** Pendekatan paleolimnologi untuk kajian rekonstruksi perubahan lingkungan (Smol, 2008).

Berdasar hasil analisis profil diatom, maka sampel Pienitzs *et al.*, (2006) dapat dibagi tiga zona yang merupakan kecenderungan kondisi geofisik-kimia yang konsisten dengan periode sejarah dan aktivitas manusia di daerah tangkapan danau. Zona-1 merupakan periode sebelum/awal pengembangan pemukiman dan rekonstruksi kanal (1670 – 1750). Zona ini dapat dibagi menjadi dua sub-zona yaitu 1-a merupakan representasi periode sebelum dan awal kolonial dan 1-b merupakan periode konstruksi kanal (1748). Zona-1 terbentuk pada saat kondisi perairan oligo-mesotrofik dengan indikator diatom, konsentrasi pigmen, *diatom-infered* konsentrasi P-total dan elemen kimia lainnya.

Diatom pada zona ini adalah jenis yang mengindikasikan kondisi perairan oligo- dan mesotrofik antara lain: *A. alpigena*; *A. ambigua*; *A. perglabra*; *Tabellaria flocculosa* dan *F. cappucina* (Gambar 2.). *A. ambigua* dijumpai pada perairan mesotropik di Amerika Serikat dengan konsentrasi P 8 – 39µg /L (Diatom Paleolimnology Data Coop, 2003). Konsentrasi diatom rendah pada zona-1, menunjukkan perairan kurang produktif dan pelarutan materi anorganik allokhonus dominan. Hal ini didukung oleh rendahnya *diatom-infered* konsentrasi klorofil-a dan karotenoid (Gambar 3).



**Gambar 2.** Stratigrafi perubahan komposisi kumpulan diatom yang tersimpan dalam inti danau LacSaint-Augustine (Pienitzs *et al.*, 2006).