

BEBERAPA FAKTOR RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE
PADA BALITA DI DESA BEJI KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN
BANJARNEGARA

RISTIYONO -- E2A302150
(2004 - Skripsi)

Direktorat Jendral pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan Depkes RI menyatakan bahwa tiap 15 menit orang terkena diare akibat minum air yang tidak sehat dan mengandung bakteri yang berbahaya. Berdasarkan data Depkes RI sebanyak 43,7% penderita yaitu anak balita. Hal tersebut menunjukkan *proporsi rate* tinggi yang dapat berakibat buruk pada kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui beberapa faktor risiko baik lingkungan maupun perilaku dengan kejadian diare pada balita di Desa Beji Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan *cross sectional* melalui metoda survey. Pengambilan sampel dilakukan pada populasi kepala keluarga yang mempunyai balita yang dipilih secara random, sedang sebagai responden adalah ibu balita. Untuk mengetahui hubungan variabel-variabel tersebut dilakukan uji statistik *Chi Square* dengan CI 95% ($\alpha=5\%$) yang diolah dengan program SPSS menghasilkan sebagai berikut bahwa faktor yang memiliki hubungan dengan kejadian diare adalah kebiasaan mencuci tangan sebelum menyusui ($X^2=5,820$, $p=0,016$, $RP=0,233$, $CI95\%=0,077-0,704$), kebiasaan mencuci tangan sebelum menyuapi ($X^2=5,820$, $p=0,016$, $RP=0,233$, $CI95\%=0,077-0,704$), kebiasaan merebus air ($X^2=4,597$, $p=0,032$, $RP=0,291$, $CI95\%=0,104-0,817$) dan pemberian ASI eksklusif ($X^2=4,619$, $p=0,032$, $RP=0,317$, $CI95\%=0,108-0,925$).

Oleh karena itu, untuk ibu-ibu agar selalu memperhatikan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan selalu mencuci tangan secara benar sebelum menyusui, menyuapi, memegang makanan serta sesudah buang air besar. Disamping itu pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 4 bulan, serta kepada seluruh masyarakat Desa Beji untuk selalu memperhatikan kesehatan lingkungan terutama kebiasaan buang air besar di jamban yang sehat dan selalu memperhatikan dan mengawasi balitanya karena kondisi lingkungan pencemaran kotoran hewan piaraan seperti kambing dan sapi.

Kata Kunci: Diare, faktor lingkungan, faktor perilaku, balita

*RISK FAKTORS RELATED TO THE OCCURENCE OF DIARRHEA ON CHILDREN
UNDER FIVE YEARS OLD AT THE BEJI VILLAGE KALIBENING SUBDISTRICT
BAJARNEGARA DISTRICT*

Directorate general contagion eradication and health of Department RI environmental express that every 15 minute hit by diarrhea effect of pregnant and indisponed water for drinking of dangerous bacterium. Pursuant to data counted 43,7% patient that is balita child. The mentioned show high rate proportion able to cause worst at quality of human resource in the future. Target of the research to know some good risk factor of behavior and also environment with occurence of diarrhea a balita in Contryside Beji district of Kalibening Sub-Province Banjarnegara.

This type research is analytic research with approach of cross sectional through survey method. Intake of sample done at family head population having selected balita by random, as responder is balita mother.

To know the variable relation by statistical test of chi square with CI 95% (alfa=5%)processed with SPSS program yield as follows, that queer factor of relation with occurence of diarrhea is habbit clean hand before suckling ($X^2=5,820$, $p=0,016$, $RP=0,233$, $CI95\%=0,077-0,704$), habit clean hand before ($X^2=5,820$, $p=0,016$, $RP=0,233$, $CI95\%=0,077-0,704$), habit braise water ($X^2=4,597$, $p=0,032$, $RP=0,291$, $CI95\%=0,104-0,817$) and giving exclusive ASI ($X^2=4,619$, $p=0,032$, $RP=0,317$, $CI95\%=0,108-0,925$).

Therefore, for the mother of to be always pay attention and apply healthy and clean life behavior (PHBS) always clean hand real correctly before suckling, feeding up, handing food and also after defecation. Beside that giving of exclusive ASI until baby old age 4 months and also to entire Beji countryside society to always to pay attention environmental health especially habit defecate in healthy latrine and always pay attention and observing it. Its because condition of environment contamination of concubine animal dirt like ox and goat.

Keyword : Diarrhea, environmental factor, behavioral factor, children under five year old