



### BAB III

#### KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

##### III.1. KERANGKA TEORI



### III.2. KERANGKA KONSEP



### **III.3. Hipotesis mayor :**

Angka kejadian diare berulang pada anak umur 6-24 bulan yang mendapat suplementasi seng dan probiotik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan lebih sedikit di banding yang mendapat terapi baku.

### **III.4. Hipotesis minor :**

1. Angka kejadian diare cair akut berulang anak umur 6-24 bulan yang mendapat terapi baku ditambah suplementasi seng lebih sedikit dibanding yang mendapat terapi baku, pada bulan pertama, kedua dan ketiga setelah suplementasi.
2. Angka kejadian diare cair akut berulang anak umur 6-24 bulan yang mendapat terapi baku ditambah suplementasi probiotik lebih sedikit dibanding yang mendapat terapi baku, pada bulan pertama, kedua dan ketiga setelah suplementasi .
3. Angka kejadian diare cair akut berulang anak umur 6-24 bulan yang mendapat terapi baku ditambah suplementasi seng dan probiotik secara bersamaan lebih sedikit dibanding yang mendapat terapi baku, pada bulan pertama, kedua dan ketiga setelah suplementasi .