BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1. SIMPULAN

1. Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum merupakan faktor risiko terjadinya gangguan perkembangan neurologis anak.
2. Waktu timbulnya Gangguan perkembangan neurologis (metode pemeriksaan *BINS*) oleh karena Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum dapat diketahui saat usia 5 sampai 6 bulan.
3. Lama kejang lebih dari 30 menit pada Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum berhubungan dengan terjadinya gangguan perkembangan neurologis anak.
4. Awitan kejang kurang dari 12 jam pada Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum berhubungan dengan terjadinya gangguan perkembangan neurologis anak.
5. Status gizi pada Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum berhubungan dengan terjadinya gangguan perkembangan neurologis anak.

7.2. SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam skala yang lebih besar untuk mendapatkan gambaran gangguan perkembangan neurologis bayi secara dini dengan riwayat Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum dengan menggunakan pemeriksaan *Bayley Infant Neurodevelopmental*

Screeener (BINS), sehingga dengan waktu pengamatan yang lebih panjang (2 tahun) akan mendapatkan akurasi hasil yang lebih baik.

2. Perlu dilakukan penelitian *follow up* jangka panjang pengaruh Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum terhadap lingkaran kepala.