

## BAB 6

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Simpulan.

- 6.1.1. Terdapat perubahan jumlah neutrofil absolut darah tepi pada pasien stroke iskemik akut
- 6.1.2. Terhadap skor NIHSS jumlah neutrofil absolut darah tepi merupakan indikator keluaran pasien stroke iskemik akut pada jam ke 10-72 onset, 7 hari onset maupun kemajuan skor NIHSS antara jam ke 10-72 onset sampai 7 hari onset
- 6.1.3. Terhadap klinis jumlah neutrofil absolut darah tepi merupakan indikator kuat keluaran pasien stroke iskemik akut pada jam ke 10-72 onset dan 7 hari onset akan tetapi tidak merupakan indikator kemajuan klinis antara jam ke 10-72 onset sampai 7 hari onset
- 6.1.4. Jumlah neutrofil absolut darah tepi yang merupakan titik balik menurunnya perburukan skor NIHSS antara jam ke 10-72 onset sampai 7 hari onset adalah 4850 / $\mu$ L

#### 6.2. Saran

- 6.2.1. Para klinisi terutama yang berada ditempat dengan sarana kesehatan yang terbatas hendaknya mewaspadaai terjadinya keluaran yang buruk pada pasien stroke iskemik akut dengan jumlah neutrofil absolut darah tepi  $\geq 4850$  / $\mu$ L.
- 6.2.2. Pada pasien stroke iskemik akut dengan jumlah neutrofil absolut darah tepi  $\geq 4850$  / $\mu$ L perlu diberikan penjelasan kepada keluarga pasien tentang kemungkinan prognosis pasien yang memburuk.
- 6.2.3. Dibutuhkan pemeriksaan lebih lain untuk meningkatkan akurasi indikator keluaran stroke iskemik akut