

VII. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian ekstrak tembakau kunyah secara oral dengan kadar 30 gr/1.000 ml atau kurang selama 14 hari berturut-turut tidak menyebabkan kerusakan struktural (mikroanatomi) pada intestinum marmut. Tetapi pada kadar 15 gr/1.000 ml atau lebih menyebabkan terjadinya atropi nukleus sel epithelium intestinum.
2. Pemberian ekstrak tembakau kunyah selama 14 hari berturut-turut dengan kadar 30 gr/1.000 ml atau kurang tidak menyebabkan perubahan yang nyata pada status darah marmut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemberian ekstrak tembakau kunyah dengan kadar 30 gr/1.000 ml dapat menyebabkan terjadinya atropi nukleus sel epithelium intestinum. Jika kadar ekstrak tembakau kunyah yang digunakan ditingkatkan atau waktu pemakaiannya diperpanjang kemungkinan dapat menyebabkan kerusakan mikroanatomi intestinum. Oleh sebab itu disarankan untuk menghindari pemakaian tembakau kunyah secara berlebihan.