

VII. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung limbah udang pada pakan sebanyak dan bungkil kedelai pada pakan sebanyak 15% mampu meningkatkan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit ayam.

Penambahan tepung limbah udang sebanyak 5% dan 10% telah meningkatkan kadar hemoglobin dan nilai hematokrit ayam, tetapi tidak demikian halnya dengan penambahan 5% dan 10% bungkil kedelai pada pakan.

Status darah ayam yang diberi penambahan tepung limbah udang pada pakannya adalah lebih baik dibandingkan status darah ayam yang diberi penambahan bungkil kedelai pada pakannya.

B. Saran

Penggunaan tepung limbah udang dan bungkil kedelai sebagai tambahan protein pada pakan masing-masing sudah dapat dilakukan pada kadar 5% dan 15%.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai kedua limbah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan asam-asam amino dalam kedua bahan limbah tersebut.