

VII. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Furadan 3G tidak berpengaruh terhadap jumlah bintil akar, berat basah bintil akar dan persentase bintil akar efektif. Furadan 3G pada dosis 0,125 gr/tan. sudah menurunkan berat kering bintil akar.
2. Furadan 3G tidak berpengaruh terhadap berat kering tanaman. Furadan 3G pada dosis 0,169 gr/tan menurunkan tinggi tanaman.
3. Goal 2E tidak berpengaruh terhadap jumlah bintil akar, berat basah bintil akar dan persentase bintil akar efektif. Goal 2E pada dosis 0,005 ml sudah menurunkan berat kering bintil akar.
4. Goal 2E pada dosis 0,005 ml sudah menurunkan berat kering tanaman dan tinggi tanaman.

B Saran

Perlu dilakukan penelitian pengaruh insektisida dan herbisida yang lain terhadap status bintil akar dan pertumbuhan vegetatif kacang tanah, sehingga dapat diketahui dengan jelas jenis insektisida dan herbisida yang memberikan pengaruh paling besar terhadap status bintil akar dan pertumbuhan vegetatif kacang tanah. Disamping itu perlu dilakukan penelitian pengaruh insektisida dan herbisida terhadap produksi polong.