

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

1. Didapatkan jenis alergen terbanyak pada asma, rinitis alergik dan dermatitis atopik adalah tungau debu rumah namun secara statistik tidak bermakna.
2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis alergi (asma, rinitis alergik dan dermatitis atopik) dengan kadar IgE spesifik tungau debu rumah pada anak usia 6-7 tahun.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis alergi (asma, rinitis alergik dan dermatitis atopik) dengan kadar IgE spesifik kecoa pada anak usia 6-7 tahun.
4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis alergi (asma, rinitis alergik dan dermatitis atopik) dengan kadar IgE putih telur rumah pada anak usia 6-7 tahun.

6.2. Saran

1. Penelitian selanjutnya diperlukan jumlah sampel yang lebih besar dan sama pada jenis penyakit alergi.
2. Pengambilan sampling darah dilakukan saat mengalami gejala alergi.
3. Penelitian selanjutnya ditambahkan pemeriksaan dari jenis alergen yaitu : bulu kucing dan anjing, kepiting, susu sapi dan jamur.