

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1. Karakteristik subyek penelitian.

Selama periode penelitian dijumpai 35 anak yang dirawat di bangsal gastroenterohepatologi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Karakteristik subjek penelitian ditampilkan pada tabel 1:

Tabel 1. Karakteristik subjek penelitian (n=35).

Deskripsi	n (%)	Rerata ± SB
Jenis kelamin:		
Laki-laki	20 (57,1)	-
Perempuan	15 (42,9)	-
Umur anak (bulan)	-	10,1 ± 4,18
Status imunisasi:		
Lengkap	34 (97,1)	-
Tidak lengkap	1 (2,9)	-
Umur ayah (tahun)	-	29,3 ± 5,36
Pendidikan ayah:		
SD	1 (2,9)	-
SMP	6 (17,1)	-
SMA/SMK/STM	28 (80,0)	-
Pekerjaan ayah:		
Pegawai	18 (51,4)	-
Buruh/buruh tani	6 (17,1)	-
Petani	3 (8,6)	-
Montir	2 (5,7)	-
Supir	2 (5,7)	-
Petugas keamanan	2 (5,7)	-
Wiraswasta	1 (2,9)	-
Tidak bekerja	1 (2,9)	-
Umur ibu (tahun)	-	26,7 ± 4,65
Pendidikan ibu:		
SD	3 (8,6)	-
SMP	6 (17,1)	-
SMA/SMK/SMEA	26 (74,3)	-
Pekerjaan ibu:		
Ibu Rumah Tangga	25 (71,4)	-
Buruh	1 (2,9)	-
Pegawai	6 (17,1)	-
Pedagang	3 (8,6)	-
Jumlah balita dalam keluarga:		
1	23 (65,7)	-
2	12 (34,3)	-
Status sosial ekonomi	-	18,6 ± 1,91
Jumlah frekuensi rawat/bln	-	1,2 ± 0,66
Jumlah KRS/bln	-	1,25 ± 0,76

Jenis kelamin subjek penelitian pada tabel 1 sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebanyak 20 anak (57,1%). Rerata umur subjek penelitian adalah $10,1 \pm 4,18$ bulan dengan umur termuda adalah 6 bulan dan tertua adalah 24 bulan. Berdasarkan status imunisasi dijumpai sebagian besar subjek penelitian mempunyai status imunisasi lengkap sesuai umur (97,1%), sedangkan yang mempunyai status imunisasi tidak lengkap hanya 1 anak (2,9%). Ayah subjek penelitian sebagian besar berumur 29 tahun dengan umur termuda adalah 24 tahun dan tertua adalah 34 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir ayah subjek sebagian besar berpendidikan setingkat SMA/SMK/STM (80,0%), sebagian berpendidikan setingkat SMP (17,1%), dan yang berpendidikan setingkat SD hanya 1 orang (2,9%). Berdasarkan pekerjaan ayah subjek, sebagian besar bekerja sebagai pegawai (54%) dan hanya 1 orang ayah subjek yang tidak bekerja (2,9%). Ibu subjek penelitian sebagian besar berumur 26 tahun dengan umur termuda adalah 22 tahun dan tertua adalah 30 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir ibu subjek dijumpai sebagian besar ibu subjek berpendidikan setingkat SMA/SMK/STM (74,3%), sebagian berpendidikan setingkat SMP (17,1%), dan yang berpendidikan setingkat SD berjumlah 3 orang (8,6%). Berdasarkan pekerjaan ibu subjek, sebagian besar merupakan ibu rumah tangga (71,4%) dan hanya 1 orang ibu yang bekerja sebagai buruh (2,9%). Berdasarkan jumlah balita dalam keluarga, 23 keluarga subjek mempunyai 1 balita dalam keluarga (65,7%) dan 12 keluarga subjek mempunyai 2 balita dalam keluarga (34,3%). Rerata status sosial ekonomi keluarga subjek penelitian adalah $18,6 \pm 1,91$. Rerata jumlah frekuensi rawat dalam 1 bulan pada subjek penelitian adalah $1,2 \pm 0,66$ kali per bulan, sedangkan rerata untuk jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan dalam 1 bulan pada subjek penelitian adalah $1,25 \pm 0,76$ kali per bulan.

5.2. Jawaban responden penelitian.

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengetahuan ditampilkan pada tabel 2 :

Tabel 2. Tabulasi jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengetahuan (n=35).

No. Pertanyaan	n (%)	
	Salah	Benar
1	0 (0,0)	35 (100,0)
2	10 (28,6)	25 (71,4)
3	0 (0,0)	35 (100,0)
4	1 (2,9)	34 (97,1)
5	4 (11,4)	31 (88,6)
6	20 (57,1)	15 (42,9)
7	0 (0,0)	35 (100,0)
8	3 (8,6)	32 (91,4)
9	3 (8,6)	32 (91,4)
10	22 (62,9)	13 (37,1)
11	3 (8,6)	32 (91,4)
12	17 (48,6)	18 (51,4)
13	5 (14,3)	30 (85,7)
14	9 (25,7)	26 (74,3)
15	13 (37,1)	22 (62,9)

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengetahuan, nomor pertanyaan satu, tiga dan tujuh (ASI, makanan pendamping ASI, cuci tangan) sebanyak 35 responden menjawab benar (100%) dan tidak ada yang menjawab salah (0%), pada pertanyaan nomor sepuluh hanya (penggunaan jamban dan air bersih) 13 responden menjawab benar (37,1%) sedangkan sebanyak 22 responden lainnya menjawab salah (62,9%).

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang sikap ditampilkan pada tabel 3 :

Tabel 3. Tabulasi jawaban responden terhadap pertanyaan tentang sikap (n=35).

No. Pertanyaan	n (%)	
	Tidak Setuju	Setuju
1	0 (0,0)	35 (0,0)
2	0 (0,0)	35 (0,0)
3	1 (2,9)	34 (97,1)
4	3 (8,6)	32 (91,4)
5	23 (65,7)	12 (34,3)
6	3 (8,6)	32 (91,4)
7	2 (5,7)	33 (94,3)
8	5 (14,3)	30 (85,7)
9	7 (20,0)	28 (80,0)
10	9 (25,7)	26 (74,3)
11	10 (28,6)	25 (71,4)
12	16 (45,7)	19 (54,3)
13	16 (45,7)	19 (54,3)
14	9 (25,7)	26 (74,3)
15	13 (37,1)	22 (62,9)

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang sikap, nomor pertanyaan satu dan dua (imunisasi dan dampak gangguan gizi pada balita) sebanyak 35 responden menjawab benar (100%) dan tidak ada yang menjawab salah (0%), pada pertanyaan nomor lima (pemberian air buah), hanya 12 responden yang menjawab benar (34,3%), sedangkan 23 responden lainnya menjawab salah (65,7%).

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang praktek ditampilkan pada tabel 4 :

Tabel 4. Tabulasi jawaban responden terhadap pertanyaan tentang praktek (n=35).

No. Pertanyaan	n (%)			
	Tidak pernah	Jarang	Sering	Selalu
1	0 (0,0)	1 (2,9)	0 (0,0)	34 (97,1)
2	1 (2,9)	8 (22,9)	11 (31,4)	15 (42,9)
3	1 (2,9)	2 (5,7)	1 (2,9)	31 (88,6)
4	11 (31,4)	1 (2,9)	20 (57,1)	3 (8,6)
5	2 (5,7)	1 (2,9)	0 (0,0)	32 (91,4)
6	1 (2,9)	0 (0,0)	1 (2,9)	33 (94,3)
7	1 (2,9)	2 (5,7)	0 (0,0)	32 (91,4)
8	5 (14,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	30 (85,7)
9	1 (2,9)	1 (2,9)	1 (2,9)	32 (91,4)
10	2 (5,7)	18 (51,4)	2 (5,7)	13 (37,1)
11	0 (0,0)	1 (2,9)	16 (45,7)	18 (51,4)
12	1 (2,9)	3 (8,6)	1 (2,9)	30 (85,7)
13	8 (22,9)	11 (31,4)	2 (5,7)	14 (40,0)
14	2 (5,7)	0 (0,0)	4 (11,4)	29 (82,9)
15	10 (28,6)	9 (25,7)	5 (14,3)	11 (31,5)

Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang praktek nomor pertanyaan satu (penggunaan air bersih), 34 responden menjawab selalu (97,1%) dan hanya 1 responden yang menjawab jarang (2,9%), pada pertanyaan nomor empat (penambahan minyak/santan/margarin dalam makanan) hanya 3 responden yang menjawab selalu (8,6%), 20 responden lainnya menjawab sering (57,1%), 1 responden menjawab jarang (2,9%), dan 11 responden menjawab tidak pernah (31,4%).

5.3. Data deskriptif peran ibu dan durasi diare selama perawatan.

Data deskriptif durasi diare selama perawatan, skor total pengetahuan, sikap, praktek, dan KAP (*knowledge, practise, attitude*) ditampilkan pada tabel 5:

Tabel 5. Data deskriptif durasi selama perawatan, skor total pengetahuan, sikap, praktek, dan KAP (n=35).

Deskripsi	Rerata ± SB	Median	Min	Max
Durasi selama perawatan (hari)	3,51 ± 1,22	3	1	6
Skor total pengetahuan/ <i>Knowledge</i>	11,9 ± 1,00	12	10	14
Skor total sikap / <i>Attitude</i>	11,7 ± 1,19	11	10	14
Skor total praktek / <i>Practice</i>	35,9 ± 3,94	36	19	42
Skor total KAP	59,4 ± 4,50	60	43	67

Rerata durasi perawatan pada penelitian adalah $3,51 \pm 1,22$ hari dengan perawatan minimal 1 hari dan maksimal 6 hari. Berdasarkan skor total pengetahuan didapatkan rerata $11,9 \pm 1,00$, dengan skor total pengetahuan minimal 10 dan maksimal 14. Berdasarkan skor total sikap didapatkan rerata $11,7 \pm 1,19$, dengan skor total sikap minimal 10 dan maksimal 14. Berdasarkan skor praktek didapatkan rerata $35,9 \pm 3,94$, dengan skor total praktek minimal 19 dan maksimal 42. Berdasarkan skor total KAP (*knowledge, attitude, practise*) didapatkan rerata $59,4 \pm 4,5$ dengan skor total KAP minimal 43 dan maksimal 67.

5.4. Analisis korelasi antara peran ibu dan durasi diare selama perawatan.

Analisis korelasi antara skor total pengetahuan, sikap, praktek, dan KAP (*knowledge, attitude, practise*) terhadap durasi diare selama perawatan ditampilkan pada tabel 6:

Tabel 6. Analisis korelasi antara skor total pengetahuan, sikap, praktek, dan KAP terhadap durasi selama perawatan diare (n=35).

Deskripsi	p (r)*			
	Skor pengetahuan	Skor sikap	Skor praktek	Skor KAP
Durasi selama perawatan	0,234 (0,207)	0,539 (-0,107)	0,847 (-0,034)	0,857 (-0,032)
Skor total pengetahuan	--	0,066 (0,315)	0,651 (0,079)	0,009 (0,437)
Skor total sikap	--	--	0,283 (0,186)	0,000 (0,599)
Skor total praktek	--	--	--	0,000 (0,835)

*Dianalisis dengan *Spearman Rho Correlation Test*

Korelasi skor total pengetahuan ibu terhadap durasi diare selama perawatan didapatkan korelasi positif (0,27) dengan kekuatan korelasi lemah. Korelasi skor total sikap ibu terhadap durasi diare selama perawatan didapatkan korelasi negatif (-0,107) dengan kekuatan korelasi lemah. Korelasi skor total praktek ibu terhadap durasi diare selama perawatan didapatkan korelasi negatif (-0,034) dengan kekuatan korelasi lemah, sedangkan untuk korelasi skor total KAP (*knowledge, attitude, practise*) ibu terhadap durasi diare selama perawatan didapatkan korelasi negatif (-0,032) dengan kekuatan korelasi lemah.

Korelasi skor total pengetahuan dengan skor total sikap pada ibu didapatkan korelasi positif (0,315) dengan kekuatan korelasi kuat. Korelasi skor total pengetahuan dengan skor total praktek pada ibu (0,079) didapatkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi lemah. Korelasi skor total pengetahuan dengan skor total KAP pada ibu (0,437) didapatkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi kuat. Berdasarkan korelasi skor total

sikap dengan skor total praktek pada ibu (0,186) didapatkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi lemah. Korelasi skor total sikap dengan skor total KAP pada ibu (0,599) didapatkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi kuat. Berdasarkan korelasi skor total praktek dengan skor total KAP pada ibu (0,835) didapatkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi kuat.