

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1. Simpulan

1. Kombinasi vitamin C dan E dosis tinggi dapat mengurangi penurunan kadar hemoglobin penderita KKL yang mendapat kemoterapi *cisplatin*.
2. Kombinasi vitamin C dan E dosis tinggi tidak dapat mengurangi penurunan jumlah eritrosit penderita KKL yang mendapat kemoterapi *cisplatin*.
3. Kombinasi vitamin C dan E dosis tinggi dapat mengurangi penurunan jumlah leukosit penderita KKL yang mendapat kemoterapi *cisplatin*.
4. Kombinasi vitamin C dan E dosis tinggi tidak dapat mengurangi penurunan jumlah trombosit penderita KKL yang mendapat kemoterapi *cisplatin*.

7.2. Saran

Pada penderita KKL yang mendapat kemoterapi *cisplatin* secara *neoajuvan, concomittan maupun ajuvan*, guna mengurangi efek samping obat berupa penurunan sistem hemopoetik, khususnya penurunan kadar hemoglobin dan jumlah leukosit, dapat diberikan vitamin C dan E dosis tinggi (1000 mg vit C dan E 400 mg vit E) selama 5 minggu bersamaan dengan pemberian *cisplatin* tersebut.