

**PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN
(PMT-P) TERHADAP STATUS GIZI BALITA GIZI BURUK DI DINAS
KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2012**

Artikel Penelitian

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
pada Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro



Disusun Oleh :

Farida Fitriyanti

G2C107001

**PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) terhadap Status Gizi Balita Gizi Buruk di Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2012” telah dipertahankan di depan penguji dan direvisi.

Mahasiswa yang mengajukan

Nama : Farida Fitriyanti
NIM : G2C107001
Fakultas : Kedokteran
Program studi : Ilmu Gizi
Universitas : Diponegoro
Judul Artikel : Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) terhadap Status Gizi Balita Gizi Buruk di Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2012

Semarang, 27 September 2012
Pembimbing

Tatik Mulyati, DCN., M.Kes.
NIP.196011031986032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel Penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) terhadap Status Gizi Balita Gizi Buruk di Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2012” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Rasa terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tatik Mulyati, DCN,.M.Kes selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan selama penyusunan artikel penelitian ini serta berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan artikel penelitian ini.

Akhir kata, segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan artikel penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Semarang, September 2012

Peneliti

Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) terhadap Status Gizi Balita Gizi Buruk di Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2012

Farida Fitriyanti¹, Tatik Mulyati²

ABSTRAK

Latar Belakang : Gizi buruk sering dialami oleh balita dan merupakan bentuk terparah dari proses kekurangan gizi terutama energi dan protein yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu lama. Gizi buruk ditunjukkan dengan BB dan TB yang mempunyai hubungan linier yang dinyatakan dengan nilai z-score berdasarkan BB/TB dan BB/U. Salah satu upaya untuk mengatasi gizi buruk dengan pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) yang nilai gizinya sudah terukur agar kebutuhan gizinya dapat terpenuhi.

Metode : Penelitian ini termasuk gizi masyarakat, dengan jenis penelitian observasional dan rancangan penelitian *cohort*. Subjek yang terpilih berjumlah 22 balita gizi buruk yang masuk dalam kriteria inklusi di Dinas Kesehatan Kota Semarang selama 60 hari (2 bulan). PMT-P yang diberikan dalam bentuk formula dan biskuit dengan nilai gizi terukur yang dapat memberikan kontribusi 70% dari kebutuhan energi dan 80% dari kebutuhan protein dalam sehari.

Hasil : Ada perbedaan status gizi balita sebelum dan setelah pemberian PMT-P berdasarkan BB/TB dan BB/U dengan nilai $p=0,000$ dan $p=0,002$. Perbedaan status gizi berdasarkan BB/TB yang terjadi setelah pemberian PMT-P yaitu dari 100% balita sangat kurus menjadi 18,2% normal, 40,9% kurus, dan 40,9% sangat kurus, sedangkan berdasarkan BB/U dari 86,4% balita gizi buruk menjadi 40,9% gizi kurang. Pemberian PMT-P juga memberikan kontribusi energi sebesar $54.60 \pm 15.42\%$ dan protein $79.17 \pm 37.75\%$ dari kebutuhan seharusnya dalam sehari.

Kesimpulan : PMT-P selama 2 bulan memberikan pengaruh terhadap perubahan status gizi berdasarkan BB/TB dan BB/U balita gizi buruk dengan kontribusi energi sebanyak $54.60 \pm 15.42\%$ dan protein $79.17 \pm 37.75\%$.

Kata kunci : PMT-Pemulihan, gizi buruk, formula WHO F100

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

² Dosen pembimbing Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

THE EFFECT OF SUPPLEMENTARY FEEDING PROGRAM OF RECOVERY FOR NUTRITIONAL STATUS OF MALNOURISHED CHILDREN UNDER FIVE IN DEPARTMENT OF HEALTH IN SEMARANG IN 2012

Farida Fitriyanti¹, Tatik Mulyati²

ABSTRACT

Background : Severe malnutrition is often happened in children under five. It is the most serious stage from process of malnutrition, especially energy and protein. Those do not appropriate with requirement and happen for a long time. Malnutrition is showed by weight and height where those have linear relation. And those are showed with z-score value by weight-for-height and weight-for-age. An effort to overcome malnutrition is Supplementary Feeding Program of Recovery (PMT-P) where its nutritional value has been measured. So that requirement can be achieved.

Method : This study was included on community nutrition with observational research and *cohort* approach. Subjects were 22 malnourished children under five including on inclusion criteria in Department of Health in Semarang during 60 days (2months). PMT-P was given on formula and biscuit form. It has nutritional value which can contribute 70% of energy requirement and 80% of protein requirement in one day.

Result : There was different nutritional status before and after giving PMT-P based on weight-for-height and weight-for-age with $p=0.000$ and $p=0.002$. Difference of nutritional status based on weight-for-height happening after PMT-P was from 100% of very thin to 18.2% normal; 40.9% thin; and 40.9% very thin. Whereas it based on weight-for-age was from 86.4% severe malnutrition to 40.9% mild malnutrition. PMT-P also gave contribution of energy of $54.60\pm 15.42\%$ and protein of $79.17\pm 37.75\%$ from daily need.

Conclusion : PMT-P for 2 months gives effect for changing of nutritional status based on weight-for-height and weight-for-age of malnourished children under five. It gives contribution of energy of $54.60\pm 15.42\%$ and protein of $79.17\pm 37.75\%$.

Keywords : PMT-P recovery, severe malnutrition, formula WHO F100

¹College student of Nutrition Science Medical Faculty in Diponegoro University Semarang

²Lecturer of Nutrition Science Medical Faculty in Diponegoro University Semarang

PENDAHULUAN

Gizi buruk pada balita merupakan salah satu permasalahan pokok bangsa Indonesia karena berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Gizi Buruk pada balita disebabkan oleh kekurangan energi dan protein yang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam jangka lama dan penyakit infeksi.^{1,2} Gizi buruk ditunjukkan dengan berat badan dan tinggi badan yang memiliki hubungan linier yang dinyatakan dengan z-score berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan berat badan menurut usia (BB/U) berdasarkan standar deviasi unit ($<-3SD$) dan ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO).³

Prevalensi gizi buruk pada balita secara nasional berdasarkan Riskesdas 2007 sebesar 5,4% dan 4,9% tahun 2010. Prevalensi gizi buruk berdasarkan penilaian status gizi BB/TB di Jawa Tengah pada tahun 2007 dan 2010 yaitu sebesar 4,7 dan 6,4%, sedangkan berdasarkan BB/U pada tahun yang sama adalah 4,0% dan 3,3%, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,3%. Sedangkan prevalensi di kota Semarang pada tahun yang sama yaitu menunjukkan penurunan sebesar 0,67% yaitu dari 1,68 menjadi 1,01%, namun kasus gizi buruk masih tetap membutuhkan perhatian.^{4,5,6} Pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan salah satu upaya dalam mengatasi masalah gizi buruk. PMT-Pemulihan bertujuan memulihkan keadaan gizi balita gizi buruk dengan cara memberikan makanan dengan kandungan gizi yang terukur agar kebutuhan gizi dapat terpenuhi.⁷

Gizi buruk yang terjadi pada balita sering dikaitkan dengan kurangnya energi dan protein dalam jangka waktu yang lama. Penelitian di kota Malang menunjukkan bahwa pemberian PMT-Pemulihan dengan formula WHO/Modifikasi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status gizi anak balita gizi buruk. Penelitian di Malawi memberikan makanan tambahan berupa RUTF dengan energi 175 kkal/kgBB/hari, protein 5,3 gr/kgBB/hari atau dapat memberikan kontribusi sebesar 75% kebutuhan energi dan 80% kebutuhan protein dalam sehari. Komposisi mikronutriennya identik dengan F-100 sebelum pengenceran yang telah sesuai dengan rekomendasi WHO untuk mengejar pertumbuhan terhadap balita gizi buruk menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap status gizi.^{8,9,21,22}

PMT-Pemulihan diberikan kepada balita gizi buruk yang telah dipilih oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk dimasukkan ke dalam program penanggulangan gizi buruk berupa formula WHO F100 dengan energi 100 kkal/kgBB/hari, protein 2,9 gram/kgBB/hari dan biskuit sun sebagai tambahan dengan energi 103,2 kkal, protein 2,16 gram per 6 keping sajian atau dapat memberikan kontribusi sebesar 70% kebutuhan energi dan 80% kebutuhan protein dalam sehari.^{4,10,22} PMT-Pemulihan ini dilaksanakan selama 60 hari (2 bulan), dan membutuhkan partisipasi keluarga, status gizi pada awal pemberian PMT-P dan penyakit infeksi selama pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penjarangan balita gizi buruk oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2012 terdapat 29 balita yang mengikuti program penanggulangan gizi buruk. Peneliti mencoba untuk meneliti bagaimanakah perbedaan status gizi pada balita gizi buruk sebelum dan sesudah pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) di Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2012.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup keilmuan gizi masyarakat yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan wilayah kota Semarang pada bulan April – Juni 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan penelitian *Cohort*.

Populasi target dalam penelitian ini adalah balita gizi buruk yang bertempat tinggal di wilayah kota Semarang, sedangkan populasi terjangkau adalah balita gizi buruk yang dirujuk ke Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mendapatkan PMT-Pemulihan. Usia balita yang masih dianggap kecil maka dalam penelitian ini orang tua/wali balita gizi buruk dipilih sebagai responden penelitian untuk mengetahui asupan makanan subyek saat dirumah. Balita yang diambil telah memenuhi kriteria inklusi yaitu bersedia mengisi *informed consent*, mengikuti program penanganan gizi buruk oleh DKK, balita memiliki status gizi buruk sebelum mendapatkan PMT, sedangkan kriteria eksklusinya yaitu balita dirawat di Rumah sakit, meninggal saat program berlangsung, dan pindah alamat. Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tersebut, dari 29 balita gizi buruk yang

mengikuti program hanya 22 balita gizi buruk dapat menjadi sampel penelitian ini.

Variabel terikat penelitian ini yaitu status gizi balita gizi buruk, variabel bebas yaitu pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P). Asupan energi, protein dan penyakit infeksi merupakan variabel perantara dalam penelitian ini karena merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi status gizi berdasarkan BB/TB dan BB/U. Formula susu yang diberikan dalam penelitian ini adalah formula 100 terdiri dari susu, gula pasir, minyak sayur, dan mineral mix sesuai komposisi formula dari WHO dengan energi 100 kkal, protein 2,9 gram per 100 ml dan biskuit sun sebagai tambahan dengan energi 103,2 kkal, protein 2,16 gram per 6 keping sajian.^{3,4,10} Komposisi tersebut dapat berkontribusi 70% dari kebutuhan energi dan 80% dari kebutuhan protein dalam sehari.^{9,22}

Data primer yang dikumpulkan meliputi identitas sampel, pengukuran antropometri tinggi badan dan berat badan, dan asupan PMT-P. Data primer berupa pengukuran antropometri tinggi badan menggunakan *infantometer* dengan ketelitian 0,1 cm dan berat badan menggunakan timbangan injak digital dengan ketelitian 0,1 kg. Data berat badan diperoleh dengan menghitung selisih antara berat badan wali dan balita dengan berat badan wali. Bersamaan dengan itu dilakukan pengambilan data asupan PMT-P.

Penilaian asupan PMT menggunakan metode *recall 1x24* jam. Penentuan frekuensi pemberian PMT-P (formula WHO F100) pada semua sampel dihitung berdasarkan berat badan per individu, kondisi balita pada saat pemeriksaan dan sesuai dengan kebutuhan energi, protein per individu selama 2 bulan dari ketentuan program yang seharusnya yaitu 6 bulan. Data primer dikumpulkan dengan cara kunjungan, pengamatan, pemeriksaan, recall, recad, serta wawancara. Pemberian paket PMT-P kepada setiap balita sampel dilakukan seminggu sekali setiap penimbangan di Puskesmas Pandanaran. Paket PMT-P disiapkan oleh Tim Peneliti serta mengajarkan kepada ibu balita sampel cara menyiapkan PMT-P agar mereka dapat menyiapkan sendiri. Bentuk makanan yang diberikan formula F100 dan apabila balita masih mengonsumsi ASI, maka pemberian ASI tetap diteruskan dengan didampingi F100 dan makanan pendamping. Pemberian F100

diberikan sesuai dengan berat badan balita dan kondisi klinis balita. Kepatuhan ibu atau pengasuh dalam memberikan PMT-P diketahui dari hasil wawancara.

Pengolahan dan analisis data menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) ver. 17 for Windows*. Status gizi berdasarkan nilai z-score BB/TB dan BB/U yang dihitung menggunakan software WHO Anthro 2005. Sementara data asupan konsumsi PMT-P dan asupan makan dianalisis menggunakan program *nutrisurvey 2005*. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran karakteristik subyek, tingkat kebutuhan energi dan protein, kontribusi PMT-P, dan status gizi. Uji kenormalan data menggunakan metode *Saphiro wilk*. Perbedaan Z-score sebelum dan sesudah perlakuan dianalisis menggunakan uji *Wilcoxon* karena distribusi data tidak normal.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik subyek penelitian

Karakteristik subyek penelitian menurut umur, jenis kelamin dan status gizi disajikan pada tabel 1.

Table 1. Karakteristik subyek

Karakteristik subyek	N = 22	
	N	%
Umur		
0 – 6 bulan	1	4.5 %
7 – 12 bulan	3	13.6 %
1 – 3 tahun	17	77.3 %
4 – 6 tahun	1	4.5 %
Jenis Kelamin		
Laki – laki	13	59.1 %
Perempuan	9	40.9 %
Status Gizi		
(BB/TB)		
<-3SD (sangat kurus)	22	100%
(BB/U)		
<-3SD (gizi buruk)	19	86.4%
-3SD s/d <-2SD (gizi kurang)	3	13.6%

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar subyek dalam penelitian ini 77.3% berada pada kelompok umur 1–3 tahun dan sebanyak 59.1% berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan status gizi subyek berdasarkan z-score BB/TB dan BB/U

sebelum mendapatkan PMT-P berkategori status gizi sangat kurus 100 % dan gizi buruk 86.4%, gizi kurang 13.6%.

Tingkat asupan energi dan protein sebelum mendapat PMT-P

Tingkat asupan energi dan protein sebelum mendapatkan PMT-P disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Kategori tingkat asupan energi dan protein sebelum pemberian PMT-P

Kategori tingkat asupan	Energi		Protein	
	N	%	N	%
<70% (defisit berat)	21	95.5%	15	68.2%
70-79% (defisit sedang)	0	0%	2	9.1%
80-99% (defisit ringan)	1	4.5%	3	13.6%
>100% (normal)	0	0%	2	9.1%

Tabel 2 menunjukkan sebelum pemberian PMT-P, sebagian besar balita mengalami defisit asupan energi dan protein. Sebanyak 21 balita (95.5%) mengalami defisit energi berat dan 15 balita (68.2%) mengalami defisit protein berat.

Tingkat asupan energi dan protein setelah mendapat PMT-P

Tingkat asupan energi dan protein setelah mendapatkan PMT-P disajikan pada tabel 3.


Tabel 3. Kategori tingkat asupan energi dan protein setelah mendapatkan PMT-P

Kategori tingkat asupan	Energi		Protein	
	N	%	N	%
<70% (defisit berat)	3	13.6 %	0	0 %
70-79% (defisit sedang)	2	9.1 %	0	0 %
80-99% (defisit ringan)	9	40.9 %	3	13.6 %
>100% (normal)	8	36.4 %	19	86.4 %

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan terdapat perubahan tingkat asupan energi yang mengalami defisit energi berat sebanyak 18 balita (81.9%), diiringi dengan kenaikan asupan energi untuk kategori sedang, ringan, dan normal. Untuk tingkat asupan protein, tidak terdapat balita yang mengalami defisit protein berat setelah pemberian PMT-P.


Kontribusi PMT-P dan makanan terhadap kebutuhan energi dan protein

Kontribusi PMT-P terhadap kebutuhan energi disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik kontribusi energi PMT dan makanan selama pemberian PMT-P

Kontribusi asupan energi PMT selama pemberian PMT-P dari minggu perminggu terjadi peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada minggu ke delapan yaitu sebesar 69.30% dengan rerata kontribusi energi PMT-P adalah $54.60 \pm 26.04\%$ dari kebutuhan energi. Asupan makanan selain PMT-P selama pemberian PMT-P juga terjadi peningkatan dimana pada minggu ke delapan terjadi peningkatan menjadi 53.61% dengan rerata kontribusi energi makanan adalah $49.09 \pm 27.42\%$ dari kebutuhan energi yang seharusnya. Sedangkan kontribusi protein PMT-P terhadap kebutuhan protein disajikan pada gambar 2.




Gambar 2. Grafik kontribusi protein PMT dan makanan selama pemberian PMT-P

Kontribusi asupan protein PMT-P selama pemberian PMT-P dari minggu perminggu terjadi peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada minggu ke delapan yaitu sebesar 100.49% dengan dengan rerata kontribusi protein PMT-P sebesar $79.17 \pm 37.75\%$ dari kebutuhan protein yang seharusnya. Sedangkan asupan makanan selain PMT-P selama pemberian PMT-P terjadi peningkatan tertinggi pada minggu ke delapan yaitu sebesar 54.03% dengan kontribusi protein makanan sebesar $48.24 \pm 13.86\%$ dari kebutuhan protein yang seharusnya.

Gambaran perubahan nilai z-score selama pemberian PMT-P

Perubahan nilai z-score selama pemberian PMT-P dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Perubahan nilai Z-Skor selama pemberian PMT-P

Terjadi peningkatan nilai z-score BB/TB di setiap minggunya dengan nilai z-score tertinggi pada minggu ke delapan yaitu -2.89. Sedangkan nilai z-score BB/U meningkat pada minggu ke 6 yaitu -3.16, dan mengalami penurunan kembali pada minggu ke delapan menjadi -3.367.

Pengaruh pemberian PMT-P terhadap status gizi

Ada perbedaan status gizi berdasarkan BB/TB setelah pemberian PMT-P selama 60 hari yang bermakna dengan nilai $p=0,000$ yaitu dari 100% balita sangat kurus menjadi gizi kurus dan normal. Sedangkan status gizi berdasarkan BB/U terjadi perbedaan yang bermakna setelah pemberian PMT-P sebesar $p=0,002$

dengan menggunakan uji *Wilcoxon* yaitu dari 86.4% balita gizi buruk menjadi 40.9% gizi kurang.

Perbedaan status gizi sebelum dan setelah pemberian PMT-P

Perbedaan status gizi sebelum dan setelah pemberian PMT-P disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Perbedaan status gizi (berdasarkan BB/TB) sebelum dan setelah pemberian PMT-P

Kategori	Sebelum (n=22)	%	Sesudah (n=22)	%
< -3SD (severe wasted)	22	100%	9	40.9%
-3SD s/d <-2SD (wasted)	0	0%	9	40.9%
-2SD s/d +2SD (normal)	0	0%	4	18.2%
Total	22	100%	22	100%

Total subyek yang mengalami perubahan status gizi (BB/TB) 59.1% (13 balita), di mana 4 balita (18.2%) mengalami peningkatan menjadi status gizi normal dan 9 balita (40.9%) masih berstatus gizi kurus.

Tabel 5. Perbedaan status gizi (berdasarkan BB/U) sebelum dan setelah pemberian PMT-P

Kategori	Sebelum (n=22)	%	Sesudah (n=22)	%
< -3SD (severe underweight)	19	86.4%	13	59.1%
-3SD s/d <-2SD (moderate underweight)	3	13.6%	9	40.9%
-2SD s/d +2SD (normal)	0	0%	0	0%
Total	22	100%	22	100%

Subyek yang mengalami perubahan status gizi (BB/U) 27.3% (6 balita), dimana ke enam balita tersebut meningkat status gizi nya menjadi gizi kurang.

PEMBAHASAN

Jumlah balita yang masuk dalam program penanggulangan kasus gizi buruk di Dinas Kesehatan Kota Semarang sebanyak 29 balita, namun hanya 22 balita yang memenuhi kriteria inklusi. Selama penelitian, 1 subyek meninggal di rumah sakit setelah mengikuti 1 bulan pemulihan, 3 subyek pindah dari wilayah Semarang, dan 3 subyek *drop out* karena tidak mengikuti rangkaian kegiatan pemulihan. Studi yang dilakukan di Lampung pada anak balita gizi buruk menemukan 30.9% balita meninggal pada saat penelitian.¹¹

Subyek penelitian berada pada kelompok umur 1-3 tahun (77,3%) dan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (59,1%). Jenis kelamin berkaitan dengan kebutuhan energi. Umumnya laki-laki memiliki berat dan panjang badan lebih

tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menyebabkan laki-laki memiliki kebutuhan energi dan protein yang lebih tinggi dan lebih berisiko untuk terkena gizi buruk dibandingkan perempuan.^{12,13} Hal ini sesuai dengan laporan RISKESDAS 2010 mengenai prevalensi gizi buruk balita berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, sebanyak 14.2% dari 40.8% balita yang berstatus gizi buruk, berada pada rentang usia 1-3 tahun dan dari 12% yang berstatus gizi buruk 6.3% berjenis kelamin laki-laki.⁶

Sebelum mendapatkan PMT-P status gizi balita yang dinilai berdasarkan BB/TB dan BB/U berada pada status gizi buruk dan mempunyai tingkat asupan energi dan protein pada defisit tingkat berat. Faktor penyebab gizi buruk berhubungan dengan pemberian makanan yang kurang memadai, pemberian ASI yang tidak eksklusif, dan terlambat memberikan makanan pendamping.¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu dan pengasuh anak menunjukkan 25% balita mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan setelah lahir, selebihnya bayi langsung diberikan makanan dan minuman sebagai pendamping ASI dengan kondisi fisiologis balita belum mampu bekerja dengan sempurna untuk mencerna makanan. Makanan dan minuman yang biasa diberikan kepada balita antara lain madu, pisang, air teh, dan bubur susu. Asupan gizi yang adekuat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan.^{24,2,14} Jenis makanan yang biasa dikonsumsi balita dari hasil recall antara lain bubur beras, mie instan, bubur susu, pisang di mana makanan tersebut tidak memenuhi semua komponen zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. Sementara dilihat dari kuantitasnya, jumlah makanan yang diberikan kepada balita tersebut tidak mencukupi kebutuhan sesuai dengan umur dan berat badan, rata-rata yang dikonsumsi sebanyak 3-4 sendok makan. Sedangkan untuk sumber protein yang dikonsumsi berupa ikan dan telur dengan jumlah yang rata-rata dikonsumsi sebanyak 10-15 gram.

Tubuh membutuhkan energi, karbohidrat, lemak dan protein dalam jumlah seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Apabila asupan energi kurang dari kebutuhan, tubuh akan menggunakan cadangan energi yang berupa glikogen dan lemak. Bila kekurangan energi berlangsung lama dan cadangan energi tidak

mencukupi, maka protein digunakan sebagai sumber energi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital dalam tubuh yang berdampak pada berkurangnya massa tubuh dan terhambatnya pertumbuhan.^{15,16,17} Kekurangan protein juga dapat mempengaruhi status gizi. Hal ini dikarenakan protein di dalam tubuh merupakan zat pembangun yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, menggantikan sel-sel yang rusak, memelihara keseimbangan metabolisme tubuh, transport zat gizi dan pembentukan antibodi.^{18,19}

Ada perbedaan status gizi berdasarkan BB/TB dan BB/U setelah pemberian PMT-P selama 60 hari. Hal ini disebabkan kontribusi asupan energi dan protein dari PMT-P yang diasup oleh balita mengalami peningkatan di setiap minggunya dan didukung dengan peningkatan asupan energi dan protein dari makanan selain PMT-P, sehingga tingkat asupan dalam sehari sebagian besar dapat terpenuhi. Rerata kontribusi energi dan protein pada PMT-P sebesar $54.60 \pm 26.04\%$ dan $79.17 \pm 37.75\%$ lebih besar dibandingkan dengan kontribusi asupan energi dan protein dari makanan selain PMT-P sebesar $49.09 \pm 27.42\%$ dan $48.24 \pm 13.86\%$. Pemberian PMT-P dalam bentuk formula atau cair mengandung semua nutrisi yang diperlukan balita gizi buruk, ditambah dengan vitamin, mineral dengan osmolaritas yang rendah dan dalam porsi kecil sehingga memudahkan balita dalam mengonsumsi dan penyerapan nutrisi. Formula ini mengandung lemak nabati, whey, gula kompleks, mineral dan vitamin sehingga cocok untuk fase transisi pada balita gizi buruk yang membutuhkan makanan yang padat gizi untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak (*catch up*). PMT-P yang diberikan mengandung protein yang mempunyai kandungan semua jenis asam amino esensial dalam proporsi yang sesuai untuk pertumbuhan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh dan keseimbangan komposisi ini tepat untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Lemak yang digunakan berupa lemak MCT yang mudah diabsorpsi dan dapat membantu meningkatkan penyerapan vitamin A, D, E, K. Lemak MCT cocok untuk balita gizi buruk yang proses pencernaan dan metabolisme bermasalah karena pemecahan MCT sudah terjadi di rongga usus sehingga mengurangi penggunaan enzim lipase dari pankreas dan asam empedu sehingga penyerapan akan mudah meski dengan sedikit bantuan enzim.

Sedangkan untuk karbohidrat berupa glukosa polimer (bebas laktosa) sehingga lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh. Selain itu pada PMT-P juga mempunyai kandungan gizi berupa seng (Zn), kalium, magnesium dan tembaga (Cu) yang dapat membantu dalam proses pertumbuhan balita. Seng (Zn), kalium, magnesium dan tembaga (Cu) sangat dibutuhkan pada saat terjadi diare serta dehidrasi. Pada balita yang mengalami gizi buruk, penting untuk memperhatikan kepadatan nutrisi yang cukup dan seimbang agar fisiologis serta imunologi tubuh balita dapat kembali normal dan dapat meningkatkan berat badan.^{9,29,30} Penelitian yang dilakukan oleh Collins S dkk pada balita gizi buruk di Ethiopia pada tahun 2005 dengan pemberian paket makanan terapi siap makan (RUTF) berbentuk pasta setara dengan F100 dengan kontribusi energi dan protein sebesar 75% dari kebutuhan sehari selama 3 bulan menunjukkan 85% balita status gizinya dapat berubah dengan nilai z-score dari $<-3SD$ menjadi $>-2SD$.^{22,23}

Balita yang tidak mengalami perubahan status gizi dikarenakan selama pemberian PMT-P balita mengalami sakit demam, muntah, mual, batuk diare. Infeksi, imunitas dan gangguan pertumbuhan merupakan bagian yang saling berhubungan, dimana saat infeksi akan terjadi peningkatan kebutuhan energi, peningkatan katabolisme, nafsu makan menurun serta terjadi penurunan absorpsi zat gizi oleh usus. Rendahnya asupan gizi tersebut merupakan penyumbang terjadinya hambatan pertumbuhan (*growth faltering*) dan kejadian gizi kurang/gizi buruk.^{25,26} Penelitian lain oleh Gupta SS dan Monira S di India dan di Bangladesh melaporkan diare banyak dialami oleh anak malnutrisi karena terjadi inflamasi kronis pada lambung bagian bawah dan berkaitan dengan ulserasi usus dan lambung, selain itu balita malnutrisi juga sering mengalami infeksi saluran cerna sehingga berakibat pada malabsorpsi zat gizi dan penurunan kesehatan.^{27,28} Selain itu kesadaran, ketelatenan, dan kesabaran ibu dalam memberikan PMT-P masih kurang, dari hasil wawancara dengan responden, responden merasa jenuh dalam mengikuti PMT-P. Apabila dilihat dari tingkat asupan energi, setelah pemberian PMT-P masih terdapat balita yang mempunyai tingkat asupan energi defisit berat. Penurunan nafsu makan dapat mempengaruhi status gizi dan tingkat asupan energi

dan protein, jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama maka dapat menurunkan berat badan.^{19,20}

KESIMPULAN

PMT-P memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan status gizi berdasarkan BB/TB dan BB/U balita gizi buruk dengan memberikan rerata kontribusi energi sebanyak $54.60 \pm 15.42\%$ dan protein $79.17 \pm 37.75\%$ dari kebutuhan seharusnya dalam sehari.

SARAN

1. Untuk meningkatkan efisiensi paket PMT-P perlu dilaksanakan proses pendampingan secara kontinu, agar paket yang diberikan benar-benar tepat dan diterima sesuai dengan rencana program yang diberikan pada balita gizi buruk.
2. Kegiatan penyuluhan dan pemberian motivasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu responden terhadap status gizi balita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah banyak memberi saran dan masukan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini. Kepada balita dan orang tua balita gizi buruk yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta staf atas bantuannya sehingga *screening* kasus dan penelitian dapat dilakukan di DKK dan wilayah kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Litbang Depkes. Gizi Buruk Sebabkan 3,5 juta Kematian Anak per Tahun; [17 Januari 2008]. www.litbang.depkes.go.id/aktual/anak/giziburuk.
2. Suhardjo. Perencanaan Pangan dan Gizi. Jakarta: Bumi Aksara; 2003.
3. World Health Organization. Management Of Severe Malnutrition: A Manual For Physicians And Other Senior Health Workers. Geneva; 1999. Hal 4-14.

4. Dinas Kesehatan Kota Semarang. Data Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Semarang 2010. Semarang : Dinas Kesehatan Kota Semarang; 2010.
5. Departemen Kesehatan RI. LAPORAN RISKESDAS 2007. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta; 2007.
6. Departemen Kesehatan RI. LAPORAN RISKESDAS 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta; 2010.
7. Sugeng Iwan Setyobudi, Astutik Pudjirahayu, dan Bachtyar Bakri. Pengaruh PMT-Pemulihan dengan Formula WHO/Modifikasi terhadap Status Gizi Anak Balita KEP di Kota Malang. *Jurnal Media Gizi dan Keluarga*; 2005.
8. Michael AC, Heidi S, MacDonald JN, Per Ashorn, Andre B, Heather MC, Mark JM. Comparison of Home-Based Therapy With Ready-To-Use Therapeutic Food With Standard Therapy in The Treatment of Malnourished Malawian Children: A Controlled, Clinical Effectiveness Trial¹⁻⁴. *Am J Clin Nutr* 2005;81:864-70.
9. Michael H. Golden. Proposed Recommended Nutrient Densities for Moderately Malnourished Children. *Food and Nutrition Bulletin*, vol.30, no.3. 2009, The United Nations University.
10. Dinas Kesehatan Kota Semarang. Data Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Semarang 2012. Semarang : Dinas Kesehatan Kota Semarang; 2012.
11. Suhartono, Budiman D, Castro T. Pertumbuhan dan perkembangan anak gizi buruk masa lalu di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia* 2008; 5(1): 41-8.
12. Diop el HI, Dossou N, Ndour M, Briend A, Wade S. Comparison of the efficacy of a solid ready-to-eat food and a liquit, milk-based diet for rehabilitation of severely malnourished children: a randomized trial. *American Journal of Clinical* 2003; 78(2): 302-307.
13. Gaboulaud V. Could nutritional rehabilitatiton at home complement or replace centre-based therapeutic feeding programmes for severe malnutrition. *Journal of Tropical Pediatrics* 2007; 53(1): 49-51.
14. Ari Yulastuti. *Gizi dan Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu ; 2008. Hal 11

15. Soekirman. Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat. Jakarta: Penebar Swadaya; 2004.
16. Walker WA, John B Watkins, Christopher Duggan. Nutrition in pediatrics. Canada: BC Decker Inc.; 2003.
17. Martha, H. S. Biochemical and psychological Aspects of Human Nutrition. WB Saunders Company; 2000.
18. Amrahu S, Zemone T. risk factors for severe acute malnutrition children under the age of five: a case control study. *Ethiop J Health Dev* 2008; 22(1): 21-5.
19. Caulfield LE, de Onis M, Black RE. Undernutrition as an underlying cause of child deaths associated with diarrhea, pneumonia, malaria, and measles. *AM J Clin Nutr* 2002; 80: 193-8.
20. Gibson RS. Principle of nutritional assessment. 2nd ed. New Yory: Oxford University press; 2005. p. 337.
21. WHO. Guidelines for the inpatient treatment of severely malnourished children. SEARO Technical Publication 2003; 24.
22. WHO. WHO Child Growth Standards Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age Methods and Development. Departement of Nutition for Health and Development. Geneva; 2006.
23. Collins S, Sadler K, Dent N, Khara T, Guerrero S, Myatt M, Saboya M, Walsh A. Key Issues In The Success Of Community-Based Management Of Severe Malnutrition. *Food and Nutrition Bulletin* 2006; 27(3 Suppl):S49-82.
24. Masithah T, Soekiman, Martianto D. Hubungan pola asuh makan dan kesehatan dengan status gizi anak batita di Desa Mulya Harja. *Media Gizi dan Keluarga*. 2005; 29: 29-39.
25. Fatimah S. Dampak berat badan lahir terhadap status gizi bayi. *Badan Litbang kesehatan [serial online]*. 2009 [dikutip 2 Maret 2012]. Diunduh dari: <http://diglib.litbang.depkes.go.id>
26. Kusharisupeni. Peran status kelahiran terhadap stunting pada bayi: sebuah studi prospektif. *Jurnal Kedokteran Trisakti*. 2002; 23: 73-80.

27. Gupta SS, Mohammed MH, Ghosh TS, Kanugo S, Nair GB, Mande SS. Metagenome of the gut of a malnourished children. *Gut pathogens*. 2011; 3: 1-9.
28. Monira S, Nakamura S, Gotoh K, Izutsu K, Watanabe H, Alam NH, *et al.* Gut microbiota of healthy and malnourished children in Bangladesh. *Frontiers in microbiology*. 2011; 2: 1-7.
29. Mahan L.K, Arlin, M.T. Krause's Food, Nutrition & Diet Therapy. Edisi 11. Philadelphia: WB Saunders Co; 2000: 45.
30. Damayanti Rusli Sjarif, Endang Dewi Lestari, Maria Mexitalia, Sri sudaryati Nasar. Buku Ajar Nutrisi Pediatrik dan Penyakit Metabolik Jilid 1. Ikatan Dokter Anak Indonesia; 2011:20-59,106-147.

no.id	Nama resp	Jns kel	Tanggl lahir	Tanggl ukur	Peny. infek	BB sblm	TB sblm	Z-score sblm	Status gizi sblm	BB ssdah	TB ssdah	z-score ssdah	Status gizi sesudah	Asupan energi sblm	Asupan prot sblm	Asupan energi ssdah	Asupan prot ssdah	Asupan energi PMT-P	Asupan prot. PMT-P	Keb.energi shrusnya	Keb.pro t. shrusnya	Tkt.asupan energi pre	Tkt kckup n prot pre	Kat tingkat asupan energi pre	Kat tingkat asupan energi prot. pre	Tkt. asupan energi post	Tkt asupan prot post	Kat tingkat asupan energi post	Kat tingkat asupan energi post	Kontribusi energi PMT-P	Kontribusi protein PMT-P
1	Klemens christian	L	20.11.2010	12-Apr-2012	TB	7.80	79.00	-3.43	sangat kurus	8.05	80.90	-3.47	sangat kurus	436.50	14.40	576.89	19.83	180.39	5.23	1170.00	23.40	37.31	61.54	defisit berat	defisit berat	49.31	84.75	defisit berat	defisit ringan	15.42	22.36
2	Novela aryani	P	10.11.2011	12-Apr-2012	sehat	3.95	56.60	-3.85	sangat kurus	5.00	59.90	-1.77	normal	233.10	4.30	1259.85	29.38	733.75	21.28	592.50	11.85	39.34	36.29	defisit berat	defisit berat	212.63	247.92	normal	normal	123.84	179.57
3	Fayzal nur ramadhany	L	11.08.2010	12-Apr-2012	diare, muntah	6.85	80.00	-5.08	sangat kurus	7.90	81.00	-3.87	sangat kurus	189.70	7.20	915.18	28.40	658.58	19.10	1027.50	20.55	18.46	35.04	defisit berat	defisit berat	89.07	138.19	defisit ringan	normal	64.10	92.94
4	Ibrahim nasih ulwan	L	09.05.2009	12-Apr-2012	muntah	9.00	86.20	-3.64	sangat kurus	10.40	87.30	-2.07	kurus	373.90	16.90	1224.13	40.26	815.93	23.66	1350.00	27.00	27.70	62.59	defisit berat	defisit berat	90.68	149.12	normal	normal	60.44	87.64
5	Raihan surya	L	27.08.2011	12-Apr-2012	diare,	4.12	58.00	-3.38	sangat kurus	4.45	60.10	-4.12	sangat kurus	326.70	5.00	519.83	15.08	519.83	15.08	618.00	12.36	52.86	40.45	defisit berat	defisit berat	84.11	121.97	defisit ringan	normal	84.12	121.97
6	Aditya firman maulana	L	27.07.2010	12-Apr-2012	hernia,	8.40	83.00	-3.45	sangat kurus	8.95	84.50	-3.06	sangat kurus	404.40	14.00	1219.13	39.90	755.33	21.90	1260.00	25.20	32.10	55.56	defisit berat	defisit berat	96.76	158.35	normal	normal	59.95	86.92
7	Jelita	P	24.03.2010	12-Apr-2012	sehat	7.92	81.50	-3.79	sangat kurus	8.90	81.60	-2.01	kurus	290.90	14.50	1015.63	35.97	574.83	16.67	1188.00	23.76	24.49	61.03	defisit berat	defisit berat	85.49	151.39	defisit ringan	normal	48.39	70.16
8	Ariel	L	11.06.2010	12-Apr-2012	TB	7.70	80.00	-3.80	sangat kurus	8.65	82.00	-2.83	kurus	264.20	8.80	950.63	29.80	565.43	16.40	1155.00	23.10	22.87	38.10	defisit berat	defisit berat	82.31	128.99	defisit ringan	normal	48.96	70.99
9	Aldi firmansyah	L	29.10.2010	12-Apr-2012	dema, diare	6.60	71.50	-3.56	sangat kurus	7.10	74.50	-3.52	sangat kurus	329.50	11.20	944.60	24.88	430.30	12.48	990.00	19.80	33.28	56.57	defisit berat	defisit berat	95.41	125.65	normal	normal	43.46	63.02
10	M. Lutfi Ardiansyah	L	08.07.2010	12-Apr-2012	Gangguan	7.90	79.00	-3.28	sangat kurus	8.80	82.00	-2.78	kurus	358.10	14.90	1012.33	32.20	420.83	12.20	1185.00	23.70	30.22	62.87	defisit berat	defisit berat	85.43	135.88	defisit ringan	normal	35.51	51.49
11	Risma alia Anggraeni	P	09.04.2010	12-Apr-2012	sehat	7.23	76.00	-3.67	sangat kurus	7.85	79.00	-2.87	kurus	483.80	18.60	1307.78	47.04	666.88	19.34	1084.50	21.69	44.61	85.75	defisit berat	defisit ringan	120.59	216.87	normal	normal	61.49	89.16
12	Widya	P	07.07.2011	12-Apr-2012	dema	4.68	63.00	-4.56	sangat kurus	5.10	62.00	-2.55	kurus	352.90	10.00	701.74	19.26	229.54	6.66	702.00	14.04	50.27	71.23	defisit berat	defisit sedang	99.96	137.16	normal	normal	32.70	47.41
13	Gatan gilang putra	L	30.03.2011	12-Apr-2012	dema, m	4.35	64.00	-5.70	sangat kurus	4.55	65.00	-4.90	sangat kurus	420.90	14.00	1054.67	31.53	587.17	17.03	652.50	13.05	64.51	107.28	defisit berat	normal	161.63	241.59	normal	normal	89.99	130.48
14	Solimah	P	22.11.2010	12-Apr-2012	diare, d	6.90	75.30	-4.05	sangat kurus	6.70	74.60	-3.53	sangat kurus	328.60	8.80	821.95	22.75	322.25	9.35	1035.00	20.70	31.75	42.51	defisit berat	defisit berat	79.42	109.88	defisit sedang	normal	31.14	45.15
15	Zahra pertama davira	P	15.12.2010	12-Apr-2012	sehat	7.32	76.00	-3.52	sangat kurus	7.50	76.50	-2.66	kurus	410.10	11.00	856.37	21.72	204.17	5.92	1098.00	21.96	37.35	50.09	defisit berat	defisit berat	77.99	98.91	defisit sedang	normal	18.59	26.96
16	Putri agustina	P	28.08.2009	12-Apr-	dema	7.67	83.80	-4.11	sangat kurus	8.75	86.50	-3.43	sangat kurus	187.00	4.60	740.17	20.80	500.17	14.50	1150.50	23.01	16.25	19.99	defisit berat	defisit berat	64.33	90.42	defisit berat	normal	43.47	63.04

Karakteristik subyek

Frequencies

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0 - 6 bulan	1	4.5	4.5	4.5
7 - 12 bulan	3	13.6	13.6	18.2
1 - 3 tahun	17	77.3	77.3	95.5
4 - 6 tahun	1	4.5	4.5	100.0
Total	22	100.0	100.0	

jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	13	59.1	59.1	59.1
Perempuan	9	40.9	40.9	100.0
Total	22	100.0	100.0	

status gizi (BB/TB) sebelum

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat kurus	22	100.0	100.0	100.0

Status gizi (BB/U) sebelum

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid severe malnutrition	19	86.4	86.4	86.4
moderate underweight	3	13.6	13.6	100.0
Total	22	100.0	100.0	

Tingkat asupan energi dan protein sebelum mendapat PMT-P

Frequencies

kategori tkt asupan energi pre

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid defisit berat	21	95.5	95.5	95.5
defisit ringan	1	4.5	4.5	100.0
Total	22	100.0	100.0	

kategori tkt kecukupan protein pre

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid defisit berat	15	68.2	68.2	68.2
defisit sedang	2	9.1	9.1	77.3
defisit ringan	3	13.6	13.6	90.9
normal	2	9.1	9.1	100.0
Total	22	100.0	100.0	

Tingkat asupan energi dan protein setelah mendapatkan PMT-P

Frequencies

kategori tkt asupan energi post

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid defisit berat	3	13.6	13.6	13.6
defisit sedang	2	9.1	9.1	22.7
defisit ringan	9	40.9	40.9	63.6
normal	8	36.4	36.4	100.0
Total	22	100.0	100.0	

kategori tkt asupan protein post

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid defisit ringan	3	13.6	13.6	13.6
normal	19	86.4	86.4	100.0
Total	22	100.0	100.0	

Kontribusi PMT-P terhadap kebutuhan energi dan protein dalam sehari

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kontri_energi_PMT	22	15.42	123.84	54.6066	26.04043
kontri_prot_PMT	22	22.36	179.57	79.1796	37.75862
kont_energi_makann	22	.00	136.94	49.0939	27.42032
kont_prot_makanan	22	.00	127.71	74.7838	29.08999
Valid N (listwise)	22				

Perbedaan nilai z-score sebelum dan setelah pemberian PMT-P

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Z-score BB/TB sesudah - Z-score BB/TB sbml	Negative Ranks	2 ^a	5.25	10.50
	Positive Ranks	20 ^b	12.12	242.50
	Ties	0 ^c		
	Total	22		

- a. Z-score sesudah < Z-score sbml
- b. Z-score sesudah > Z-score sbml
- c. Z-score sesudah = Z-score sbml

Test Statistics^p

	Z-score BB/TB sesudah - Z-score BB/TB sbml
Z	-3.767 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

- a. Based on negative ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
z_scoreBBU_ssdah - z_scoreBBU_sbml	Negative Ranks	6 ^a	4.67	28.00
	Positive Ranks	15 ^b	13.53	203.00
	Ties	1 ^c		
	Total	22		

- a. z_scoreBBU_ssdah < z_scoreBBU_sbml
- b. z_scoreBBU_ssdah > z_scoreBBU_sbml
- c. z_scoreBBU_ssdah = z_scoreBBU_sbml

Test Statistics^b

	z_scoreBBU_ssdah - z_scoreBBU_sbml
Z	-3.042 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002

- a. Based on negative ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Status gizi sebelum dan setelah pemberian PMT-P

Frequency Table

status gizi (BB/TB) sebelum

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat kurus	22	100.0	100.0	100.0

status gizi (BB/TB) sesudah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat kurus	9	40.9	40.9	40.9
Valid kurus	9	40.9	40.9	81.8
Valid normal	4	18.2	18.2	100.0
Total	22	100.0	100.0	

Statistics

	status_gziBBU_s blm	status gizi bb/u ssddah
N Valid	22	22
Missing	0	0

Status gizi BBU sebelum

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid severe malnutrition	19	86.4	86.4	86.4
Valid moderate underweight	3	13.6	13.6	100.0
Total	22	100.0	100.0	

Status gizi BB/U sesudah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid severe malnutrition	13	59.1	59.1	59.1
Valid moderate underweight	9	40.9	40.9	100.0
Total	22	100.0	100.0	

no.id	nama responden	jns kel	tanggal lahir	tanggal ukur	penyakit	jenis penyakit	BB sblm	TB sblm	Z-score BB/TB sblm	z-score BB/U sblm	status gizi BB/U sblm
1	klemens christian	L	20.11.2010	12-Apr-12	iya	TB	7.8	79	-3.43	-2.82	moderate underweight
2	novela aryani	P	10.11.2011	12-Apr-12	tidak	sehat	3.95	56.6	-3.85	-4.39	severe malnutrition
3	fayzal nur ramadhany	L	11.08.2010	12-Apr-12	iya	diare, m	6.85	80	-5.08	-4.3	severe malnutrition
4	ibrahim nasih ulwan	L	09.05.2009	12-Apr-12	iya	muntah	9	86.2	-3.64	-2.54	moderate underweight
5	raihan surya	L	27.08.2011	12-Apr-12	iya	diare, n	4.12	58	-3.38	-4.63	severe malnutrition
6	aditya firman maulana	L	27.07.2010	12-Apr-12	iya	hernia,	8.4	83	-3.45	-2.76	moderate underweight
7	jelita	P	24.03.2010	12-Apr-12	tidak	sehat	7.92	81.5	-3.79	-3.24	severe malnutrition
8	ariel	L	11.06.2010	12-Apr-12	iya	TB	7.7	80	-3.8	-3.67	severe malnutrition
9	aldi firmansyah	L	29.10.2010	12-Apr-12	iya	demam, d	6.6	71.5	-3.56	-4.25	severe malnutrition
10	M. Lutfi Ardiansyah	L	08.07.2010	12-Apr-12	iya	gangguan	7.9	79	-3.28	-3.36	severe malnutrition
11	risma alia Anggraeni	P	09.04.2010	12-Apr-12	tidak	sehat	7.23	76	-3.67	-3.88	severe malnutrition
12	widya	P	07.07.2011	12-Apr-12	iya	demam	4.68	63	-4.56	-4.56	severe malnutrition
13	gatan gilang putra	L	30.03.2011	12-Apr-12	iya	demam, m	4.35	64	-5.7	-6.22	severe malnutrition
14	solimah	P	22.11.2010	12-Apr-12	iya	diare, d	6.9	75.3	-4.05	-3.11	severe malnutrition
15	zahra pertama davira	P	15.12.2010	12-Apr-12	tidak	sehat	7.32	76	-3.52	-2.45	severe malnutrition
16	putri agustina	P	28.08.2009	12-Apr-12	iya	demam	7.67	83.8	-4.11	-4.27	severe malnutrition
17	rahma fitriana	P	20.09.2009	12-Apr-12	tidak	sehat	7.5	77.8	-3.13	-4.35	severe malnutrition
18	afdan firman M	L	23.02.2008	12-Apr-12	iya	bronkiti	10.45	96.5	-3.96	-3.4	severe malnutrition
19	shauqin nidzam	L	09.10.2011	12-Apr-12	iya	baggy pa	4.23	58.5	-3.39	-4.37	severe malnutrition
20	peter hari cahyanto	L	05.06.2009	12-Apr-12	iya	demam	9.9	89	-3	-2.94	severe malnutrition
21	dewi sachi setianingsih	P	13.08.2009	12-Apr-12	iya	demam	8.4	89.7	-4.14	-3.66	severe malnutrition
22	M. afnan hakim	L	06.12.2010	12-Apr-12	tidak	sehat	7.29	76	-3.65	-3.37	severe malnutrition

no.id	status gizi BB/TB sbml	BB ssdah	TB ssdah	z-score BB/TB ssdah	z-score BB/U ssdah	status gizi BB/U ssdah	status gizi BB/TB ssdah	asup energi sbml	asup prot sbml	asup energi gabungan ssdah	asup protein gabungan ssdah	asup energi PMT
1	sangat kurus	8.05	80.9	-3.47	-2.87	moderate underweight	sangat kurus	436.5	14.4	576.89	19.83	180.39
2	sangat kurus	5	59.9	-1.77	-3.55	severe malnutrition	normal	233.1	4.3	1259.85	29.38	733.75
3	sangat kurus	7.9	81	-3.87	-3.48	severe malnutrition	sangat kurus	189.7	7.2	915.18	28.4	658.58
4	sangat kurus	10.4	87.3	-2.07	-2.79	moderate underweight	kurus	373.9	16.9	1224.13	40.26	815.93
5	sangat kurus	4.45	60.1	-4.12	-4.69	severe malnutrition	sangat kurus	326.7	5	519.83	15.08	519.83
6	sangat kurus	8.95	84.5	-3.06	-2.49	moderate underweight	sangat kurus	404.4	14	1219.13	39.9	755.33
7	sangat kurus	8.9	81.6	-2.01	-2.54	moderate underweight	kurus	290.9	14.5	1015.63	35.97	574.83
8	sangat kurus	8.65	82	-2.83	-2.94	moderate underweight	kurus	264.2	8.8	950.63	29.8	565.43
9	sangat kurus	7.1	74.5	-3.52	-3.68	severe malnutrition	sangat kurus	329.5	11.2	944.6	24.88	430.3
10	sangat kurus	8.8	82	-2.78	-2.37	moderate underweight	kurus	358.1	14.9	1012.33	32.2	420.83
11	sangat kurus	7.85	79	-2.87	-3.52	severe malnutrition	kurus	483.8	18.6	1307.78	47.04	666.88
12	sangat kurus	5.1	62	-2.55	-4.4	severe malnutrition	kurus	352.9	10	701.74	19.26	229.54
13	sangat kurus	4.55	65	-4.9	-6.22	severe malnutrition	sangat kurus	420.9	14	1054.67	31.53	587.17
14	sangat kurus	6.7	74.6	-3.53	-3.68	severe malnutrition	sangat kurus	328.6	8.8	821.95	22.75	322.25
15	sangat kurus	7.5	76.5	-2.66	-2.62	moderate underweight	kurus	410.1	11	856.37	21.72	204.17
16	sangat kurus	8.75	86.5	-3.43	-3.5	severe malnutrition	sangat kurus	187	4.6	740.17	20.8	500.17
17	sangat kurus	8.7	79.4	-1.73	-3.47	severe malnutrition	normal	529.9	19.4	1001.19	34.17	505.89
18	sangat kurus	10.85	96.3	-3.6	-3.48	severe malnutrition	sangat kurus	378.9	16.4	984.14	35.89	475.54
19	sangat kurus	5.45	61.3	-1.88	-4.05	severe malnutrition	normal	600.7	9.2	1481.98	31.18	613.08
20	sangat kurus	10.95	88.1	-1.61	-2.28	moderate underweight	normal	578.4	18.1	1612.63	51.95	698.33
21	sangat kurus	9.3	85.1	-2.4	-3.07	severe malnutrition	kurus	564.7	28.5	1416	51.37	781.6
22	sangat kurus	8.05	78.8	-3	-2.39	moderate underweight	kurus	466.6	19.3	1093.1	34.85	643

no.id	asup prot PMT	asup energi makanan ssdah	asup prot makanan ssdah	keb. Energi seharusnya	keb. Prot seharusnya	tkt. asupan energi pre	tkt. asupan prot pre	kat tkt asupan energi pre	kat tkt asupan prot pre	tkt asupan energi post
1	5.23	396.5	14.6	1170	23.4	37.31	61.54	defisit berat	defisit berat	49.31
2	21.28	526.1	8.1	592.5	11.85	39.34	36.29	defisit berat	defisit berat	212.63
3	19.1	256.6	9.3	1027.5	20.55	18.46	35.04	defisit berat	defisit berat	89.07
4	23.66	408.2	16.6	1350	27	27.7	62.59	defisit berat	defisit berat	90.68
5	15.08	0	0	618	12.36	52.86	40.45	defisit berat	defisit berat	84.11
6	21.9	463.8	18	1260	25.2	32.1	55.56	defisit berat	defisit berat	96.76
7	16.67	440.8	19.3	1188	23.76	24.49	61.03	defisit berat	defisit berat	85.49
8	16.4	385.2	13.4	1155	23.1	22.87	38.1	defisit berat	defisit berat	82.31
9	12.48	514.3	12.4	990	19.8	33.28	56.57	defisit berat	defisit berat	95.41
10	12.2	591.5	20	1185	23.7	30.22	62.87	defisit berat	defisit berat	85.43
11	19.34	640.9	27.7	1084.5	21.69	44.61	85.75	defisit berat	defisit ringan	120.59
12	6.66	472.2	12.6	702	14.04	50.27	71.23	defisit berat	defisit sedang	99.96
13	17.03	467.5	14.5	652.5	13.05	64.51	107.28	defisit berat	normal	161.63
14	9.35	499.7	13.4	1035	20.7	31.75	42.51	defisit berat	defisit berat	79.42
15	5.92	652.2	15.8	1098	21.96	37.35	50.09	defisit berat	defisit berat	77.99
16	14.5	240	6.3	1150.5	23.01	16.25	19.99	defisit berat	defisit berat	64.33
17	14.67	495.3	19.5	1125	22.5	47.1	86.22	defisit berat	defisit ringan	88.99
18	13.79	508.6	22.1	1567.5	31.35	24.17	52.31	defisit berat	defisit berat	62.78
19	17.78	868.9	13.4	634.5	12.69	94.67	72.5	defisit ringan	defisit sedang	233.57
20	20.25	914.3	31.7	1485	29.7	38.95	60.94	defisit berat	defisit berat	108.59
21	22.67	634.4	28.7	1260	25.2	44.82	113.1	defisit berat	normal	112.38
22	18.65	450.1	16.2	1093.5	21.87	42.67	88.25	defisit berat	defisit ringan	99.96

no.id	kat tkt asupan energi post	kat tkt asupan prot post	kontribusi energi PMT total	kontribusi prot PMT total	kontribusi energi makanan	kontribusi prot makanan
1	defisit berat	defisit ringan	15.42	22.36	33.89	62.39
2	normal	normal	123.84	179.57	88.79	68.35
3	defisit ringan	normal	64.1	92.94	24.97	45.26
4	defisit ringan	normal	60.44	87.64	30.24	61.48
5	defisit ringan	normal	84.12	121.97	0	0
6	defisit ringan	normal	59.95	86.92	36.81	71.43
7	defisit ringan	normal	48.39	70.16	37.1	81.23
8	defisit ringan	normal	48.96	70.99	33.35	58.01
9	defisit ringan	normal	43.46	63.02	51.95	62.63
10	defisit ringan	normal	35.51	51.49	49.92	84.39
11	normal	normal	61.49	89.16	59.1	127.71
12	normal	normal	32.7	47.41	67.26	89.74
13	normal	normal	89.99	130.48	71.65	111.11
14	defisit sedang	normal	31.14	45.15	48.28	64.73
15	defisit sedang	defisit ringan	18.59	26.96	59.4	71.95
16	defisit berat	defisit ringan	43.47	63.04	20.86	27.38
17	defisit ringan	normal	44.97	65.2	44.03	86.67
18	defisit berat	normal	30.34	43.99	32.45	70.49
19	normal	normal	96.62	140.11	136.94	105.59
20	normal	normal	47.03	68.19	61.57	106.73
21	normal	normal	62.03	89.95	50.35	113.89
22	normal	normal	58.8	85.26	41.16	74.07