

**PENGARUH PEMBERIAN  
ENERGI, KARBOHIDRAT, PROTEIN, LEMAK  
TERHADAP STATUS GIZI DAN KETERAMPILAN  
ATLET SEPAK BOLA**

Artikel Penelitian

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
studi pada Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran

Universitas Diponegoro



disusun oleh

RENJANI GINA RAMADHANI

G2C008058

PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Artikel penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Energi, Karbohidrat, Protein, Lemak terhadap Status Gizi dan Keterampilan Atlet Sepakbola” telah dipertahankan di hadapan penguji dan telah direvisi.

Mahasiswa yang mengajukan

Nama : Renjani Gina Ramadhani  
NIM : G2C008058  
Fakultas : Kedokteran  
Program Studi : Ilmu Gizi  
Universitas : Diponegoro Semarang  
Judul Artikel : Pengaruh Pemberian Energi, Karbohidrat,  
Protein, Lemak terhadap Status Gizi dan  
Keterampilan Atlet Sepak Bola

Semarang, 29 September 2012

Pembimbing,

dr. Etisa Adi Murbawani, M.Si

NIP. 19781206 200501 2 002

## **EFFECT OF ENERGY, CARBOHYDRATE, PROTEIN, FAT ON NUTRITIONAL STATUS AND SKILLS OF SOCCER ATHLETE'S**

Renjani Gina Ramadhani\*, Etisa Adi Murbawani\*\*

### **ABSTRACT**

**Background:** Good skills in soccer are very needed to accomplish the achievement. Nutritional status in soccer athletes can effect the performance on the match. Besides exercises, nutrition intake is considered to have an effect on the nutritional status and skills of soccer athletes.

**Objective:** The purpose of this study was to determine the effect of food intake on nutritional status and skills of soccer athletes.

**Methods:** An experimental study with one group pre and post test designed on soccer athletes in PPLP Central Java on June 2012. Food intake were given in 55%-60% carbohydrates, 15%-20% protein, 20%-30% fat. Anthropometry, physical fitness, skill (passing and dribbling), and nutrition intake were measured pre- and post- intervention. The data obtained were analyzed by paired t-test and Pearson correlation.

**Results:** Eighteen subjects completed this study. Significant increase in energy intake ( $p= 0,000$ ), carbohydrate ( $p= 0,000$ ), protein ( $p= 0,000$ ), fat ( $p= 0,000$ ), BMI ( $p= 0,000$ ), percent body fat ( $p= 0,031$ ), physical fitness ( $p= 0,038$ ), and passing ( $p= 0,000$ ), but no significant differences found on dribbling ( $p= 0,056$ ) after a given intervention. There was no effect of energy, carbohydrate, protein, fat on nutritional status and skills of soccer athletes ( $p> 0.05$ ).

**Conclusion:** There was no effect of energy, carbohydrate, protein, fat on nutritional status and skills of soccer athletes.

**Keywords:** food intake, soccer skills, nutritional status, soccer athletes

---

\* Nutritional Science Study Program, Faculty Of Medicine, Diponegoro University, Jl. Dr. Soetomo 14 Semarang, Email : renjanigina@gmail.com

\*\* Nutritional Science Study Program, Faculty Of Medicine, Diponegoro University, Jl. Dr. Soetomo 14 Semarang, Email : etisatitit@yahoo.com

## PENGARUH PEMBERIAN ENERGI, KARBOHIDRAT, PROTEIN, LEMAK TERHADAP STATUS GIZI DAN KETERAMPILAN ATLET SEPAK BOLA

Renjani Gina Ramadhani\*, Etisa Adi Murbawani\*\*

### ABSTRAK

**Latar belakang :** Keterampilan yang baik dalam sepak bola sangat diperlukan dalam pencapaian prestasi. Status gizi atlet sepak bola berpengaruh terhadap penampilan permainan. Selain latihan, asupan makan diduga memiliki pengaruh terhadap status gizi dan keterampilan atlet sepak bola.

**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh asupan makan terhadap status gizi dan keterampilan atlet sepak bola.

**Metode :** Merupakan penelitian eksperimental *one group pre and post test design* pada atlet sepak bola PPLP Jawa Tengah pada bulan Juni 2012. Asupan makan yang diberikan karbohidrat 55%-60%, protein 15%-20%, lemak 20%-30%. Pengukuran antropometri, kebugaran jasmani, keterampilan (*passing* dan *dribbling*), asupan makan dilakukan sebelum dan setelah intervensi. Data dianalisis dengan uji *paired t-test* dan korelasi *Pearson*.

**Hasil :** Delapan belas subjek dapat menyelesaikan penelitian. Terdapat peningkatan rerata yang bermakna pada asupan energi ( $p= 0,000$ ), asupan karbohidrat ( $p= 0,000$ ), asupan protein ( $p=0,000$ ), asupan lemak ( $p= 0,000$ ), IMT ( $p= 0,000$ ), persen lemak tubuh ( $p= 0,031$ ), kebugaran jasmani ( $p= 0,038$ ), dan *passing* ( $p= 0,000$ ), tidak terdapat perbedaan rerata bermakna pada *dribbling* ( $p= 0,056$ ) setelah intervensi diberikan. Tidak terdapat pengaruh pemberian energi, karbohidrat, protein, lemak terhadap status gizi dan keterampilan atlet sepak bola ( $p>0,05$ ).

**Simpulan :** Tidak terdapat pengaruh pemberian energi, karbohidrat, protein, lemak terhadap status gizi dan keterampilan atlet sepak bola.

**Kata Kunci :** asupan makan, keterampilan sepak bola, status gizi, atlet sepak bola

---

\* Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Jl. Dr. Soetomo 14 Semarang, Email : renjanigina@gmail.com

\*\* Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Jl. Dr. Soetomo 14 Semarang, Email : etisatitit@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Pencapaian prestasi dalam olahraga sepak bola tergantung pada tingkat keterampilan taktis, teknik, serta kesegaran jasmani para pemainnya.<sup>1</sup> Keterampilan pemain sepak bola berkaitan dengan kemampuan penguasaan maupun pengembangan teknik dasar dalam permainan sepak bola yang diantaranya meliputi teknik menendang bola, menghentikan bola, menerima bola, menyundul bola, menggiring bola (*dribbling*), mengoper bola (*passing*), serta teknik khusus untuk penjaga gawang.<sup>2</sup> Tingkat keterampilan atlet dipengaruhi oleh tingkat kesegaran jasmani.<sup>3</sup>

Kesegaran jasmani merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa kelelahan yang berlebihan.<sup>4</sup> Kesegaran jasmani yang baik merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam pertandingan sepak bola, sehingga memiliki kesegaran jasmani yang baik pada masing-masing pemain merupakan suatu keharusan.<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan pada atlet sepak bola Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang (PSIS) menunjukkan 57,8% atlet memiliki kategori kesegaran jasmani baik dan baik sekali sebesar sedangkan sebesar 42,2% tergolong sedang, kurang dan kurang sekali.<sup>6</sup> Penelitian lain yang dilakukan pada siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) di Malang menunjukkan bahwa hanya 20,4% siswa yang memiliki kesegaran jasmani baik dan baik sekali sedangkan sisanya sebesar 79,6% siswa memiliki kesegaran jasmani sedang, kurang, dan kurang sekali.<sup>7</sup> Atlet sepak bola yang berada di asrama rata-rata memiliki kesegaran jasmani yang lebih baik dibandingkan dengan atlet yang tidak di asrama.<sup>8</sup>

Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kesegaran jasmani dan kesehatan serta menunjang pembinaan prestasi atlet. Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) dan persen lemak tubuh dapat menggambarkan status gizi seseorang. Beberapa penelitian yang dilakukan pada atlet sepak bola menunjukkan bahwa atlet yang memiliki IMT dan persen lemak tubuh optimal memiliki kesegaran jasmani yang lebih baik.<sup>6-8</sup>

Asupan makan atlet sepak bola merupakan hal penting yang perlu diperhatikan selain latihan. Asupan zat gizi tidak memberikan jaminan bahwa atlet dapat meraih prestasi, tetapi apabila asupan zat gizi tidak mencukupi akan berpengaruh pula terhadap performa atlet karena atlet tidak dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki secara maksimal meskipun program latihan yang dijalani sudah sesuai.<sup>9</sup> Tingginya intensitas latihan dan jadwal pertandingan yang padat perlu didukung dengan pengaturan makan yang baik agar atlet mendapatkan asupan zat gizi yang sesuai untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani dan status gizi yang optimal.<sup>10</sup> Usia remaja merupakan masa pertumbuhan, sehingga pada atlet usia remaja membutuhkan energi tingkat tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas olahraga.<sup>11</sup>

Pembinaan atlet sepak bola dengan sistem asrama diharapkan mampu memberikan program latihan yang tersusun dengan baik diikuti dengan pengaturan asupan zat gizi yang terpantau dengan baik. Salah satu pusat pembinaan atlet sepak bola yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) Jawa Tengah. Beberapa prestasi yang diraih oleh tim sepak bola PPLP Jawa Tengah diantaranya Juara 1 Kejuaraan Nasional di Semarang, dan Juara 2 Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Pekanbaru pada tahun 2011.

Pemenuhan gizi pada atlet sepak bola yang di PPLP Jawa Tengah belum terpenuhi dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 20 atlet sepak bola PPLP Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 70% atlet mengalami defisiensi energi tingkat berat dan 30% atlet mengalami defisiensi energi tingkat sedang. Rata-rata asupan energi atlet tersebut 2770-2843 kkal, sedangkan energi yang dibutuhkan sebesar 4176-4354 kkal.<sup>12</sup>

Penelitian mengenai pengaruh asupan makan terhadap keterampilan atlet sepak bola belum banyak dilakukan. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian energi, karbohidrat, protein, lemak terhadap status gizi dan keterampilan atlet sepak bola.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental *one group pre and post test design* yang dilakukan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Jawa Tengah pada bulan Juni 2012 pada atlet sepak bola usia 15-18 tahun. Penelitian ini termasuk dalam lingkup gizi masyarakat. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *consecutive sampling*, seluruh atlet sepak bola PPLP Jawa Tengah yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia mengikuti penelitian menjalani intervensi.

Penelitian dilakukan selama 13 hari dengan sebelas hari intervensi asupan makan dan dua hari pengambilan data awal dan akhir. Pengambilan data pengukuran awal dan akhir berupa survei asupan makan, pengukuran antropometri (berat badan, persen lemak tubuh, dan tinggi badan), penilaian tes kebugaran jasmani dan keterampilan. Gambaran asupan makan subjek penelitian diperoleh dengan menggunakan *food recall* 24 jam yang dilakukan sebelum dan selama intervensi dilakukan. Berat badan diukur dengan timbangan injak digital ketelitian 0,1 kg. Persen lemak tubuh diukur menggunakan *Bioelectrical Impedance Analysis* (BIA) Omron HBF 200. Pengukuran berat badan dan persen lemak tubuh dilakukan dengan melepas alas kaki dan tetap mengenakan pakaian. Tinggi badan diukur dengan *microtoise* ketelitian 0,1 cm, dengan posisi berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Kebugaran jasmani yang diukur merupakan kebugaran jasmani berkaitan dengan keterampilan, meliputi tiga aspek pengukuran yaitu kapasitas anaerobik, daya ledak otot, kelincahan. Pengukuran kapasitas anaerobik dilakukan dengan lari cepat (*sprint*) 50 meter. Lari cepat diukur catatan waktu yang dibutuhkan untuk berlari dari titik *start* hingga *finish* menggunakan *stopwatch* dengan ketelitian 0,01 detik. Pengukuran daya ledak otot dilakukan dengan loncat tegak (*vertical jump*). Loncat tegak dilakukan sebanyak dua kali pengulangan dan hasil yang diambil adalah hasil terbaik dari dua lompatan yang dilakukan. Pengukuran kelincahan dilakukan dengan lari *zig zag* melewati rintangan dan catatan waktu diukur menggunakan *stopwatch* dengan ketelitian 0,01 detik. Hasil dari ketiga aspek ini kemudian dikategorikan sehingga didapatkan hasil tingkat kebugaran jasmani. Keterampilan sepak bola diukur

dengan dua aspek penilaian yaitu *passing* dan *dribbling* bola. *Passing* bola dilakukan tiga kali kemudian dicatat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan *passing* bola secara tepat. *Dribbling* bola dilakukan dengan menggiring bola melewati rintangan dari titik *start* hingga *finish*, hasil yang diperoleh adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan *dribbling* bola dari titik *start* hingga mencapai *finish*. Catatan waktu diukur menggunakan *stopwatch* dengan ketelitian 0,01 detik.

Intervensi yang diberikan dalam penelitian ini berupa asupan makan yang diberikan sesuai dengan rata-rata kebutuhan atlet sepak bola yang dihitung berdasarkan berat badan, tinggi badan, serta aktivitas fisik yaitu sebesar 4469,7 kkal  $\pm$  10% (4022,1 kkal-4915,9 kkal) dengan komposisi karbohidrat 55%-60%, protein 15%-20%, lemak 20%-30% dari total energi. Asupan makan diberikan dalam bentuk tiga kali makan utama dan tiga kali *snack*. Jadwal makan utama disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola catering. *Snack* diberikan pagi hari setelah latihan, siang hari setelah latihan, dan malam hari setelah makan malam.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan program komputer. Data terlebih dahulu diuji normalitas menggunakan *Saphiro-Wilk*. Perbedaan asupan makan, status gizi, kesegaran jasmani, dan keterampilan baik sebelum maupun setelah intervensi diuji menggunakan *paired t-test* apabila data berdistribusi normal menggunakan uji *Wilcoxon* bila data tidak berdistribusi normal. Hubungan asupan energi, karbohidrat, protein, lemak terhadap status gizi dan keterampilan dianalisis dengan uji kolerasi *Pearson*. Data asupan makan diperoleh melalui *food recall* kemudian dianalisis menggunakan program *nutrisurvey*.



## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada 24 atlet sepak bola PPLP Jawa Tengah . Dari jumlah tersebut hanya 21 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Selama penelitian berlangsung terdapat 3 orang subjek yang tidak dapat melanjutkan penelitian karena 2 subjek pulang ke rumah masing-masing dan 1 orang sakit sehingga tidak mengikuti tes pada pengambilan data akhir penelitian. Data akhir yang diperoleh dan dapat dianalisis adalah 18 orang.

Karakteristik subjek penelitian ditampilkan pada Tabel 1 yang meliputi rerata tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, persen lemak tubuh, asupan energi, kebutuhan energi, asupan protein, asupan lemak, kesegaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, *passing* dan *dribbling* bola yang merupakan bagian dari tes keterampilan.

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik subjek	n	Rerata $\pm$ SD	Median (minimum - maksimum)
Indeks Massa Tubuh (IMT) (kg/m <sup>2</sup> )	18	21,8 $\pm$ 2,56	21,64 (18,68 – 28,94)
Persen lemak tubuh (%)	18	16,5 $\pm$ 2,72	17,05 (11,10 – 21,00)
Asupan energi (kcal)	18	2509,0 $\pm$ 522,79	2432,05(1772,80–3373,80)
Kebutuhan energi (kcal)	18	4468,1 $\pm$ 378,59	4334,70(4028,70-5442,20)
Asupan karbohidrat (g)	18	411,7 $\pm$ 90,31	400,40 (295,50 – 596,30)
Asupan protein (g)	18	73,3 $\pm$ 15,52	71,70 (48,80 – 100,10)
Asupan lemak (g)	18	65,8 $\pm$ 15,84	63,30 (45,80 – 92,40)
Kesegaran jasmani (skor)	18	9,4 $\pm$ 0,70	9,00 (8,00 – 11,00)
<i>Passing</i> bola (detik)	18	25,8 $\pm$ 1,48	25,63 (23,73 – 29,59)
<i>Dribbling</i> bola (detik)	18	27,6 $\pm$ 1,75	27,42 (25,06 – 32,31)

Pengukuran indeks massa tubuh menunjukkan rerata indeks massa tubuh subjek 21,8 $\pm$ 2,56 kg/m<sup>2</sup>. Berdasarkan kurva persentil indeks massa tubuh menurut umur (5-19 tahun) diketahui status gizi sebagian besar subjek (83,33%) tergolong normal. Rerata persen lemak tubuh subjek adalah 16,5 $\pm$ 2,72. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar subjek (72,22%) memiliki persen lemak tubuh normal (10-18%), dan (27,77%) subjek memiliki persen lemak tubuh lebih dari normal.

Hasil perhitungan kebutuhan subjek, didapatkan rerata kebutuhan energi sebesar 4468,1±378,59 kkal. Berdasarkan *food recall* 2x24 jam menunjukkan bahwa rerata asupan energi subjek sebesar 2509,0±522,79 kkal, asupan karbohidrat 411,7±90,31 g, asupan protein 73,3±15,52 g, asupan lemak 65,8±15,84 g. Sebagian besar subjek (83,33%) mengalami defisiensi energi tingkat berat dengan asupan kurang dari 70% kebutuhan energi.

Median skor tes kesegaran jasmani adalah 9,0 dengan skor tertinggi 11 dan skor terendah 8. Sebagian besar subjek (55,55%) memiliki kesegaran jasmani yang tergolong sedang (skor 8-9). Hasil pengukuran keterampilan menunjukkan rerata waktu yang diperlukan untuk melakukan *passing* bola adalah 25,8±1,48 detik dengan catatan waktu tercepat 23,73 detik dan waktu terlama 29,59 detik. Rerata waktu yang diperlukan untuk melakukan *dribbling* bola adalah 27,60±1,75 detik, dengan catatan waktu tercepat 25,06 detik dan waktu terlama 32,31 detik.

### Perbedaan Hasil Pengukuran Sebelum dan Setelah Intervensi

Perbedaan asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak subjek sebelum dan setelah intervensi ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Rerata Dan Simpang Baku Sebelum dan Setelah Intervensi

Pengukuran	Rerata ± SD		Δ	p
	Sebelum	Setelah		
Asupan energi (kkal)	2509,0 ± 522,79	4055,9 ± 167,88	1546,9	0,000*
Asupan karbohidrat (g)	411,7 ± 90,31	636,9 ± 40,45	225,2	0,000*
Asupan protein (g)	73,3 ± 15,52	124,0 ± 10,40	50,7	0,000*
Asupan lemak (g)	65,8 ± 15,84	126,2 ± 8,24	60,4	0,000*
Indeks Massa Tubuh (IMT) (kg/m <sup>2</sup> )	21,8 ± 2,56	22,0 ± 2,54	0,2	0,000*
Persen lemak tubuh (%)	16,5 ± 2,72	16,9 ± 2,51	0,4	0,031*
<i>Dribbling</i> bola (detik)	27,6 ± 1,75	26,6 ± 1,58	1,0	0,056

\**Paired t-test* terdapat perbedaan yang bermakna ( $p < 0,05$ )

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada rerata asupan energi ( $p = 0,000$ ), karbohidrat ( $p = 0,000$ ), lemak ( $p = 0,000$ ), dan protein ( $p = 0,000$ ) sebelum dan setelah intervensi. Keseluruhan subjek mengalami peningkatan berat badan diikuti dengan meningkatnya indeks massa tubuh setelah intervensi. Terdapat perbedaan rerata

indeks massa tubuh yang bermakna sebelum dan setelah intervensi ( $p = 0,000$ ). Pada pengukuran persen lemak tubuh, terjadi kenaikan persen lemak tubuh pada empat belas subjek (77,77%), dari jumlah tersebut sepuluh subjek masuk dalam kategori normal, empat subjek masuk dalam kategori lebih dari normal. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata persen lemak tubuh yang bermakna sebelum dan setelah intervensi ( $p = 0,031$ ). Tidak terdapat perbedaan rerata yang bermakna pada tes *dribbling* bola sebelum dan setelah intervensi ( $p = 0,056$ ).

Perbedaan hasil tes kebugaran jasmani dan *passing* bola pada subjek sebelum dan setelah intervensi ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan Median Sebelum dan Setelah Intervensi

Pengukuran	Median (minimum – maksimum)		$\Delta$	$p$
	Sebelum	Setelah		
Kesegaran jasmani berkaitan dengan keterampilan (skor)	9,00 (8,00-11,00)	10,00 (9,00-12,00)	1,00	0,038*
<i>Passing</i> bola (detik)	25,63(23,73-29,59)	24,08(23,12-27,36)	1,55	0,000*

\**Wilcoxon* terdapat perbedaan yang bermakna ( $p < 0,05$ )

Hasil analisis statistik pengukuran kebugaran jasmani berkaitan dengan keterampilan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kebugaran jasmani antara sebelum dan setelah intervensi ( $p = 0,038$ ). Terdapat sembilan subjek yang memiliki kebugaran jasmani dengan skor tetap baik sebelum dan setelah intervensi, delapan subjek mengalami peningkatan kebugaran jasmani setelah intervensi, dan satu orang mengalami penurunan kebugaran jasmani setelah intervensi. Pada tes *passing* bola, keseluruhan subjek memiliki catatan waktu yang lebih cepat setelah intervensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan catatan waktu pada *passing* bola sebelum dan setelah intervensi ( $p = 0,000$ ).

## Hubungan Variabel Bebas, Variabel Kontrol, dan Variabel Terikat

Hubungan antara asupan, IMT, persen lemak tubuh, *dribbling* bola ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan antara asupan, IMT, persen lemak tubuh, dan *dribbling* bola

		Asupan energi	Asupan karbohidrat	Asupan lemak	Asupan protein
IMT	r	-0,158	-0,149	0,113	0,028
	p	0,531	0,555	0,655	0,912
	n	18	18	18	18
Persen lemak tubuh	r	-0,185	-0,217	0,256	0,071
	p	0,462	0,386	0,306	0,779
	n	18	18	18	18
<i>Dribbling</i> bola	r	0,233	0,235	-0,141	0,255
	p	0,353	0,348	0,576	0,307
	n	18	18	18	18

Korelasi *Pearson*, terdapat hubungan bermakna ( $p < 0,05$ )

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan energi, karbohidrat protein, lemak dengan IMT, persen lemak tubuh, *dribbling* bola dengan nilai  $p > 0,05$ .

Hubungan antara asupan, kebugaran jasmani, dan *passing* bola ditampilkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hubungan antara asupan, kebugaran jasmani, dan *passing* bola

		Asupan energi	Asupan karbohidrat	Asupan lemak	Asupan protein
Kebugaran jasmani	r	-0,169	-0,414	0,360	0,034
	p	0,502	0,088	0,142	0,895
	n	18	18	18	18
<i>Passing</i> bola	r	0,234	0,416	-0,329	0,166
	p	0,349	0,086	0,182	0,510
	n	18	18	18	18

Korelasi *Spearman*, terdapat hubungan bermakna ( $p < 0,05$ )

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan energi, karbohidrat, protein, lemak dengan kebugaran jasmani, dan *passing* bola dengan nilai  $p > 0,05$ .

## PEMBAHASAN

Pada penelitian ini melibatkan 18 subjek atlet sepak bola yang tergabung dalam satu kelompok perlakuan. Rerata usia subjek yaitu  $17,3 \pm 0,90$  tahun, dengan usia termuda 15 tahun dan subjek tertua berusia 18 tahun. Berdasarkan pengukuran antropometri didapatkan rerata indeks massa tubuh subjek  $21,8 \pm 2,56$   $\text{kg/m}^2$  dengan rerata persen lemak tubuh  $16,5 \pm 2,72\%$ . Sebagian besar subjek (83,33%) memiliki status gizi normal dan 72,22% subjek memiliki persen lemak tubuh normal. Rerata asupan energi subjek sebesar  $2509,0 \pm 522,79$  kkal, besarnya asupan energi subjek masih berada dibawah rerata kebutuhan  $4468,1 \pm 378,59$ . Sebagian besar subjek (83,33%) mengalami defisiensi energi tingkat berat. Median skor tes kesegaran jasmani adalah 9,0. Sebagian besar subjek (55,55%) memiliki kesegaran jasmani yang tergolong sedang (skor 8-9). Rerata waktu yang diperlukan untuk melakukan *passing* bola adalah  $25,85 \pm 1,48$  dan untuk *dribbling* bola  $27,6 \pm 1,75$  detik.

Asupan makan subjek penelitian mengalami perubahan yang bermakna sebelum dan setelah intervensi diberikan. Rerata peningkatan asupan makan yaitu dari  $2509,0 \pm 522,79$  kkal menjadi  $4055,9 \pm 167,88$  kkal. Rerata asupan makan subjek sebelum intervensi berada di bawah kebutuhan apabila dibandingkan dengan kebutuhan energi yang mempertimbangkan kebutuhan energi basal (BMR), *Specific Dynamic Action* (SDA), aktivitas fisik serta tambahan energi 10% untuk pertumbuhan. Sebelum intervensi diberikan sebagian besar subjek (83,33%) mengalami defisiensi tingkat berat. Kurangnya asupan energi pada subjek dikarenakan ada faktor kurangnya kesadaran subjek terhadap kebutuhan energi yang harus terpenuhi dan peranan zat gizi dalam menunjang stamina. Setelah intervensi diberikan, sebagian besar subjek (83,33%) memiliki kategori asupan baik. Asupan zat gizi tidak memberikan jaminan bahwa atlet dapat meraih prestasi, tetapi pemenuhan asupan zat gizi yang adekuat pada atlet usia remaja sangatlah penting karena kekurangan asupan zat gizi dalam jangka panjang akan mengganggu proses perkembangan, pertumbuhan, perkembangan otot, serta mempengaruhi performa.<sup>9,11</sup>

Terjadi perubahan yang bermakna pada indeks massa tubuh subjek sebelum dan setelah intervensi. Perubahan ini terjadi seiring dengan peningkatan berat badan yang dialami oleh subjek. Rerata indeks massa tubuh subjek meningkat dari  $21,8 \pm 2,56 \text{ kg/m}^2$  menjadi  $22,0 \pm 2,54 \text{ kg/m}^2$ . Peningkatan berat badan subjek bervariasi berkisar antara 100 gram hingga 1600 gram. Perubahan indeks massa tubuh yang bermakna pada subjek tidak mengubah status gizi yang dimiliki oleh subjek. Lima belas subjek memiliki status gizi yang normal sebelum dan setelah intervensi, dua subjek tetap memiliki status gizi gemuk, dan satu subjek tetap memiliki status gizi obesitas baik sebelum maupun setelah diberikan intervensi. Pada penelitian ini pemberian intervensi selama 11 hari hanya dapat melihat perubahan pada berat badan, dan tidak terdapat perubahan pada tinggi badan subjek. Dibutuhkan penelitian dengan waktu yang lebih panjang untuk dapat melihat perubahan yang terjadi pada status gizi.

Rerata persen lemak tubuh subjek mengalami peningkatan sebelum dan setelah intervensi dari  $16,5 \pm 2,72\%$  menjadi  $16,9 \pm 2,51\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa rerata persen lemak tubuh subjek masih dalam batas normal untuk atlet sepak bola 10%-18%.<sup>13</sup> Sebagian besar subjek (83,33%) memiliki persen lemak tubuh normal. Satu subjek yang memiliki status gizi obesitas memiliki persen lemak tubuh lebih dari normal. Dua subjek yang memiliki status gizi gemuk, salah satu diantaranya memiliki persen lemak tubuh lebih dari normal, sedangkan yang lain memiliki persen lemak tubuh normal. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa status gizi gemuk pada atlet tidak selalu mengindikasikan semakin meningkatnya jumlah cadangan lemak dalam tubuh tetapi dapat terjadi karena meningkatnya massa otot.<sup>14</sup> Pada penelitian ini hanya melihat persen lemak tubuh pada atlet tetapi tidak dilakukan pengukuran terhadap massa otot, sehingga perbandingan massa otot dan massa lemak tidak dapat diketahui. Atlet dengan status gizi gemuk dan obesitas dengan persen lemak lebih dari normal dimungkinkan memiliki proporsi massa otot yang lebih tinggi dibandingkan massa lemak. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan indeks massa tubuh disebabkan oleh peningkatan persen lemak tubuh dan massa otot.<sup>14</sup>

Posisi permainan dalam sepak bola turut mempengaruhi komposisi tubuh yang dimiliki oleh atlet sepak bola.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, subjek dengan status gizi gemuk dan persen lemak tubuh lebih dari normal menempati posisi sebagai penjaga gawang, sedangkan subjek yang memiliki status gizi obesitas dengan persen lemak tubuh lebih dari normal menempati posisi sebagai pemain bertahan. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penjaga gawang memiliki tinggi badan dan berat badan yang lebih dibandingkan dengan pemain lain. Postur badan tinggi besar dibutuhkan oleh penjaga gawang karena tugasnya menghalau bola masuk ke dalam gawang, selain itu ditemukan bahwa persen lemak tubuh yang dimiliki oleh penjaga gawang lebih tinggi dibandingkan pemain lain. Penjaga gawang dan pemain bertahan hanya bermain kurang dari setengah lapangan dan intensitas berlari lebih sedikit dibandingkan pemain depan sehingga penggunaan energi juga lebih sedikit, hal ini yang memungkinkan persen lemak tubuh yang dimiliki oleh penjaga gawang dan pemain bertahan lebih tinggi dibanding pemain tengah.<sup>16,17</sup>

Berdasarkan uji statistik tidak didapat pengaruh asupan makan terhadap indeks massa tubuh dan persen lemak tubuh, namun secara teori asupan makan memberikan pengaruh terhadap peningkatan indeks massa tubuh dan persen lemak tubuh. Peningkatan asupan energi sebesar 500 hingga 1000 kkal yang disertai dengan latihan dapat meningkatkan berat badan atlet.<sup>18</sup> Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada atlet sepak bola menunjukkan bahwa peningkatan asupan, dapat meningkatkan berat badan dan persen lemak tubuh.<sup>19</sup> Kelebihan energi pada saat melakukan aktivitas akan disimpan, umumnya disimpan dalam bentuk glikogen atau sebagai triasilgliserol di jaringan adiposa. Hal ini memungkinkan adanya peningkatan massa lemak tubuh yang menimbulkan terjadinya peningkatan berat badan diikuti dengan peningkatan indeks massa tubuh.<sup>20</sup> Terjadinya peningkatan berat badan pada atlet tergantung pada faktor genetik, tingkat keseimbangan energi positif, jumlah waktu istirahat dan waktu pemulihan, serta jenis program latihan yang dijalani.<sup>18</sup>

Kesegaran jasmani merupakan komponen penting yang harus dimiliki atlet untuk mencapai prestasi. Tanpa kesegaran jasmani yang prima, prestasi akan sulit

tercapai walaupun atlet memiliki keterampilan teknik dan taktik yang baik.<sup>5</sup> Kesegaran jasmani yang diukur dalam penelitian ini adalah kesegaran jasmani berkaitan dengan keterampilan yang terdiri dari kapasitas anaerobik, daya ledak otot, dan kelincahan. Kapasitas anaerobik merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Pengukuran kapasitas anaerobik dilakukan dengan lari cepat (*sprint*) 50 meter.<sup>21</sup> Daya ledak otot yaitu kemampuan otot untuk berkontraksi dengan sangat cepat, merupakan kekuatan otot yang dikeluarkan secara maksimum dalam kecepatan maksimum. Daya ledak otot merupakan faktor penting yang digunakan untuk melompat maupun menendang bola. Pengukuran daya ledak otot dilakukan dengan loncat tegak (*vertical jump*). Kelincahan berhubungan dengan kemampuan mengubah dan mengontrol arah maupun posisi secara cepat dan efisien.<sup>22</sup> Pengukuran kelincahan dilakukan dengan lari *zig zag* melewati rintangan. Rerata catatan waktu subjek dalam melakukan lari cepat 50 m menurun dari  $6,94 \pm 0,24$  detik sebelum intervensi menjadi  $7,09 \pm 0,30$  setelah intervensi, meskipun demikian catatan waktu lari cepat subjek tergolong baik. Rerata kemampuan loncat tegak subjek mengalami peningkatan dari  $50,38 \pm 6,77$  cm sebelum intervensi menjadi  $52,05 \pm 5,97$  cm setelah intervensi dengan kategori kurang. Rerata catatan waktu lari *zig zag* subjek mengalami peningkatan dari  $6,30 \pm 0,31$  detik dengan kategori baik menjadi  $5,94 \pm 0,26$  detik setelah intervensi dengan kategori baik sekali.

Terjadi peningkatan kesegaran jasmani yang bermakna pada subjek setelah pemberian intervensi. Median skor kesegaran jasmani subjek mengalami peningkatan dari 9,00 (8,00-11,00) dengan kategori sedang menjadi 10,00 (9,00-12,00) dengan kategori baik. Hasil dari tes kesegaran jasmani menunjukkan bahwa tidak semua atlet memiliki kesegaran jasmani dengan kategori baik. Diharapkan semua atlet sepak bola memiliki kesegaran jasmani yang baik untuk menunjang performa selama latihan maupun bertanding.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan yang bermakna antara kesegaran jasmani sebelum dan setelah intervensi dilakukan, tetapi tidak terdapat pengaruh yang bermakna dari asupan zat gizi terhadap kesegaran jasmani. Tidak terdapatnya pengaruh yang bermakna dapat terjadi karena kesegaran jasmani



dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya latihan fisik, genetik, komposisi tubuh. Pada penelitian ini tidak terdapat subjek yang memiliki kebugaran jasmani dengan kategori kurang, dimungkinkan faktor latihan fisik yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Hal ini dikarenakan subjek telah memiliki program latihan fisik yang dijalani secara teratur dengan sebelas kali sesi latihan dalam satu minggu untuk mengoptimalkan komponen kebugaran jasmani seperti kecepatan, kekuatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, daya ledak otot, kelenturan, daya tahan kardiorespirasi, serta daya tahan otot. Penelitian yang dilakukan pada remaja usia 17 hingga 20 tahun menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara latihan fisik dan kebugaran jasmani, yaitu semakin tinggi frekuensi dan durasi latihan fisik maka tingkat kebugaran jasmani akan semakin baik. Latihan fisik yang terprogram bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani.<sup>23</sup> Latihan fisik merupakan bagian dari aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, serta dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran jasmani. Latihan fisik yang berulang dan terus menerus akan menimbulkan reaksi biologis berupa penyesuaian diri atau adaptasi dari organ-organ tubuh.<sup>24</sup>

Keterampilan teknik yang diukur dalam penelitian ini adalah keterampilan *passing* dan *dribbling* bola. *Passing* bola merupakan teknik mengalirkan atau mengoper bola, dalam *passing* bola diperlukan kekuatan (*power*), kecepatan, koordinasi mata-kaki.<sup>25</sup> *Dribbling* merupakan keterampilan dalam menggiring bola. Diperlukan kekuatan, kelincahan, kecepatan, koordinasi mata-kaki, keseimbangan, kecepatan reaksi yang baik pada saat melakukan *dribbling* agar atlet dapat melakukan kontrol bola dengan baik sehingga bola tetap dalam penguasaan pada saat melewati lawan.<sup>26</sup>

Keterampilan *passing* bola subjek penelitian mengalami perubahan yang bermakna sebelum dan setelah intervensi, dengan catatan waktu yang semakin cepat dari 25,63 detik menjadi 24,08 detik, artinya catatan waktu semakin cepat 1,55 detik. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada *dribbling* bola sebelum dan setelah intervensi, tetapi terdapat peningkatan kecepatan *dribbling* bola sebelum dan setelah intervensi dari  $27,60 \pm 1,75$  detik menjadi  $26,61 \pm 1,58$  detik,

terjadi peningkatan kecepatan 1,01 detik. Tidak terdapatnya perubahan yang berarti pada *dribbling* bola yang dilakukan oleh subjek dapat terjadi karena kemampuan *dribbling* pada subjek tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kelincahan, daya ledak otot, serta kapasitas anaerobik yang diukur dalam penelitian ini, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini yaitu keseimbangan dan koordinasi mata-kaki. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terjadi peningkatan catatan waktu pada lari cepat 50 meter, yang memiliki arti terjadi penurunan kecepatan lari yang dilakukan oleh subjek. Penurunan performa lari cepat pada subjek tidak menurunkan performa pada keterampilan yaitu *passing* dan *dribbling* bola. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penurunan performa lari cepat tidak menurunkan performa *dribbling* bola pada atlet sepak bola. Performa *dribbling* bola lebih membutuhkan teknik keterampilan dibandingkan dengan kapasitas daya tahan (*endurance*).<sup>27</sup>

Pada saat sebelum penelitian dengan asupan makan yang kurang dari kebutuhan tidak mempengaruhi kemampuan subjek dalam melakukan *dribbling* bola sehingga catatan waktu sebelum dan setelah intervensi dilakukan tidak berbeda secara bermakna. Pada penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh asupan tinggi karbohidrat terhadap kemampuan *dribbling* dan *shooting* atlet sepak bola, menemukan bahwa setelah pemberian asupan makan tinggi karbohidrat tidak terjadi peningkatan kemampuan *dribbling* dan *shooting* pada atlet sepak bola.<sup>28</sup> Hal ini kemungkinan terjadi karena depleksi glikogen yang mungkin terjadi saat asupan makan kurang dari kebutuhan tidak mengurangi kemampuan keterampilan atlet.<sup>29</sup> Beberapa penelitian menemukan bahwa ketika seseorang melakukan olahraga dengan kondisi glikogen otot tubuhnya rendah, maka terjadi peningkatan transkripsi dari beberapa gen terkait dengan kontraksi otot yang terlibat dalam adaptasi tubuh selama berolahraga sehingga otot tetap dapat melakukan kontraksi.<sup>30-32</sup> Hal ini terkait dengan faktor transkripsi yang terlibat yaitu domain pengikat glikogen, ketika glikogen otot rendah faktor-faktor ini akan dilepas dan menjadi bebas untuk berikatan dengan protein target yang berbeda.<sup>33</sup> Pada kenyataannya, latihan dengan glikogen otot yang tinggi

memungkinkan atlet untuk melakukan latihan dalam jangka waktu yang lama dan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Asupan zat gizi yang optimal selama olahraga dan aktivitas sangat penting untuk menyediakan cadangan energi yang digunakan sebagai bahan bakar selama berolahraga sehingga atlet tidak mudah lelah.<sup>33,34</sup>

Tidak adanya pengaruh asupan makan terhadap keterampilan berupa *passing* dan *dribbling* bola pada subjek dimungkinkan adanya faktor lain yang mempengaruhinya. Keterampilan pada atlet lebih banyak dipengaruhi oleh faktor latihan yang dilakukan, subjek telah memiliki latihan rutin yang terprogram dengan baik. Latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat meningkatkan dan memperbaiki keterampilan atlet sepak bola, sehingga tingkat keterampilan yang dimiliki tidak mudah menurun.<sup>35</sup> Penurunan keterampilan seperti *passing* dan *dribbling* bola lebih dipengaruhi oleh faktor kelelahan karena dehidrasi maupun meningkatnya produksi asam laktat.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil uji statistik terdapat beberapa korelasi negatif, yaitu hubungan antara asupan energi dengan indeks massa tubuh, persen lemak tubuh, dan kesegaran jasmani. Terdapat pula korelasi negatif antara asupan karbohidrat dengan indeks massa tubuh, persen lemak tubuh, dan kesegaran jasmani, serta korelasi negatif antara asupan lemak dengan *passing* dan *drbbling* bola. Hal ini dimungkinkan karena dipengaruhi oleh beberapa hal yang terjadi pada saat pengambilan data asupan makan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah subjek penelitian yang minimal menyebabkan adanya kemungkinan bias dalam penelitian. Pengukuran persen lemak tubuh menggunakan BIA injak tidak dapat mengukur persen lemak tubuh secara keseluruhan.

## **SIMPULAN**

Pada penelitian ini tidak didapatkan adanya pengaruh pemberian energi, karbohidrat, protein, lemak terhadap status gizi dan keterampilan pada atlet sepak bola. Rerata asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak subjek mengalami peningkatan yang bermakna sebelum dan setelah intervensi. Terjadi peningkatan yang bermakna pada rerata indeks massa tubuh subjek dan persen lemak tubuh subjek mengalami peningkatan bermakna sebesar.

Skor kesegaran jasmani subjek mengalami peningkatan sebelum dan setelah intervensi. Catatan waktu *passing* bola yang dilakukan subjek mengalami peningkatan yang bermakna sebelum dan setelah intervensi. Terjadi peningkatan pada catatan waktu *dribbling* bola, tetapi tidak terdapat perbedaan yang bermakna sebelum dan setelah intervensi.

## **SARAN**

Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian energi, karbohidrat, protein, lemak terhadap status gizi dan keterampilan atlet sepak bola perlu dilakukan dengan jumlah subjek penelitian yang lebih banyak dan jangka waktu yang lebih lama, dengan mempertimbangkan faktor intensitas latihan yang dapat mempengaruhi keterampilan atlet sepak bola. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pada atlet mengenai aturan pola makan yang benar secara kualitas maupun kuantitas untuk mencapai gizi yang seimbang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Terima kasih penulis sampaikan kepada subjek penelitian serta para pelatih sepak bola di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Jawa Tengah yang telah bekerjasama dengan baik dan membantu terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan yang telah diberikan, kepada para penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini, serta kepada keluarga dan teman-teman atas doa, motivasi dan dukungannya selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Stolen T, Chamari K, Castagna C, Wisloff U. Physiology of soccer : an update. Sport Medicine. [serial online] 2005 [cited 2012 February 20]; 35(6); p.501-36. Available from URL: <http://www.skautingtimdif.rs>
2. Sucipto. Sepak Bola. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Direktorat Jenderal Dikti; 2000.p. 17
3. Tomi V, Minna B, Keijo H. Development of body composition, hormone profile, physical fitness, general perceptual motor skills, soccer skills and on – the – ball performance in soccer specific laboratory test among adolescent soccer player. Journal of Sports Science and Medicine. [serial online] 2010 [cited 2012 March 29]; 9: p.547-56. Available from : URL: <http://www.jssm.org/vol9/n4/3/v9n4-3pdf.pdf>
4. Clark JR. Positional assessment and physical fitness characteristic of male professional soccer players in South Africa. African Journal of Physical, Health Education, Recreation and Dance. [serial online] December 2007 [cited 2012 February 10]; 13(4); p. 453-64. Available from : URL : <http://www.repository.up.ac.za>.
5. Rosidi Ali. Hubungan status gizi, status kesehatan dan aktivitas fisik dengan kesegaran jasmani atlet PSIS Semarang [Tesis]. Institut Pertanian Bogor; 2000.
6. Fajar I, Tapriadi, I. N. Tami. Pola konsumsi, status gizi dan kesegaran jasmani siswa sekolah sepak bola di Malang [skripsi]. Edisi 29. Jakarta: Binadiknakes; 1998.
7. Sardjono W. Hubungan tingkat komsumsi energi, karbohidrat, BMI dan presentase lemak tubuh dengan tingkat kesegaran jasmani atlet sepakbola yunior pada periode latihan [skripsi]. Universitas Diponegoro Semarang; 2009.
8. Wulandari Tabitha SH. Pengaruh asrama atlet sepakbola terhadap status gizi (IMT dan kadar Hb), aktifitas fisik dan kesegaran jasmani [Tesis]. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang; 2004.

9. Sihadi. Sport and nutrition. Jurnal Kedokteran Yarsi. [serial online] 2006 [cited 2012 March 1]; 14(1); p.78-84. Available from : URL: <http://www.repository.univpancasila.ac.id/dmdocuments/Gizi%2520dan%2520olahraga.pdf>.
10. Irawan MA. Nutrisi, energi dan performa olahraga. Polton Sports Science and Performance Lab. [serial online] 2007 [cited 2012 February 2]; [13 screens]. Available from : URL :[http:// www.pssplab.com/journal/04.pdf](http://www.pssplab.com/journal/04.pdf).
11. Primiana DA. Pemenuhan energi pada olahraga. Pedoman Pelatihan Gizi Olahraga untuk Prestasi. Jakarta : Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Direktorat Gizi Masyarakat; 2000.
12. Immawati A. Pengaruh pemberian sport drink terhadap performa dan tes keterampilan pada atlet sepak bola usia 15-18 tahun [skripsi]. Universitas Diponegoro Semarang; 2011.
13. Jeukendrup A, Michael Gleeson. An introduction to energy production and performance. In : Sport Nutrition. USA : Human Kinetics; 2010. p.316
14. Pontaga Inese, Janis Zidens. Estimation of body mass index in team sports athletes. Lase Journal Of Sport Science. [serial online] February 2011 [cited 2012 July 6]; p. 33-44. Available from : URL : <http://www.lspa.lv>
15. Melchiorri G, Monteleone G, Andreoli A, Calla C, Sgroi M, De Lorenzo A. Body cell mass measured by bioelectrical impedance spectroscopy in professional football (soccer) players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. [serial online] 2007 [cited 2012 August 22]; 47(4); p. 408-12. Available from : URL: <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=20032417>
16. Heather HF, Lisa AB, Alan EM. Team Sport Athletes. In : Practical applications in sports nutrition. Boston : Jones And Bartlett Publishers; 2006. p. 431.
17. Sporis Goran, Igor Jukic, Sergej M Ostojic, Dragan Milanovic. Fitness profiling in soccer : physical and physiologic characteristics of elite players. Journal of Strength & Conditioning Research. [serial online]

October 2009 [cited 2012 July 30]; 23(7); p. 1947-53. Available from :  
URL : <http://www.journals.lww.com>

18. American Dietetic Association and Dietitians of Canada. Nutrition and athletic performance. American College of Sport Medicine. [serial online] 2000 [cited 2012 August 18]; p. 2130-45. Available from : URL : <http://aprendeenlinea.udea.edu.co>
19. Garthe Ina, Truls Raastad, Per Egil Refnes, Jorunn Sundgot-Borgen. Effect of nutritional intervention on body composition and performance in elite athlete. *European Journal of Sport Science*. [serial online] 1 March 2012 [cited 2012 August 20]. Available form : URL : <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2011.643923>
20. Robert K. Muray, Daryl K. Granner, Victor W Rodwell. *Biokimia Harper* edisi 27. Jakarta : EGC; 2009. p. 290
21. Irawan MA. Metabolisme energi tubuh dan olahraga. Polton Sports Science and Performance Lab. [serial online] 2007 [cited 2012 February 2]; 1(7); p 1-10. Available from : URL : <http://www.pssplab.com>
22. Battinelli T. Aerobic and anaerobic conditioning. Wolinsky I, eds. *Physique, fitness, and performance*. Florida : CRC Press: 2000. P. 77-87
23. Shinichi Demura, Takayoshi Yamada, Shigeru Shimada, Masanobu Uchiyama. Influence of exercise habits and physical fitness level on subjective fatigue symptoms in adolescent students. *Health*. [serial online] 2011 [cited 2012 June 20]; 3(1); p. 20-25. Available from : URL : <http://www.scrip.org/journal/HEALTH/>
24. I Putu Panca Adi. Hubungan antara koordinasi gerak mata – kaki dan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan operan panjang dalam permainan sepak bola. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains & Humanoria*. [serial online] 2007 [cited 2012 June 1]; 1(1); p.53-61. Available from URL: [http://www.freewebs.com/santayasa/Lemlit/PDF\\_Files/SAINS/AGUSTUS\\_2007/I\\_Putu\\_Panca\\_Adi.pdf](http://www.freewebs.com/santayasa/Lemlit/PDF_Files/SAINS/AGUSTUS_2007/I_Putu_Panca_Adi.pdf)
25. Vanttinen T, Minna Blomqvist, Keijo Hakkinen. Development of body composition, hormone profile, physical fitness, general perceptual motor

- skills, soccer skills and on-the-ball performance in soccer specific laboratory test among adolescent soccer players. *Journal of Sports Science and Medicine*. [serial online] 2010 [cited 2012 February 10]; 9; p.547-556. Available from URL : <http://www.jssm.org>
26. Miller K. The effects on soccer dribbling skills when training with two different sized soccer balls [thesis]. University of Kansas; 2012
  27. Katis A, Eleftherios Kellis. Effects of small-sided games on physical conditioning and performance in young soccer players. *Journal of Sports Science and Medicine*. [serial online] 2009 [cited 2012 August 30]; 8; p.374-380. Available from URL : <http://www.jssm.org>
  28. Abt G, Shi Zhou, Robert Weatherby. The effect of a high-carbohydrate diet on the skill performance of midfield soccer player after intermittent treadmill exercise. *Journal Science Medical Sport*. [serial online] 1998 [cited August 1]; 1(4); p. 203-12. Available from : URL : [http://http://www.jsams.org/article/S1440-2440\(09\)60003-7](http://http://www.jsams.org/article/S1440-2440(09)60003-7)
  29. Mujika I, Louise M. Burke. Nutrition in team sports. *Annals of Nutrition and Metabolism*. [serial online] 2010 [cited 2012 August 1]; 57(2); p. 26-35. Available from : URL : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21346334>
  30. Febbraio Mark A, Adam Steensberg, Rory Walsh, Irene Koukoulas, Gerrit van Hall, Bengt Saltin, et al. Reduced glycogen availability is associated with an elevation contracting human skeletal muscle. [serial online] February 2002 [cited 2012 August 5]; 538(3); p. 911-17. Available from : URL : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2290094/>
  31. Charlotte K, Adam Steensberg, Henriette Pilegaard, Takuya Osada, Bengt Saltin, Bente KP, et al. Transcriptional activation of the IL-6 gene in human contracting skeletal muscle: influence of muscle glycogen content. *FASEB Journal*. [serial online] 2001 [cited 2012 July 10]; 15; p. 2748-50. Available from : URL : <http://www.fasebj.org/content/15/14/2748.full>
  32. Pilegaard H, Keller C, Steensberg A, Helge JW, Pedersen BK, saltin B, Neufer PD. Influence of pre-exercise muscle glycogen content on



- exercise-induced transcriptional regulation of metabolic genes. *Journal of Physiology*. [serial online] 2002 [cited 2012 August 3]; 541(1); p. 261-71. Available from : URL : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12015434>
33. Hawley John A, Kevin D, Tipton, Mindy L. Promoting training adaptations through nutritional interventions. *Journal of Sports Sciences*. [serial online] July 2006 [cited 2012 August 20]; 24(7); p. 709-21. Available from : URL : <http://www.sportsoracle.com/uploads/2610.pdf>
34. Melzer Katarina, Bengt Kayser, Wim H.M. Saris, Claude Pichard. Effects of physical activity on food intake. *Clinical Nutrition*. [serial online] 2005 [cited 2012 August 17]; 24; p. 885-95. Available from : URL : <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=4396>
35. Williams A. Mark, Nicola J. Hodges. Practice, instruction and skill acquisition in soccer : challenging tradition. *Journal of Sports Sciences*. [serial online] 2005 [cited 2012 August 21]; p. 1-15. Available from : URL : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16195012>

### Data Karakteristik Subyek Penelitian

No.	No punggung	Usia	TB	BB	IMT	%LT	Energi	Kenergi	Kh	Prot	Lmk	KJ	Pb	Db
1.	Delapan	17.4	172	63.9	21.59	14.9	2404	4334.7	420.4	64.1	64.4	S	23.73	27.06
2.	Tujuh belas	18.1	168	55.8	19.78	15.2	3108.2	4028.7	494.3	93.8	82.6	S	25.68	28.28
3.	Lima	16.10	174	60.9	20.09	14.8	1887.3	4334.7	297	59.5	51.4	S	24.18	27.6
4.	Tiga lima	18.3	176	80.1	25.83	21	2122.6	5275.8	359.3	60.1	49.7	B	25.06	28.12
5.	Empat belas	18.3	167	59.1	21.18	17	3309.6	4334.7	541.4	100.1	92.2	S	24.59	27.16
6.	Dua lima	18.4	177.5	63.4	20.12	14.4	3204.8	4334.7	513.7	90.5	92.4	B	26.68	28.16
7.	Delapan belas	18.3	169	56.8	19.92	14.8	2462	4028.7	367.4	75	77.6	B	25.58	28.27
8.	Dua satu	15	179	59.8	18.68	11.1	2428.5	4334.7	393	75.2	61.7	B	26.19	26.51
9.	Tiga dua	16.1	178.5	62	19.49	12.7	2435.6	4334.7	407.8	72.2	48	S	26.49	30.46
10.	Tiga puluh	16.7	169	63.6	22.31	17.7	2303.8	4334.7	382.4	65.7	57.3	S	27.06	26.41
11.	Enam belas	17.2	177.5	77.9	24.73	17.7	3373.8	4969.7	596.3	91.6	78.2	S	29.59	27.87
12.	Dua delapan	16.1	169	62.2	21.82	17.1	2006	4334.7	311	64.6	62.2	B	25.07	25.06
13.	Tiga satu	17.10	176	61	19.67	14.1	3031	4334.7	516.3	84.2	70.2	S	24.07	27.25
14.	Sembilan	16.11	168.5	61.6	21.69	18.7	2077.3	4334.7	353.6	56.8	49.7	B	26.23	28.56
15.	Sepuluh	18.4	169.5	66.7	23.24	19.6	2746.3	4499.2	440.7	71.2	84.5	B	25.45	25.82
16.	Lima belas	18.2	170	63.8	22.07	17.9	2669.7	4499.2	421.5	92.8	70.9	S	28.44	32.31
17.	Tiga belas	17.8	174	87.7	28.94	20.8	1772.8	5442.2	300	48.8	45.8	B	25.86	25.14
18.	Sembilan belas	18.5	167.5	62.5	22.32	18.4	1819.6	4334.7	295.5	54.3	47.2	B	25.34	26.82

Keterangan :  
**TB** : Tinggi Badan  
**BB** : Berat Badan  
**IMT** : Indeks Massa Tubuh  
**%LT** : Persen Lemak Tubuh  
**Kenergi** : Kebutuhan energi

**Energi** : Asupan Energi  
**Kh** : Asupan Karbohidrat  
**Prot** : Asupan Protein  
**Lmk** : Asupan Lemak  
**KJ** : Kesegaran Jasmani

**S** : Sedang  
**B** : Baik  
**Pb** : *Passing* bola  
**Db** : *Dribbling* bola

**Data Antropometri Sebelum dan Setelah Intervensi**

No.	No punggung	Sebelum						Setelah					
		TB	BB	IMT	kIMT	%LT	k%LT	TB	BB	IMT	kIMT	%LT	k%LT
1.	Delapan	172	63.9	21.59	N	14.9	N	172	64.3	21.72	N	15.9	N
2.	Tujuh belas	168	55.8	19.78	N	15.2	N	168	56.7	20.10	N	16	N
3.	Lima	174	60.9	20.09	N	14.8	N	174	62	20.46	N	15.4	N
4.	Tiga lima	176	80.1	25.83	G	21	LN	176	80.7	26.03	G	21.9	LN
5.	Empat belas	167	59.1	21.18	N	17	N	167	59.2	21.22	N	17	N
6.	Dua lima	177.5	63.4	20.12	N	14.4	N	177.5	64.3	20.41	N	15.5	N
7.	Delapan belas	169	56.8	19.92	N	14.8	N	169	57.8	20.28	N	15.4	N
8.	Dua satu	179	59.8	18.68	N	11.1	N	179	60.2	18.81	N	11.9	N
9.	Tiga dua	178.5	62	19.49	N	12.7	N	178.5	62.2	19.56	N	13.7	N
10.	Tiga puluh	169	63.6	22.31	N	17.7	N	169	64.4	22.59	N	18	N
11.	Enam belas	177.5	77.9	24.73	G	17.7	N	177.5	78.9	25.04	G	17.7	N
12.	Dua delapan	169	62.2	21.82	N	17.1	N	169	62.3	21.86	N	17.6	N
13.	Tiga satu	176	61	19.67	N	14.1	N	176	61.3	19.77	N	15	N
14.	Sembilan	168.5	61.6	21.69	N	18.7	LN	168.5	63.2	22.25	N	19.3	LN
15.	Sepuluh	169.5	66.7	23.24	N	19.6	LN	169.5	67	23.34	N	17.6	N
16.	Lima belas	170	63.8	22.07	N	17.9	N	170	64.8	22.42	N	18.2	N
17.	Tiga belas	174	87.7	28.94	OB	20.8	LN	174	87.9	29	OB	21.9	LN
18.	Sembilan belas	167.5	62.5	22.32	N	18.4	LN	167.5	63	22.5	N	17.6	N

Keterangan :  
**TB** : Tinggi Badan  
**BB** : Berat Badan  
**IMT** : Indeks Massa Tubuh  
**kIMT** : Kategori IMT

**N** : Normal  
**G** : Gemuk  
**OB** : Obesitas  
**%LT** : Persen Lemak Tubuh

**k%LT** : Kategori Persen Lemak Tubuh  
**N** : Normal  
**LN** : Lebih dari Normal



**Data Kesegaran Jasmani, Keterampilan Sebelum dan Setelah Intervensi**

No.	No punggung	Sebelum						Setelah					
		sprint	lincah	v.jump	KJ	Pb	Db	sprint	lincah	v.jump	KJ	Pb	Db
1.	Delapan	7.00	6.24	45	S	23.73	27.06	7.23	5.58	50	B	16.06	27.29
2.	Tujuh belas	7.06	6.24	45	S	25.68	28.28	7.12	6.28	50	S	15.25	27.42
3.	Lima	6.86	6.38	50	S	24.18	27.6	7.25	5.95	50	B	16.47	26.80
4.	Tiga lima	6.56	6.28	70	B	25.06	28.12	6.61	5.97	70	B	16.94	26.80
5.	Empat belas	6.85	6.68	48	S	24.59	27.16	6.55	6.04	48	B	16.00	25.65
6.	Dua lima	6.72	6.76	60	B	26.68	28.16	7.04	6.15	60	B	15.78	28.45
7.	Delapan belas	7.03	5.64	45	B	25.58	28.27	7.11	5.69	50	B	15.12	25.97
8.	Dua satu	7.06	6.46	55	B	26.19	26.51	7.50	5.31	55	B	16.10	24.39
9.	Tiga dua	7.02	6.54	45	S	26.49	30.46	7.22	5.95	50	B	15.48	26.74
10.	Tiga puluh	7.07	6.44	44	S	27.06	26.41	7.31	6.21	44	S	16.57	27.80
11.	Enam belas	6.99	6.25	50	S	29.59	27.87	7.26	6.29	50	S	19.36	31.00
12.	Dua delapan	6.89	6.57	45	B	25.07	25.06	7.07	6.08	45	S	16.42	24.83
13.	Tiga satu	6.86	5.87	50	S	24.07	27.25	7.08	5.66	50	B	16.80	27.45
14.	Sembilan	7.68	6.38	45	B	26.23	28.56	7.37	6.04	50	S	16.35	26.29
15.	Sepuluh	6.64	5.67	50	B	25.45	25.82	6.44	5.63	50	B	16.02	24.53
16.	Lima belas	6.90	6.28	50	S	28.44	32.31	7.04	6.02	55	B	16.79	26.20
17.	Tiga belas	6.72	6.17	58	B	25.86	25.14	6.95	5.98	58	B	15.31	26.32
18.	Sembilan belas	7.10	6.60	52	B	25.34	26.82	7.51	6.20	52	S	15.68	25.09

Keterangan :

<b>sprint</b> : lari cepat 50 m	<b>S</b> : Sedang
<b>lincah</b> : tes kelincahan (lari zig zag)	<b>B</b> : Baik
<b>v.jump</b> : loncat tegak	<b>Pb</b> : <i>Passing</i> bola
<b>KJ</b> : Kesegaran Jasmani	<b>Db</b> : <i>Dribbling</i> bola

**Data Recall Selama Intervensi**

No	No punggung	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7	H-8	H-9	H1-0	H-11
1.	Delapan	3783.2	3844.4	3990.0	4089.2	3931.1	3799.9	3899.0	4036.5	3885.8	3734.2	4202.2
2.	Tujuh belas	3916.3	3099.2	4260.7	4174.0	4135.2	4171.3	3998.9	3742.1	3739.3	4062.1	4434.1
3.	Lima	4295.0	3941.8	3937.1	3856.5	4167.5	3782.8	4266.3	4109.4	4073.2	3861.1	4080.3
4.	Tiga Lima	3282.0	3842.3	4556.5	4926.3	4134.8	3984.6	3790.3	4779.1	3751.9	4264.3	4388.2
6.	Empat belas	3651.9	3070.5	3551.1	3674.7	4069.3	3937.9	3737.6	4678.3	3497.3	4177.2	4589.4
7.	Dua lima	3380.5	4634.4	4353.0	4243.4	4205.6	3737.2	4572.6	4598.3	3767.2	4016.6	4436.9
8.	Delapan belas	3673.9	3923.5	3723.5	3616.4	4466.9	3706.0	3687.8	3831.3	4592.8	3732.9	3925.8
9.	Dua satu	4011.8	4239.0	4015.3	3807.5	4174.3	3903.0	4456.9	4415.2	4036.5	3946.5	4131.4
10.	Tiga dua	4029.8	4055.2	4256.6	4552.7	4213.0	4100.1	4511.7	4411.8	4041.7	3912.8	4376.1
11.	Tiga puluh	4264.5	4076.6	4237.9	4001.9	4491.3	3890.7	4368.9	4194.4	3992.9	4080.0	4226.1
12.	Enam belas	4179.9	4444.3	4331.2	4131.0	4261.7	3983.7	4038.8	4339.9	3720.3	4031.1	4485.0
13.	Dua delapan	4092.1	4305.5	4324.2	4204.3	4019.0	4151.7	4485.6	4280.5	4022.3	4049.3	4241.9
14.	Tiga satu	3764.8	3695.7	4074.3	4385.9	4050.0	3886.8	4401.1	4369.1	3804.6	3920.6	4119.9
15.	Sembilan	3882.6	3768.1	3812.6	4259.3	4045.3	3786.2	4253.7	4210.9	3790.7	3657.3	3818.2
16.	Sepuluh	3795.1	3920.7	4360.5	4048.1	4018.5	3778.9	3848.7	3935.6	4298.6	4192.5	4147.8
17.	Lima belas	4427.5	3779.5	3629.1	3850.8	3952.0	3951.3	4360.2	4171.2	3743.3	4089.5	4113.1
18.	Tiga belas	3614.2	3699.1	3860.0	3838.9	3743.3	4086.6	3609.3	3923.0	4290.8	3827.6	3720.7
19.	Sembilan belas	3918.5	4188.0	4051.3	3767.5	3946.8	4108.2	3695.3	4098.4	3641.4	3927.5	4179.8

Keterangan :      **H-** : Hari ke-

### Descriptive Statistic Subjek Sebelum Intervensi

		umur	berat badan	tinggi badan	imt	persen lemak	kes. jas	asupan energi	asupan kh	asupan lemak	asupan protein	passing bola	dribbling bola
N	Valid	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		17.33	64.9333	172.3333	21.8594	16.5500	9.4444	2509.0500	411.7556	65.8889	73.3611	25.8494	27.6039
Median		18.00	62.3500	171.0000	21.6400	17.0500	9.0000	2432.0500	400.4000	63.3000	71.7000	25.6300	27.4250
Mode		18	55.80 <sup>a</sup>	169.00	18.68 <sup>a</sup>	14.80 <sup>a</sup>	9.00	1772.80 <sup>a</sup>	295.50 <sup>a</sup>	49.70	48.80 <sup>a</sup>	23.73 <sup>a</sup>	25.06 <sup>a</sup>
Std. Deviation		.907	8.40476	4.20434	2.56479	2.72251	.70479	522.79221	90.31416	15.84342	15.52342	1.48150	1.75435
Variance		.824	70.640	17.676	6.578	7.412	.497	273311.694	8156.647	251.014	240.977	2.195	3.078
Skewness		-1.299	1.740	.326	1.415	-.151	.219	.291	.475	.316	.251	1.006	1.085
Std. Error of Skewness		.536	.536	.536	.536	.536	.536	.536	.536	.536	.536	.536	.536
Kurtosis		1.084	2.499	-1.571	2.281	-.509	.201	-1.140	-.644	-1.233	-1.166	1.346	2.150
Std. Error of Kurtosis		1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
Minimum		15	55.80	167.00	18.68	11.10	8.00	1772.80	295.50	45.80	48.80	23.73	25.06
Maximum		18	87.70	179.00	28.94	21.00	11.00	3373.80	596.30	92.40	100.10	29.59	32.31

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
imt pre	.207	18	.041	.878	18	.025
trams_imtpre	.182	18	.118	.913	18	.097
bodyfat pre	.134	18	.200 <sup>*</sup>	.969	18	.781
energi pre	.147	18	.200 <sup>*</sup>	.937	18	.254
kebutuhan pre	.360	18	.000	.713	18	.000
sprint pre	.205	18	.043	.867	18	.016
kelincahan pre	.199	18	.059	.915	18	.106
jump pre	.245	18	.005	.811	18	.002
kesjas pre	.260	18	.002	.843	18	.007
passing pre	.121	18	.200 <sup>*</sup>	.934	18	.226
dribbling pre	.183	18	.113	.915	18	.106
imt post	.198	18	.061	.892	18	.042
transimt_post	.174	18	.158	.926	18	.164
bodyfat post	.147	18	.200 <sup>*</sup>	.951	18	.449
energi post	.111	18	.200 <sup>*</sup>	.962	18	.645
kebutuhan post	.360	18	.000	.713	18	.000
sprint post	.209	18	.037	.907	18	.076
kelincahan post	.228	18	.014	.918	18	.117
jump post	.301	18	.000	.811	18	.002
kesjas post	.305	18	.000	.775	18	.001
passing post	.179	18	.133	.815	18	.002
dribbling post	.131	18	.200 <sup>*</sup>	.925	18	.157
imt post	.198	18	.061	.892	18	.042
bodyfat post	.147	18	.200 <sup>*</sup>	.951	18	.449

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.



**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
energi pre	.147	18	.200 <sup>*</sup>	.937	18	.254
kh pre	.124	18	.200 <sup>*</sup>	.942	18	.317
protein pre	.143	18	.200 <sup>*</sup>	.944	18	.345
lemak pre	.153	18	.200 <sup>*</sup>	.920	18	.128
energi post	.111	18	.200 <sup>*</sup>	.962	18	.645
kh post	.131	18	.200 <sup>*</sup>	.912	18	.094
protein post	.137	18	.200 <sup>*</sup>	.934	18	.231
lemak post	.121	18	.200 <sup>*</sup>	.987	18	.993

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

### Uji Beda Paired T-test

#### Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	energi pre - energi post	-1.54687E3	497.52110	117.26685	-1794.28364	-1299.46080	-13.191	17	.000
Pair 2	kh pre - kh post	-2.25233E2	97.11241	22.88961	-273.52620	-176.94047	-9.840	17	.000
Pair 3	protein pre - protein post	-5.06889E1	15.82871	3.73086	-58.56032	-42.81746	-13.586	17	.000
Pair 4	lemak pre - lemak post	-6.03611E1	14.58190	3.43699	-67.61252	-53.10970	-17.562	17	.000
Pair 1	trans_imt - trans_imtpost	-.00435	.00298	.00070	-.00583	-.00286	-6.193	17	.000
Pair 2	persen lemak - prsn lmk post	-.42778	.77369	.18236	-.81252	-.04303	-2.346	17	.031
Pair 1	dribbling bola - dribbling post	.99167	2.05497	.48436	-.03025	2.01358	2.047	17	.056

### Uji Beda NPar Tests

#### Test Statistics<sup>b</sup>

	trans_kesjaspost 1 - trans_kesjas1	trans_passpost2 - passing bola
Z	-2.079 <sup>a</sup>	-3.724 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.038	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

## Uji Kolerasi Pearson

### Correlations

		energi post	kh post	protein post	lemak post	transimt_post
transimt_post	Pearson Correlation	-.158	-.149	.113	.028	1
	Sig. (2-tailed)	.531	.555	.655	.912	
	N	18	18	18	18	18
bodyfat post	Pearson Correlation	-.185	-.217	.256	.071	1
	Sig. (2-tailed)	.462	.386	.306	.779	
	N	18	18	18	18	18
dribbling post	Pearson Correlation	.233	.235	-.141	.255	1
	Sig. (2-tailed)	.353	.348	.576	.307	
	N	18	18	18	18	18

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Uji Kolerasi Spearman

### Correlations

			energi post	kh post	protein post	lemak post	kesjas post
Spearman's rho	kesjas post	Correlation Coefficient	-.169	-.414	.360	.034	1.000
		Sig. (2-tailed)	.502	.088	.142	.895	.
		N	18	18	18	18	18
	passing post	Correlation Coefficient	.234	.416	-.329	.166	1.000
		Sig. (2-tailed)	.349	.086	.182	.510	.
		N	18	18	18	18	18

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).