

**PERBEDAAN KADAR KOLESTEROL TOTAL DAN
TRIGLISERIDA PADA WANITA VEGETARIAN TIPE
VEGAN DAN NON-VEGAN**

Artikel Penelitian

disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi pada Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro



disusun oleh :

MIRA RIZKY PAMUNGKAS
G2C008047

**PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel penelitian dengan judul “Perbedaan Kadar Kolesterol Total dan Trigliserida pada Wanita Vegetarian Tipe Vegan dan Non-Vegan” telah mendapat persetujuan dari pembimbing.

Mahasiswa yang mengajukan :

Nama : Mira Rizky Pamungkas
NIM : G2C008047
Fakultas : Kedokteran
Program Studi : Ilmu Gizi
Universitas : Diponegoro Semarang
Judul Proposal : Perbedaan Kadar Kolesterol Total dan Trigliserida pada Wanita Vegetarian Tipe Vegan dan Non-Vegan

Semarang, 11 September 2012

Pembimbing,

Dra. Ani Margawati, M.Kes, Ph.D.

NIP. 196505251993 03 2001

PERBEDAAN KADAR KOLESTEROL TOTAL DAN TRIGLISERIDA PADA WANITA VEGETARIAN TIPE VEGAN DAN NON-VEGAN

Mira Rizky Pamungkas¹, Ani Margawati²

ABSTRAK

Latar Belakang : Wanita vegetarian non-vegan berisiko memiliki kadar kolesterol total dan trigliserida yang tinggi dibandingkan dengan vegan. Hal tersebut berkaitan dengan vegetarian non-vegan masih mengkonsumsi produk hewani antara lain susu, telur dan produk olahannya. Selain itu, faktor usia, lama menjadi vegetarian, indeks massa tubuh (IMT), aktivitas fisik menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Metode : Desain penelitian *cross sectional* dengan pendekatan kuantitatif kualitatif. Jumlah sampel terdiri dari 19 vegetarian vegan dan 19 non-vegan yang dipilih secara *consecutive sampling*. Data yang diambil adalah IMT, asupan zat gizi, aktivitas fisik, kadar kolesterol total dan trigliserida serta data kualitatif perilaku makan. Analisis bivariat menggunakan uji *independent t-test* untuk variabel usia, IMT, asupan karbohidrat dan lemak total sedangkan uji *Mann-Whitney* untuk variabel lama menjadi vegetarian, aktivitas fisik, asupan lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA serta serat total. Analisis multivariat menggunakan uji ANCOVA (*Analysis of Covariance*).

Hasil : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kadar kolesterol total ($p=0,073$) dan trigliserida ($Z=-0,146$; $p=0,884$) antara wanita vegan dan non-vegan. Berdasarkan uji ANCOVA perbedaan kolesterol total dan trigliserida antara kelompok vegan dan non-vegan lebih bermakna berdasarkan variabel usia ($p<0,05$), sedangkan kolesterol total dan trigliserida tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan berdasarkan tipe vegetarian ($p>0,05$).

Simpulan : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kadar kolesterol total dan trigliserida antara wanita vegetarian vegan dan non-vegan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan IMT antara vegan dan non-vegan. Usia merupakan satu-satunya variabel kontrol yang berpengaruh pada kadar kolesterol total dan trigliserida baik pada vegan maupun non-vegan. Kadar kolesterol total dan trigliserida pada kelompok vegan lebih rendah dibandingkan non-vegan. Sejak menjadi vegetarian, baik pada kelompok vegan maupun non-vegan menyatakan tidak pernah dan tidak ingin lagi mengkonsumsi produk hewani dengan berbagai alasan antara lain merasa lebih sehat tanpa makan produk hewani, merasa bahwa produk hewani tersebut bukanlah makanannya dan merasa mual serta ingin muntah saat mencium bau amis dari produk hewani tersebut.

Kata kunci : kadar kolesterol total, trigliserida, vegan, non-vegan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

²Dosen Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

DIFFERENCE BETWEEN TOTAL CHOLESTEROL LEVEL AND TRIGLYCERIDES IN VEGAN AND NON-VEGAN WOMEN

Mira Rizky Pamungkas¹, Ani Margawati²

ABSTRACT

Background : Non-vegan vegetarian women had higher risk in higher levels of total cholesterol and triglyceride than vegan. This is related to animal product such as milk, eggs, and other dairy product that they consumed. In addition, the age factor, duration of vegetarian diet, body mass index (BMI), and physical activity are factors that can't be ignored.

Methods : This study was a qualitative and quantitative *cross sectional* study. All 19 non-vegan diet and 19 vegan diet subjects were *consecutive sampling* chosen. Data collected were BMI, nutrient intake, physical activity, total cholesterol and triglycerides levels, and qualitative data of feeding behavior. *Independent t-test* used for variables age, BMI, carbohydrate and fat intake as bivariate analyze, while *Mann-Whitney* test for variables duration of vegetarian, physical activity, saturated fat intake, cholesterol, MUFA, PUFA, and total fiber. Multivariate analyze using ANCOVA test.

Results : There is no significant difference in total cholesterol ($p=0.073$) and triglycerides ($Z = -0.146$; $p = 0.884$) between vegan and non-vegan women. Total cholesterol and triglycerides among vegan group and non-vegan group were significantly different ($p<0.05$) for age adjustment, whereas total cholesterol and triglycerides shows no significant differences ($p>0.05$) based on the type of vegetarian in ANCOVA test.

Conclusions : There were no significant differences in total cholesterol and triglycerides among vegan and non-vegan women but there were significant difference in BMI among vegan and non-vegan. Age was the only variable that affects the control of total cholesterol and triglycerides in both vegan and non-vegan diet. Total cholesterol level and triglycerides of vegan women lower than non-vegan. Since becoming vegetarian, both vegan and non-vegan stated never again and don't want to consume animal products to a various reasons such as feeling healthier without eating animal products, feel that animal products is not their foods and feel nauseous and want to vomit when smell fishy from animal products.

Keyword : total cholesterol level, triglyceride, vegan, non-vegan.

1. Student of nutrition department of medical faculty, Diponegoro University, Semarang.
2. Lecturer of nutrition department of medical faculty, Diponegoro University, Semarang.

PENDAHULUAN

Vegetarian telah berkembang pesat selama bertahun-tahun yang berawal dari suatu kebutuhan hingga menjadi suatu pilihan dan kini mulai menjadi gaya hidup di masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei pada tahun 2006, sekitar 4,8 juta (2,3%) penduduk dewasa di Amerika menjadi vegetarian dan sekitar 1,4% menjadi vegan (vegetarian murni).¹ Jumlah vegetarian di Indonesia yang terdaftar pada *Indonesia Vegetarian Society* (IVS) saat berdiri pada tahun 1998 sekitar 5.000 anggota dan meningkat menjadi 60.000 anggota pada tahun 2007.²

Diet vegetarian mempunyai banyak manfaat kesehatan, antara lain mencegah dan melindungi seseorang dari berbagai penyakit kronik, seperti jantung koroner, kanker, osteoporosis, diabetes, kelainan syaraf dan menurunkan risiko obesitas serta tekanan darah tinggi. Hal tersebut diyakini karena diet vegetarian kaya akan lemak tak jenuh (MUFA dan PUFA), antioksidan, serat dan rendah kolesterol serta rendah lemak jenuh.³⁻⁷ Dibandingkan tipe vegetarian yang lain, vegan cenderung rendah lemak jenuh dan kolesterol serta tinggi serat karena tidak mengkonsumsi produk hewani sama sekali.⁸

Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyebab kematian utama di negara maju dan negara berkembang yang diprediksikan akan menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia pada tahun 2020.⁴ Salah satu biomarker untuk mengetahui faktor risiko PJK adalah pengukuran profil lipid. Konsentrasi serum kolesterol total merupakan faktor risiko biokimia sangat penting untuk PJK. Menurut *National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III* (NCEP ATP III), penurunan 10% kolesterol total akan menurunkan risiko kejadian PJK sebesar 30% dan berdasarkan beberapa studi epidemiologi prospektif diketahui adanya hubungan positif antara kadar trigliserida dengan kejadian PJK.⁹ Faktor risiko yang terkait dengan serum kolesterol total dan trigliserida yang tinggi yaitu usia, asupan zat gizi (tinggi karbohidrat, lemak total, lemak jenuh dan kolesterol serta rendah serat), obesitas, kebiasaan merokok, serta rendahnya aktivitas fisik.^{4,10}

Vegetarian non-vegan masih mengkonsumsi produk hewani yang meliputi telur, susu dan produk olahannya. Telur, susu dan produk olahannya tersebut

mengandung lemak jenuh dan kolesterol serta jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan dapat meningkatkan kadar kolesterol total.^{9,10} Pada vegetarian vegan konsumsi lemak jenuh dan kolesterol tergolong rendah.⁸ Karbohidrat akan berperan sebagai pengganti lemak jenuh pada kelompok vegan sehingga asupannya akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kadar trigliserida. Namun, saat karbohidrat dikonsumsi bersamaan dengan asupan kaya serat, peningkatan kadar trigliserida tersebut dapat menurun.^{9,10} Beberapa penelitian diketahui kelompok vegetarian memiliki kadar kolesterol total dan trigliserida lebih rendah dibandingkan non-vegetarian dan vegan memiliki kadar kolesterol total serta trigliserida terendah.¹¹⁻¹³ Namun, pada penelitian lain di Bali diketahui kadar kolesterol total dan trigliserida vegan justru lebih tinggi dibandingkan dengan lakto vegetarian dan lakto-ovo vegetarian.¹⁴ Penelitian lain pada vegetarian lansia diketahui kadar kolesterol total dan trigliseridanya lebih tinggi dibandingkan non-vegetarian.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan usia juga sangat berperan dalam peningkatan kadar kolesterol total dan trigliserida meskipun asupan lemak jenuh dan kolesterol tergolong rendah. Lama seseorang vegetarian berhubungan dengan kualitas dan kuantitas asupan zat gizi yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol total dan trigliserida. Diet vegetarian yang dijalani ≥ 12 tahun memiliki kadar kolesterol total lebih rendah dibandingkan diet vegetarian yang dijalani 6-11 tahun. Namun, lama vegetarian tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar trigliserida. Kadar trigliserida terendah dimiliki oleh subjek yang menjalani diet vegetarian < 6 tahun sedangkan diet vegetarian selama 6-11 tahun diketahui memiliki kadar trigliserida tertinggi.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol total dan trigliserida pada wanita vegetarian vegan dan non-vegan.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam lingkup gizi masyarakat dengan desain *cross sectional* dan dengan pendekatan kuantitatif serta kualitatif. Data kualitatif digunakan sebagai konfirmasi untuk memperkuat data kuantitatif. Penelitian berlangsung pada bulan Juni hingga Juli 2012 di beberapa kota, diantaranya

Surabaya, Semarang dan Yogyakarta. Sebagian besar subjek yang diambil terdaftar sebagai anggota IVS di wilayah masing-masing dan sisanya berasal dari komunitas SUMA Ching Hai (suatu komunitas meditasi yang menganut pola makan vegetarian). Besar subjek dalam penelitian ini 38 subjek (19 subjek pada masing-masing tipe vegetarian) yang dihitung menggunakan rumus besar sampel untuk beda rerata dua kelompok tidak berpasangan dengan tingkat kemaknaan (Z_α) 95%, tingkat kekuatan uji (Z_β) 1,64, simpang baku kedua kelompok (S) 29,5 dan perbedaan klinis yang diinginkan (x_1-x_2) 34,26.¹² Subjek diambil secara *consecutive sampling* setelah memenuhi beberapa kriteria yaitu wanita berusia \geq 20 tahun, tidak mengkonsumsi obat anti-hiperlipidemia minimal tiga bulan terakhir, tidak merokok, tidak sedang menderita atau memiliki riwayat penyakit degeneratif (penyakit kardiovaskuler, hati, diabetes mellitus dan ginjal) serta tidak sedang hamil.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tipe vegetarian. Subjek dinyatakan vegetarian tipe vegan bila hanya mengkonsumsi makanan nabati dan tidak pernah lagi mengkonsumsi makanan hewani serta produk yang berasal dari sumber hewani (madu, susu, telur dan olahannya) sedangkan dinyatakan non-vegan bila mengkonsumsi makanan nabati, tidak pernah lagi mengkonsumsi makanan hewani tetapi masih mengkonsumsi susu, telur beserta hasil olahannya. Olahan yang dimaksud adalah produk yang berupa kue, biskuit, roti dan lain-lain. Dalam penelitian ini, batasan produk olahan makanan antara vegan dan non-vegan dipisahkan dengan jelas yaitu produk olahan akan dimasukkan sebagai makanan vegan apabila produk tersebut diolah sendiri oleh subjek vegan atau jika diperoleh dari luar (membeli) hanya berasal dari penjual khusus makanan vegan. Sebagian besar subjek vegan pada penelitian ini memperoleh produk olahan dari restoran vegetarian yang khusus menyediakan makanan vegan, sehingga komposisi dari produk tersebut dapat terjamin bebas dari susu atau telur, karena pada umumnya pengelola restoran vegetarian tersebut juga termasuk penganut vegetarian vegan. Sebaliknya, produk olahan akan dimasukkan ke dalam makanan non-vegan apabila subjek memperoleh produk tersebut dari penjual luar yang bukan

penganut vegetarian (produk pasaran) yang komposisi bahan makanannya tidak bisa dijamin.

Variabel perancu dalam penelitian ini adalah usia, lama menjadi vegetarian, IMT, aktivitas fisik dan asupan zat gizi (karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, MUFA, PUFA, kolesterol dan serat total). Data usia dan lama menjadi vegetarian diperoleh melalui wawancara dengan subjek. Deskripsi usia dalam tabel distribusi frekuensi dikategorikan menjadi 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun, 50-59 tahun dan ≥ 60 tahun.¹⁶ deskripsi lama menjadi vegetarian dalam tabel distribusi frekuensi dikategorikan menjadi < 6 tahun, 6-11 tahun dan > 11 tahun.¹¹ Data IMT diperoleh melalui perbandingan hasil pengukuran berat badan (kg) dan kuadrat tinggi badan (m). Berat badan diukur menggunakan timbangan digital dengan kapasitas 150 kg dan ketelitian 0,1 kg sedangkan tinggi badan diukur menggunakan *microtoise* dengan kapasitas 200 cm dan ketelitian 0,1 cm. Deskripsi IMT menurut WHO dikategorikan menjadi *underweight* ($<18,5$ kg/m²), normal (18,5-22,9 kg/m²), *overweight* (23,0-24,9 kg/m²), *obese* I (25,0-29,9 kg/m²) dan *obese* II (≥ 30 kg/m²).¹⁷ Data aktivitas fisik diperoleh melalui wawancara menggunakan *International Physical Activity Questionnaire* (IPAQ) . Aktivitas fisik yang dilaporkan oleh subjek mencakup kegiatan yang dilakukan selama tujuh hari terakhir. Skor aktivitas fisik dihitung sesuai dengan protokol skoring IPAQ dan dinyatakan dalam satuan MET-menit/minggu kemudian dikategorikan dalam tingkat aktivitas fisik yang rendah (< 600 MET-menit/minggu), sedang (600-1499 MET-menit/minggu), dan tinggi (≥ 1500 MET-menit/minggu).¹⁸

Data asupan zat gizi (karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, MUFA, PUFA, kolesterol dan serat total) diperoleh melalui wawancara menggunakan formulir *Food Frequency Semi Quantitatif* (FFSQ). Hasil yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program *Nutrisurvey*. Data asupan karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, MUFA dan PUFA disajikan dalam bentuk persentase setelah dibandingkan dengan total asupan energi sedangkan asupan kolesterol disajikan dalam ukuran mg serta asupan serat total dalam ukuran gram. Kategori asupan zat gizi diperoleh dari anjuran NCEP, di mana asupan seseorang dikatakan

baik apabila setelah dibandingkan dengan total energi, jumlah asupan karbohidrat mencapai $\leq 60\%$, lemak total mencapai 25-35%, lemak jenuh mencapai kurang dari 7%, MUFA mencapai 20%, PUFA mencapai 10%. Sementara itu asupan kolesterol dianjurkan kurang dari 200 mg dan asupan serat total dianjurkan mencapai 25-30 g.⁹ Data perilaku makan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian menggunakan pedoman wawancara.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar serum kolesterol total dan trigliserida dalam darah. Pengambilan sampel darah dilakukan oleh petugas laboratorium setelah subjek berpuasa selama 8-12 jam.¹⁰ Analisis sampel darah dilakukan di laboratorium klinik menggunakan metode CHOD/PAP untuk kolesterol total dan tes warna enzimatik untuk trigliserida dengan alat *Cobas Mira Analyzer*. Deskripsi kadar kolesterol total dan trigliserida dalam tabel distribusi disajikan berdasarkan kategori dari NCEP. Data kadar kolesterol total dikategorikan menjadi diinginkan (<200 mg/dl), batas tinggi (200-239 mg/dl) dan tinggi (≥ 240 mg/dl) sedangkan data kadar trigliserida dikategorikan menjadi normal (<150 mg/dl), batas tinggi (50-199 mg/dl), tinggi (200-499 mg/dl) serta sangat tinggi (≥ 500 mg/dl).⁹

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti dalam bentuk proporsi, rerata (*mean*) dan simpang baku. Data-data tersebut diuji kenormalannya menggunakan *Shapiro-Wilk*. Analisis bivariat dilakukan dengan uji *independent t-test* yaitu untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol total antara kelompok vegan dan non-vegan, sedangkan uji *Mann Whitney* untuk mengetahui perbedaan kadar trigliserida kelompok vegan dan non-vegan. Analisis bivariat juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol total dan trigliserida berdasarkan variabel-variabel kontrol. Analisis multivariat menggunakan uji ANCOVA untuk melihat perbedaan kadar kolesterol total dan trigliserida pada kelompok vegan dan non-vegan setelah dikontrol dengan variabel usia, lama menjadi vegetarian, IMT, aktivitas fisik, asupan karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, MUFA, PUFA, kolesterol dan serat total.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik subjek penelitian dapat dilihat berdasarkan usia, lama menjadi vegetarian, pendidikan dan pekerjaan yang ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Tabel interpretasi subjek penelitian berdasarkan usia, lama menjadi vegetarian, agama dan pendidikan

Karakteristik	Vegan (n=19)		Non-vegan (n=19)	
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Kategori usia	20-29	6 (31,6)	4 (21,1)	
	30-39	4 (21,1)	5 (26,3)	
	40-49	4 (21,1)	3 (15,8)	
	50-59	2 (10,5)	5 (26,3)	
	≥60	3 (15,8)	2 (10,5)	
Lama menjadi vegetarian	< 6 tahun	15 (78,9)	1 (5,3)	
	6-11 tahun	3 (15,8)	3 (15,8)	
	>11 tahun	1 (5,3)	15 (78,9)	
Agama	Buddha	8 (42,1)	19 (100)	
	Non-Buddha	11 (57,9)	0	
Pendidikan	SD	1 (5,3)	2 (10,5)	
	SMP	1 (5,3)	3 (15,8)	
	SMA	5 (26,3)	3 (15,8)	
	Perguruan tinggi	12 (63,2)	11 (57,9)	

Kelompok vegan berusia lebih muda dibandingkan kelompok non-vegan.

Rerata usia kelompok vegan $39,26 \pm 15,14$ dan $41,42 \pm 13,5$ pada kelompok non-vegan tetapi perbedaan usia antara subjek vegan dan non-vegan tidak berbeda signifikan ($p=0,646$). Sebagian besar subjek vegan menjalani dietnya < 6 tahun, lama diet yang dijalani minimal selama satu bulan oleh dua orang subjek dan satu orang subjek sudah menjalani dietnya selama 15 tahun serta nilai mediannya yaitu tiga tahun. Sebagian besar subjek non-vegan menjalani dietnya > 11 tahun, lama vegetarian yang dijalani minimal selama 2,5 tahun dan maksimal 56 tahun serta nilai mediannya yaitu 14 tahun. Sebelum menjadi vegan, beberapa subjek menjalani diet vegetarian yang masih mengkonsumsi produk susu dan telur (lakto-ovo vegetarian) sehingga pada vegan, total lama menjadi vegetarian minimal selama 15 bulan dan maksimal 56 tahun dengan median yaitu 10 tahun. Terdapat

perbedaan bermakna lama menjadi vegetarian antara subjek vegan dan non-vegan ($p=0,000$).

Semua subjek pada kelompok non-vegan beragama Buddha sedangkan 57,9% pada kelompok vegan beragama non-Buddha yang meliputi agama Kristen, Katholik dan Islam. Pendidikan subjek sebagian besar adalah perguruan tinggi pada masing-masing kelompok.

Indeks Massa Tubuh (IMT) Subjek

Distribusi Indeks Massa Tubuh subjek dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Indeks Massa Tubuh subjek berdasarkan tipe vegetarian

Status gizi (kg/m ²)	Vegan (n=19)		<i>p</i> value
	n (%)	n (%)	
<i>Underweight</i> (<18,5)	3 (15,8)	0	0,009
Normal (18,5-22,9)	9 (47,4)	7 (36,8)	
<i>Overweight</i> (23,0-24,9)	5 (26,3)	7 (36,8)	
<i>Obese</i> I (25,0-29,9)	2 (10,5)	4 (21,1)	
<i>Obese</i> II (≥ 30)	0	1 (5,3)	

Hampir separuh vegan berstatus gizi normal dengan rerata IMT 21.414 ± 2.76 kg/m², sedangkan non-vegan sebagian berstatus gizi normal dan *overweight* dengan rerata IMT 24.205 ± 3.43 kg/m². Status gizi *obese* I ditemukan pada kedua kelompok tetapi status gizi *obese* II hanya ditemukan pada kelompok non-vegan. Terdapat perbedaan bermakna IMT antara vegan dan non-vegan ($p<0,05$).

Aktivitas Fisik Subjek

Distribusi frekuensi aktivitas fisik subjek ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Distribusi frekuensi aktivitas fisik subjek berdasarkan tipe vegetarian

Aktivitas fisik	Vegan (n=19)		<i>p</i> value
	n (%)	n (%)	
Rendah	7 (36,8)	3 (15,8)	0,112
Sedang	7 (36,8)	6 (31,6)	
Tinggi	5 (26,3)	10 (52,6)	

Aktivitas fisik subjek pada kelompok vegan tergolong rendah dan sedang memiliki persentase yang sama (36,8%), sedangkan pada kelompok non-vegan lebih dari separuh memiliki aktivitas yang tinggi. Nilai minimum skor aktivitas fisik sebesar 115,5 MET-menit/minggu, maksimum 5544 MET-menit/minggu dengan median sebesar 939 MET-menit/minggu pada kelompok vegan sedangkan pada kelompok non-vegan memiliki nilai minimum skor aktivitas fisik sebesar

346,5 MET-menit/minggu, maksimum 4708,5 MET-menit/minggu dengan median sebesar 1581 MET-menit/minggu. Tidak terdapat perbedaan bermakna aktivitas fisik antara vegan dan non-vegan ($p>0,05$).

Asupan Zat Gizi Subjek

Nilai minimum, maksimum, median, rerata dan simpang baku asupan karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA dan serat total subjek dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Rerata dan simpang baku asupan karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA dan serat total subjek

Asupan zat gizi	Vegan (n=19)	Non-vegan (n=19)	<i>p</i> value
	Mean ± SD	Mean ± SD	
Karbohidrat (%)	68,16 ± 8,1	70,26 ± 7,32	0,406
Lemak total (%)	18,74 ± 6	17,84 ± 5,79	0,643
Lemak jenuh (%)	7,67 ± 3,4	9,1 ± 3,76	0,194
Kolesterol (mg)	0	30,18 ± 55,62	0,000
MUFA (%)	4,15 ± 2,21	3,8 ± 1,93	0,569
PUFA (%)	6,24 ± 2,71	4,52 ± 2,08	0,046
Serat total (g)	24,36 ± 15,32	19,63 ± 8,84	0,474

Distribusi tingkat asupan meliputi asupan karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA dan serat total dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Distribusi tingkat asupan meliputi asupan karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA dan serat total

Asupan zat gizi	Vegan (n=19)	Non-vegan (n=19)
	n (%)	n (%)
Karbohidrat	Baik ($\leq 60\%$)	2 (10,5)
	Lebih ($>60\%$)	17 (89,5)
Lemak total	Kurang ($<25\%$)	16 (84,2)
	Baik (25-35%)	3 (15,8)
Lemak jenuh	Lebih ($>35\%$)	0
	Baik ($<7\%$)	8 (42,1)
Kolesterol	Lebih ($\geq 7\%$)	11 (57,9)
	Baik ($<200\text{ mg}$)	19 (100)
MUFA	Lebih ($\geq 200\text{ mg}$)	0
	Kurang ($<20\%$)	19 (100)
PUFA	Baik ($\geq 20\%$)	0
	Kurang ($<10\%$)	18 (94,7)
Serat total	Baik ($\geq 10\%$)	1 (5,3)
	Kurang ($<25\text{ g}$)	12 (63,2)
	Baik (25-30 g)	2 (10,5)
	Lebih ($>30\text{ g}$)	5 (26,3)

Rerata konsumsi karbohidrat kelompok vegan 68,16 (8,1) % dan lemak total 18,74 (6) % sedangkan rerata konsumsi karbohidrat kelompok non-vegan 70,26 (7,32) % serta lemak total 17,84 (5,79) %. Asupan lemak jenuh pada kedua

kelompok cukup tinggi dengan nilai maksimum 16,74% pada kelompok vegan dan 20,55% pada kelompok non-vegan. Asupan kolesterol pada kedua kelompok sangat baik tetapi hanya satu orang dari kelompok non-vegan yang memiliki asupan kolesterol berlebih. yaitu sebesar 210,2 mg. Asupan MUFA, PUFA dan serat total pada kedua kelompok tergolong kurang tetapi hanya satu orang pada kelompok vegan dengan asupan PUFA yang baik sebesar 13,67% serta terdapat lima orang dari kelompok vegan yang memiliki asupan serat total berlebih. Dari semua asupan zat gizi tersebut, terdapat perbedaan bermakna asupan kolesterol dan PUFA antara vegan dan non-vegan ($p<0,05$).

Kadar Kolesterol Total dan Trigliserida Subjek

Distribusi kadar kolesterol total subjek dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Distribusi kadar kolesterol total subjek berdasarkan tipe vegetarian

Kategori kadar kolesterol total	Vegan (n=19)	Non-vegan (n=19)	<i>p</i> value
	n (%)	n (%)	
Diinginkan (< 200 mg/dl)	15 (78,9)	11 (57,9)	0,073
Batas tinggi (200-239 mg/dl)	3 (15,8)	5 (26,3)	
Tinggi (≥ 240 mg/dl)	1 (5,3)	3 (15,8)	

Rerata kadar kolesterol total 161.937 ± 44.14 pada kelompok vegan dan 187.579 ± 41.48 pada non-vegan. Satu orang vegan dan tiga orang non-vegan memiliki kadar kolesterol total yang tinggi. Berdasarkan uji *independent t-test* (karena data berdistribusi normal) tidak terdapat perbedaan yang bermakna kadar kolesterol total antara kelompok vegan dan non-vegan ($p>0,05$).

Distribusi kadar trigliserida subjek dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Distribusi kadar trigliserida subjek berdasarkan tipe vegetarian

Kategori kadar trigliserida	Vegan (n=19)	Non-vegan (n=19)	<i>p</i> value
	n (%)	n (%)	
Normal (< 150 mg/dl)	17 (89,5)	17 (89,5)	0,884
Batas tinggi (150-199 mg/dl)	2 (10,5)	2 (10,5)	
Tinggi (200-499 mg/dl)	0	0	
Sangat tinggi (≥ 500 mg/dl)	0	0	

Sebagian besar subjek (89,5%) memiliki kadar trigliserida yang normal pada masing-masing kelompok. Rerata kadar trigliserida vegan $84,66 \pm 40,43$ mg/dl sedangkan non-vegan $86,16 \pm 45,40$ mg/dl. Nilai minimum kadar trigliserida pada kelompok vegan sebesar 42 mg/dl, maksimum 189 mg/dl dengan median sebesar 71 mg/dl, sedangkan pada kelompok non-vegan nilai minimum

kadar trigliserida 31 mg/dl, maksimum 171 mg/dl dengan median sebesar 78 mg/dl. Berdasarkan uji *Mann-Whitney* (karena data berdistribusi tidak normal) tidak terdapat perbedaan yang bermakna kadar trigliserida antara kelompok vegan dan non-vegan ($Z=-0.146$; $p>0,05$).

Usia, lama menjadi vegetarian, aktivitas fisik, IMT dan asupan zat gizi (karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA dan serat total) merupakan variabel kontrol untuk melihat perbedaan kadar kolesterol total dan trigliserida. Oleh karena itu dilakukan analisis bivariat untuk melihat perbedaan kadar kolesterol total dan trigliserida berdasarkan variabel-variabel kontrol tersebut pada kelompok vegan dan non-vegan. Hasil uji beda dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil uji beda kadar kolesterol total dan trigliserida subjek berdasarkan variabel-variabel kontrol

Variabel kontrol	<i>p</i> value	
	Kolesterol Total	Trigliserida
Usia**	0,035*	0,044*
Lama menjadi vegetarian	0,232	0,341
IMT**	0,832	0,445
Aktivitas fisik	0,540	0,160
Asupan karbohidrat (%)**	0,911	0,288
Asupan lemak total (%)**	0,929	0,376
Asupan lemak jenuh (%)	0,875	0,536
Asupan kolesterol (mg)	0,540	0,832
Asupan MUFA (%)	0,490	0,168
Asupan PUFA (%)	0,730	0,154
Asupan serat total (g)	0,925	0,419

Ket: * signifikan, ** uji *independent t-test*

Berdasarkan uji *independent t-test* untuk data berdistribusi normal dan *Mann-Whitney* untuk data berdistribusi tidak normal, diketahui tidak terdapat perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan lama menjadi vegetarian, IMT, aktivitas fisik dan asupan zat gizi (karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA dan serat total) serta terdapat perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan usia ($p<0,05$). Rerata usia subjek yang memiliki kadar kolesterol total normal (< 200mg/dl) adalah $37,08 \pm 13,67$ sedangkan usia subjek yang memiliki kadar kolesterol total tidak normal (≥ 200 mg/dl) yaitu $47,42 \pm 13,13$.

Berdasarkan uji *independent t-test* untuk data berdistribusi normal dan *Mann-Whitney* untuk data berdistribusi tidak normal, diketahui tidak terdapat perbedaan kadar trigliserida berdasarkan lama menjadi vegetarian, IMT, aktivitas fisik dan asupan zat gizi (karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA dan serat total) serta terdapat perbedaan kadar trigliserida berdasarkan usia ($p<0,05$). Rerata usia subjek yang memiliki kadar trigliserida normal ($< 150\text{mg/dl}$) adalah $38,59 \pm 13,6$ sedangkan usia subjek yang memiliki kadar trigliserida tidak normal ($\geq 150 \text{ mg/dl}$) yaitu $55,25 \pm 10,78$.

Perbedaan Kadar Kolesterol Total dan Kadar Trigliserida pada Vegetarian Vegan dan Non-vegan Setelah Dikontrol dengan Usia

Berdasarkan hasil analisis bivariat diketahui bahwa usia merupakan variabel kontrol yang mempengaruhi adanya perbedaan kadar kolesterol total dan trigliserida. Oleh karena itu dilakukan analisis multivariat untuk melihat perbedaan kadar kolesterol total dan trigliserida antara vegetarian vegan dan non-vegan yang dikontrol dengan usia. Tabel multivariat hasil pengujian ANCOVA dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil uji ANCOVA

Variabel		<i>p</i> value
Tipe vegetarian	Kadar kolesterol total	0,949
	Kadar trigliserida	0,476
Usia	Kadar kolesterol total	0,008*
	Kadar trigliserida	0,003*

Ket: * signifikan

Adjusted R Squared = 0,154 untuk kolesterol total dan adjusted R Squared = 0,284 untuk trigliserida

Berdasarkan pengujian ANCOVA, variabel usia sebagai variabel kontrol diketahui signifikan terhadap perbedaan kadar kolesterol total dan trigliserida antara vegetarian vegan dan non-vegan. Sebesar 15,4% variabel tipe vegetarian dan usia memberikan kontribusi pada kadar kolesterol total serta sebesar 28,4% variabel tipe vegetarian dan usia memberikan kontribusi pada kadar trigliserida. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan kolesterol total dan trigliserida antara kelompok vegan dan non-vegan lebih bermakna berdasarkan variabel usia

($p<0,05$), sedangkan kolesterol total dan trigliserida tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan berdasarkan tipe vegetarian ($p>0,05$).

Perilaku Makan Subjek

Pada penelitian ini dilakukan pula wawancara mendalam terhadap 14 subjek (8 subjek vegan dan 6 subjek non-vegan) mengenai perilaku makan. Sebagian besar subjek mengatakan alasan menjadi vegetarian adalah karena agama, moral dan etika. Alasan agama merupakan alasan awal mula subjek menjadi vegetarian karena sebagian besar subjek beragama Buddha yang menganjurkan setiap umatnya untuk menghindari makanan yang berasal dari hewani. Subjek berpendapat bahwa hewan adalah makhluk hidup sama seperti manusia yang dapat merasakan sakit. Beberapa di antara subjek pernah melihat film dokumenter mengenai proses hewan ternak sebelum disembelih hingga menjadi potongan-potongan daging yang siap dijual ke konsumen dan proses tersebut membuat mereka sadar bahwa hewan seharusnya diperlakukan dengan baik sehingga mereka berkomitmen tidak akan makan produk hewani lagi. Selain alasan-alasan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatan juga merupakan salah satu alasan subjek menjalani diet vegetarian. Informasi-informasi mengenai kesehatan dan gizi vegetarian didapatkan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan IVS. Subjek merasa jauh lebih sehat dan fit setelah menjadi vegetarian tetapi ada juga yang merasa tidak ada perubahan sebelum maupun setelah menjadi vegetarian serta ada yang merasa jiwanya lebih tenang karena tidak membunuh hewan untuk dimakan dagingnya. Selain subjek, anggota keluarga lainnya (orangtua, suami, anak dan saudara) juga menjadi vegetarian. Ada beberapa subjek yang menyatakan bahwa alasan mereka menjadi vegetarian adalah karena mengikuti orangtua ataupun anak yang lebih dulu menjalaninya. Bahkan ada subjek yang merasa bertanggungjawab terhadap kesehatan keluarganya sehingga suami dan anak-anaknya diarahkan untuk menjadi vegetarian dan akhirnya satu keluarga tersebut memulai menjadi vegetarian pada waktu yang bersamaan.

Sebelum menjadi vegan, sebagian besar subjek merupakan lakto-ovo vegetarian selama bertahun-tahun tetapi ada pula subjek yang langsung memilih menjadi vegan. Pada kelompok non-vegan juga sudah menjalani dietnya selama > 11 tahun bahkan ada yang > 50 tahun. Hal tersebut membuat mereka tidak tertarik untuk mengkonsumsi produk hewani lagi bahkan saat diundang ke acara teman yang bukan vegetarian, subjek akan makan makanan vegetarian yang memang sudah disiapkan oleh tuan rumah tetapi jika tidak ada makanan vegetarian maka subjek lebih memilih tidak makan di acara tersebut, ada yang sudah makan sebelum pergi dan ada pula yang membawa bekal makanan dari rumah untuk dimakan di acara tersebut. Subjek lebih memilih makan masakan rumah tetapi pada saat pergi ke luar rumah ataupun ke luar kota subjek akan memilih restoran vegetarian yang memang sudah dipercaya bahwa restoran tersebut benar-benar hanya menyajikan makanan vegetarian. Jika subjek tidak menemukan restoran vegetarian, mereka terpaksa makan di restoran umum tetapi tetap akan meminta dibuatkan makanan vegetarian dan untuk makanan berkuah subjek akan selalu bertanya bahan pembuatan kaldunya serta meminta sayuran sebagai kaldunya. Subjek menyatakan saat mencium bau daging mereka merasa baunya amis sehingga mual dan ingin muntah jadi sangat tidak mungkin untuk mencoba kembali makanan tersebut. Subjek lain menyatakan bahwa sejak kecil sudah tertanam dalam hati produk-produk hewani tersebut bukanlah makanannya sehingga sampai kapanpun tidak akan pernah mau mencoba makanan itu.

Sejak menjadi vegetarian, subjek akan mencari bahan makanan lain dari nabati yang dapat menggantikan daging dan produk hewani lainnya. Bahan makanan tersebut antara lain tempe, tahu, jamur, kacang-kacangan dan gluten. Gluten merupakan daging imitasi yang terbuat dari tepung. Beberapa subjek jarang mengkonsumsi gluten dengan berbagai alasan yaitu tidak suka rasanya, mengandung pengawet dan takut ada campuran putih telur di dalamnya. Satu subjek menyatakan bahwa dia hanya akan mengkonsumsi gluten yang dibuat oleh ayahnya sendiri karena tahu dengan jelas tidak akan ada campuran putih telurnya ataupun produk hewani lainnya. Beberapa subjek mengkonsumsi gluten hanya sebagai variasi agar tidak bosan terutama bagi anak-anaknya yang masih kecil.

Tiga cara pengolahan makanan yang sering subjek lakukan yaitu makanan akan ditumis, direbus dan digoreng tetapi ada pula subjek yang lebih memilih untuk merebus dan mengukus makanannya. Sayuran selalu ada setiap kali mereka makan dengan berbagai variasi menu dan porsi sayur yang dimakan lebih banyak dibandingkan saat belum menjadi vegetarian. Konsumsi buah tidak sesering sayur yang setiap kali makan selalu ada. Beberapa subjek mengkonsumsi buah setiap hari karena sangat menyukai buah tetapi ada pula yang menyatakan tidak terlalu menyukai buah. Subjek non-vegan menyatakan sudah tidak mengkonsumsi susu dan telur secara utuh serta menghindari roti / kue yang masih menggunakan susu dan telur sebagai bahannya. Namun, bagi para biarawati non-vegan tidak mungkin menolak / membuang roti dan kue pemberian umatnya sehingga mereka tetap memakannya meskipun mereka mengetahui bahwa roti dan kue tersebut masih mengandung susu / telur di dalamnya. Sebaliknya, subjek vegan lebih memilih membuat roti dan kue sendiri. Mereka mengganti telur dengan tahu sutra sebagai perekat.

PEMBAHASAN

Karakteristik Subjek Penelitian

Jenis kelamin dan usia merupakan beberapa faktor yang tidak dapat diubah yang memberikan pengaruh terhadap perubahan profil lipid. Kejadian PJK akan meningkat seiring bertambahnya usia baik pada pria maupun wanita. Studi yang dilakukan pada 178 wanita sehat dan non-*obese* diketahui bahwa wanita yang berusia 20-35 tahun memiliki kadar profil lipid lebih rendah dibandingkan wanita berusia > 50 tahun.¹⁹ Hal tersebut disebabkan karena wanita pada usia 20-35 tahun belum mengalami menopause. Hormon estrogen pada wanita premenopause memiliki efek protektif terhadap perubahan profil lipid tetapi penurunan hormon estrogen yang disebabkan oleh menopause akan meningkatkan risiko kejadian PJK terutama jika sudah menginjak usia 55 tahun.^{9,10} Penelitian lain menunjukkan bahwa wanita cenderung memiliki komposisi lemak tubuh yang tinggi dibanding pria pada kelompok usia yang sama.²⁰ Distribusi lemak tubuh terutama di area jaringan adiposa viseral, dapat mempengaruhi perubahan profil lipid darah.^{19,21}

Oleh karena itu, NCEP menyarankan bahwa pemeriksaan kadar lipid dan lipoprotein darah dimulai pada usia 20 tahun sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan primer terhadap beberapa faktor risiko kejadian PJK yang sudah dideteksi lebih dini.⁹ Paparan di atas merupakan alasan yang melatarbelakangi jenis kelamin wanita dipilih sebagai subjek pada penelitian ini.

Dari 38 subjek, sebagian besar beragama Buddha. Agama Buddha memang menganjurkan umatnya untuk menjadi vegetarian yang bertujuan untuk pemurnian diri.²² Di samping itu, kesadaran menjaga kesehatan juga merupakan salah satu faktor subjek memilih menjadi vegetarian. Hal tersebut didukung dengan tingkat pendidikan yang tinggi yaitu > 50% subjek pada masing-masing kelompok berpendidikan akademi / perguruan tinggi. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan. Pengetahuan berperan penting dalam perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.²³ Pengetahuan subjek tidak hanya didapatkan dari pendidikan tetapi juga dari seminar-seminar mengenai gizi vegetarian yang diselenggarakan oleh IVS.

Perbedaan Kadar Kolesterol Total dan Trigliserida Subjek Penelitian

Pada penelitian De Biase et. al tanpa membedakan jenis kelamin dan rerata subjek pada masing-masing kelompok berada di bawah 40 tahun, diketahui bahwa tiga kelompok vegetarian (vegan, lakto vegetarian dan lakto-ovo vegetarian) memiliki kadar kolesterol total dan trigliserida yang rendah dibandingkan non-vegetarian. Vegan merupakan kelompok yang memiliki kadar kolesterol total dan trigliserida terendah.¹² Penelitian tersebut didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan kadar kolesterol total dan trigliserida antara vegetarian dan non-vegetarian dengan rerata usia subjek di bawah 40 tahun.¹¹ Akan tetapi pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kadar kolesterol total dan trigliserida antara vegan dan non-vegan. Hal tersebut mungkin disebabkan rerata usia subjek non-vegan lebih tinggi ($41,42 \pm 13,5$) dibandingkan vegan ($39,26 \pm 15,14$ dan $41,42 \pm 13,5$). Selain itu, subjek yang dipilih dalam penelitian ini hanya wanita sehingga

faktor jenis kelamin tersebut mengakibatkan hasil penelitian ini tidak konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya. Namun, sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kadar kolesterol total dan trigliserida pada vegan lebih rendah dibandingkan non-vegan.

Pada penelitian De Biase et. al juga diketahui bahwa hanya variabel usia yang memiliki pengaruh signifikan pada kadar kolesterol total dan trigliserida dibandingkan dengan variabel jenis kelamin.¹² Berdasarkan analisis multivariat, diketahui bahwa variabel usia merupakan satu-satunya variabel kontrol yang dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan kadar kolesterol total dan trigliserida. Studi yang dilakukan De Nino pada 178 wanita sehat dan non-*obese* dengan subjek berusia 20-50 tahun lebih banyak daripada subjek berusia > 50 tahun, juga mengemukakan bahwa perubahan kadar kolesterol dan trigliserida dipengaruhi oleh usia, di mana pertambahan usia akan meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida.¹⁹ Selain faktor usia, perubahan profil lipid darah juga dipengaruhi oleh penurunan hormon estrogen pada wanita usia tua dan yang sudah mengalami menopause.^{9,10} Studi yang dilakukan pada wanita produktif dan menopause, diketahui bahwa wanita yang sudah mengalami menopause (46-55 tahun) cenderung memiliki kadar kolesterol total dan trigliserida yang tinggi dibandingkan usia produktif (16-45 tahun).²⁴ Hal tersebut dapat memberikan penjelasan terkait hasil penelitian ini, di mana subjek yang memiliki kadar kolesterol total tinggi (≥ 240 mg/dl) dan trigliserida dalam batas tinggi (150-199 mg/dl) berusia > 50 tahun. Sebanyak 21 subjek (80,77%) dari 26 total subjek vegetarian yang memiliki kadar kolesterol total normal (< 200 mg/dl) dan 25 subjek (73,53%) dari 34 total subjek vegetarian yang memiliki kadar trigliserida normal (< 150 mg/dl) berada dalam usia produktif.

Lama vegetarian berpengaruh pada rendahnya kadar kolesterol total. Diet vegetarian yang dijalani ≥ 12 tahun memiliki kadar kolesterol total lebih rendah dibandingkan diet vegetarian yang dijalani 6-11 tahun.¹¹ Dari keempat subjek (satu subjek vegan dan tiga subjek non-vegan) yang memiliki kadar kolesterol total tinggi, hanya satu subjek yang menjalani diet vegetarian < 6 tahun dengan kadar kolesterol paling tinggi di antara yang lain. Namun, lama vegetarian tidak

berpengaruh signifikan terhadap rendahnya kadar trigliserida. Kadar trigliserida terendah dimiliki oleh subjek yang menjalani diet vegetarian < 6 tahun sedangkan diet vegetarian selama 6-11 tahun diketahui memiliki kadar trigliserida tertinggi.¹¹ Pada penelitian ini empat subjek (masing-masing dua subjek pada tiap kelompok) memiliki kadar trigliserida dalam batas tinggi dan keempatnya menjalani diet vegetarian > 6 tahun.

Pada penelitian ini diketahui terdapat perbedaan yang signifikan IMT antara vegan dan non-vegan. Rerata IMT pada vegan lebih rendah dibandingkan non-vegan. Seseorang dengan IMT *overweight* ataupun *obese* memiliki faktor risiko PJK cukup tinggi yang meliputi tingginya kadar kolesterol total dan trigliserida.⁹ Dari hasil penelitian diketahui tiga subjek non-vegan yang memiliki kadar trigliserida dalam batas tinggi (150-199 mg/dl) juga memiliki IMT *overweight* dan obesitas sedangkan hanya satu orang non-vegan yang memiliki kadar kolesterol total tinggi dengan IMT *overweight*. Aktivitas fisik juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol total dan trigliserida. Rendahnya aktivitas fisik menurunkan *energy expenditure* dan berkontribusi terhadap obesitas yang berkaitan dengan faktor risiko lipid dan non-lipid. Dengan demikian, peningkatan aktivitas fisik akan dapat menurunkan IMT sehingga dapat memperbaiki profil lipid di antaranya penurunan kadar kolesterol total dan trigliserida.⁹ Namun, berdasarkan hasil penelitian diketahui aktivitas fisik antara vegan dan non-vegan tidak memiliki perbedaan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol total maupun trigliserida.

Selain IMT dan aktivitas fisik, asupan zat gizi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol total dan trigliserida. Asupan makan vegan tidak menyertakan produk hewani sama sekali. Hal tersebut berbeda dengan non-vegan yang masih mengkonsumsi produk hewani meliputi susu, telur dan produk olahannya. Telur dan produk susu merupakan sumber kolesterol dan lemak jenuh yang berasal dari makanan. Telur menyumbang 1/3 kolesterol dalam makanan. Asupan kolesterol meningkatkan rasio kolesterol total / HDL yang berpengaruh pada kadar kolesterol serum. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh akan menyebabkan peningkatan pada kadar kolesterol darah (hiperkolesterolemia),

kejadian PJK dan kematian. Asupan karbohidrat, MUFA, PUFA dan serat total juga dapat mempengaruhi profil lipid darah. Asupan MUFA, PUFA dan serat total diketahui memiliki efek positif terhadap profil lipid darah. Dibandingkan dengan MUFA, substitusi lemak jenuh dengan karbohidrat akan meningkatkan kadar trigliserida. Peningkatan kadar trigliserida akan berkurang saat karbohidrat dikonsumsi bersamaan dengan asupan tinggi serat.^{9,10}

Berdasarkan hasil penelitian, hanya asupan kolesterol dan PUFA yang berbeda signifikan antara vegan dan non-vegan. Namun, asupan zat gizi tersebut (karbohidrat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, MUFA, PUFA dan serat total) tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida. Hal tersebut mungkin disebabkan sebagian subjek non-vegan sudah tidak mengkonsumsi susu dan telur secara utuh, tetapi sesekali masih mengkonsumsi produk olahannya seperti roti, biskuit dan kue. Meskipun demikian, rerata asupan MUFA, PUFA dan serat total pada vegan lebih tinggi dibanding non-vegan. Sebaliknya, rerata asupan kolesterol dan lemak jenuh pada non-vegan lebih tinggi dibanding vegan. Pengolahan makanan dengan cara digoreng dapat memberikan kontribusi terhadap asupan lemak jenuh yang tinggi meskipun subjek non-vegan sudah tidak mengkonsumsi produk susu dan telur secara utuh.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sulitnya mendapatkan subjek vegan sehingga peneliti harus mencari subjek vegan di kota yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan pemeriksaan kadar kolesterol total dan trigliserida dilakukan oleh laboratorium klinik yang berbeda pula sehingga tidak menutup kemungkinan metode yang digunakan juga berbeda. Selain itu, perbedaan penafsiran instrumen penelitian (seperti kuesioner aktivitas fisik dan FFSQ) oleh enumerator dapat menyebabkan perbedaan dalam wawancara dengan responden.

SIMPULAN

Tidak terdapat perbedaan signifikan kadar kolesterol total dan trigliserida antara wanita vegetarian vegan dan non-vegan tetapi terdapat perbedaan signifikan IMT pada vegan dan non-vegan. Usia merupakan satu-satunya variabel

kontrol yang berpengaruh pada kadar kolesterol total dan trigliserida baik pada vegan maupun non-vegan. Kadar kolesterol total dan trigliserida kelompok vegan lebih rendah dibandingkan non-vegan. Sejak menjadi vegetarian, baik pada kelompok vegan maupun non-vegan menyatakan tidak pernah dan tidak ingin lagi mengkonsumsi produk hewani dengan berbagai alasan antara lain merasa lebih sehat tanpa makan produk hewani, merasa bahwa produk hewani tersebut bukanlah makanannya dan merasa mual serta ingin muntah saat mencium bau amis dari produk hewani tersebut.

SARAN

Kadar kolesterol total yang tinggi dan trigliserida dalam batas tinggi ditemukan pada subjek vegan maupun non-vegan. Usia > 50 tahun dan IMT *overweight* maupun *obese* perlu diperhatikan karena hal tersebut merupakan faktor risiko peningkatan kadar kolesterol total dan trigliserida. Asupan zat gizi yang sesuai dengan rekomendasi NCEP ATP III dan peningkatan aktivitas fisik merupakan beberapa cara untuk memperoleh kadar kolesterol dan trigliserida dalam batas normal.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membandingkan keempat profil lipid (kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL dan trigliserida) tidak hanya pada wanita vegan dan non-vegan tetapi juga pada pria dengan menyertakan variabel yang belum diteliti seperti kandungan lemak tubuh di daerah jaringan adiposa viseral ataupun dengan desain penelitian lain yang memiliki jangka waktu cukup lama seperti *case-control* atau kohort.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak IVS Surabaya dan Semarang serta SUMA Ching Hai Yogyakarta atas kerjasama, kebaikan, dan partisipasinya di dalam penelitian ini. Terima kasih penulis sampaikan pula kepada Dra. Ani Margawati, M.Kes, Ph.D. selaku dosen pembimbing dan para reviewer, Prof. dr. H. M. Sulchan, M.Sc, DA. Nutr, Sp.GK dan Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si, atas saran dan kritik yang membangun serta semua pihak yang telah

membantu kelancaran penyusunan artikel ini. Terakhir, terima kasih untuk kedua orangtua, keluarga, dan teman seangkatan atas doa serta dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. ADA Reports. Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets. *J Am Diet Assoc*. 2009;109:1266-1282.
2. Susianto. Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan IMT/U pada balita vegetarian laktosovo dan non vegetarian di DKI Jakarta tahun 2008. [Tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia. 2008. Available at http://gizi.net/makalah/download/tesis_susianto.pdf [accessed on February 17th, 2012].
3. Sabaté J, Ratzin-Turner RA, Brown JE. Vegetarian diet: descriptions and trends. In: Joan Sabaté, editor. *Vegetarian nutrition*. USA: CRC Press LLC; 2001. p 3-17.
4. Key TJ, Appleby PN. Vegetarianism, coronary risk factors, and coronary heart disease. In: Joan Sabaté, editor. *Vegetarian Nutrition*. USA: CRC Press LLC; 2001. p 33-48.
5. Mills PK. Vegetarian diets and cancer risk. In: Joan Sabaté, editor. *Vegetarian Nutrition*. USA: CRC Press LLC; 2001. p 55-86.
6. Rajaram S, Wien M. Vegetarian diets in the prevention of osteoporosis, diabetes, and neurological disorders. In: Joan Sabaté, editor. *Vegetarian nutrition*. USA: CRC Press LLC; 2001. p 110-129.
7. Sabaté J, Blix G. Vegetarian diets and obesity prevention. . In: Joan Sabaté, editor. *Vegetarian nutrition*. USA: CRC Press LLC; 2001. p 91-105.
8. Craig WJ. Health effects of vegan diets. *Am J Clin Nutr* 2009; 89(suppl):1627S-33S.
9. National Cholesterol Education Program. Detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adult (Adult Treatment Panel III). Final report. National Institutes of Health-NIH Publication 2002; 106:3143.
10. Krummel DA. Medical nutrition therapy for cardiovascular disease. In: Mahan LK, Sylvia ES, editors. *Krause's food, nutrition and diet therapy*, 12th edition. USA: Saunders. 2008. 32:833-860.
11. Yang SY et.al. Relationship of carotid intima-media thickness and duration of vegetarian diet in Chinese male vegetarians. *Nutrition & Metabolism* 2011, 8:63.
12. De Biase SG, Fernandez SFC, Gianini RJ, Duarte JLG. Vegetarian Diet and Cholesterol and Triglycerides Levels. *Arq bras Cardiol* 2007;88(Pt 1):32-6.
13. Kim MK, Cho Sang Woon and Park Yoo Kyoung. Long-term vegetarians have low oxidative stress, body fat, and cholesterol levels. *Nutr Res Pract* 2012; 6(2): 155-161.
14. Sutiari NK. Konsumsi, status gizi, dan kesehatan masyarakat vegetarian dan nonvegetarian di Bali. [tesis]. Bogor: IPB. 2008.

15. Deriemaeker P et al. Health aspects, nutrition and physical characteristics in matched samples of institutionalized vegetarian and non-vegetarian elderly (> 65 yrs). *Nutrition & Metabolism* 2011, 8:37.
16. Miller M et.al. Triglycerides and Cardiovascular Disease : A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2011, 123:2292-2333.
17. WHO/IOTF/IASO. 2000. The Asia-Pacific perspective: Redefining Obesity and its treatment. Hong Kong: World Health Organization, International Obesity Task Force, International Association for the Study of Obesity.
18. International Physical Activity Questionnaire. Guidelines for data processing and analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Short and Long Form. Revised November 2005. Available from : www.ipaq.ki.se.
19. De Nino WF et.al. Contribution of abdominal adiposity to age-related differences in insulin sensitivity and plasma lipids in health non obese women. *Diabetes Care* 2001;24:925-932.
20. Szymanska JO, Wozniak EH, Platkowska I, Malara M. Effect of age, gender, and physical activity on plasma lipid profile. *Biomedical Human Kinetics* 2011;3:1-5.
21. Miller WM, Janosz KEN, Lillystone M, Yanes J, McCoulough PA. Obesity and lipids. *Current Cardiology Reports* 2005;7:465-70.
22. Larsson CL, Johansson GK. Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. *Am J Clin Nutr* 2002;76:100-6.
23. Soekidjo Notoatmodjo. Pendidikan perilaku kesehatan. Jakarta: Rhineka Cipta. 2003.p.215-8.
24. Bhagya V, Hemalatha NR, Veeranna HB, Banu V. Serum lipid profile in pubertal, reproductive and postmenopausal women. *Int J Biol Med Res.* 2011; 2(3): 639-642.

LAMPIRAN

kategori usia * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori usia	20-29	Count	6	4
		% within kategori usia	60.0%	40.0%
		% within tipe vegetarian	31.6%	21.1%
	30-39	Count	4	5
		% within kategori usia	44.4%	55.6%
		% within tipe vegetarian	21.1%	26.3%
	40-49	Count	4	3
		% within kategori usia	57.1%	42.9%
		% within tipe vegetarian	21.1%	15.8%
	50-59	Count	2	5
		% within kategori usia	28.6%	71.4%
		% within tipe vegetarian	10.5%	26.3%
	>60	Count	3	2
		% within kategori usia	60.0%	40.0%
		% within tipe vegetarian	15.8%	10.5%

kategori lama menjadi vegetarian * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori lama menjadi vegetarian	< 6 tahun	Count	15	1
		% within kategori lama menjadi vegetarian	93.8%	6.3%
		% within tipe vegetarian	78.9%	5.3%
	6 - 11 tahun	Count	3	3
		% within kategori lama menjadi vegetarian	50.0%	50.0%
		% within tipe vegetarian	15.8%	15.8%
	> 11 tahun	Count	1	15
		% within kategori lama menjadi vegetarian	6.3%	93.8%
		% within tipe vegetarian	5.3%	78.9%

agama responden * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
agama responden	Buddha	Count	8	19
		% within agama responden	29.6%	70.4%
		% within tipe vegetarian	42.1%	100.0%

non-Buddha	Count	11	0
	% within agama responden	100.0%	.0%
	% within tipe vegetarian	57.9%	.0%

pendidikan responden * tipe vegetarian Crosstabulation

pendidikan responden	SD	Count	tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
pendidikan responden	SD	% within pendidikan responden	33.3%	66.7%
		% within tipe vegetarian	5.3%	10.5%
SMP	SD	Count	1	3
		% within pendidikan responden	25.0%	75.0%
		% within tipe vegetarian	5.3%	15.8%
SMA	SD	Count	5	3
		% within pendidikan responden	62.5%	37.5%
		% within tipe vegetarian	26.3%	15.8%
perguruan tinggi	SD	Count	12	11
		% within pendidikan responden	52.2%	47.8%
		% within tipe vegetarian	63.2%	57.9%

kategori IMT * tipe vegetarian Crosstabulation

kategori IMT	underweight	Count	tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori IMT	underweight	% within kategori IMT	100.0%	.0%
		% within tipe vegetarian	15.8%	.0%
kategori IMT	normal weight	Count	9	7
		% within kategori IMT	56.3%	43.8%
		% within tipe vegetarian	47.4%	36.8%
kategori IMT	overweight	Count	5	7
		% within kategori IMT	41.7%	58.3%
		% within tipe vegetarian	26.3%	36.8%
kategori IMT	obese I	Count	2	4
		% within kategori IMT	33.3%	66.7%
		% within tipe vegetarian	10.5%	21.1%
kategori IMT	obese II	Count	0	1
		% within kategori IMT	.0%	100.0%
		% within tipe vegetarian	.0%	5.3%

kategori aktivitas fisik * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori aktivitas fisik	rendah	Count	7	3
		% within kategori aktivitas fisik	70.0%	30.0%
		% within tipe vegetarian	36.8%	15.8%
	sedang	Count	7	6
		% within kategori aktivitas fisik	53.8%	46.2%
		% within tipe vegetarian	36.8%	31.6%
	tinggi	Count	5	10
		% within kategori aktivitas fisik	33.3%	66.7%
		% within tipe vegetarian	26.3%	52.6%

kategori karbohidrat * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori karbohidrat	baik	Count	2	2
		% within kategori karbohidrat	50.0%	50.0%
		% within tipe vegetarian	10.5%	10.5%
	lebih	Count	17	17
		% within kategori karbohidrat	50.0%	50.0%
		% within tipe vegetarian	89.5%	89.5%

kategori lemak total * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori lemak total	kurang	Count	16	17
		% within kategori lemak total	48.5%	51.5%
		% within tipe vegetarian	84.2%	89.5%
	baik	Count	3	2
		% within kategori lemak total	60.0%	40.0%
		% within tipe vegetarian	15.8%	10.5%

kategori lemak jenuh * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori lemak jenuh	baik	Count	8	4
		% within kategori lemak jenuh	66.7%	33.3%
		% within tipe vegetarian	42.1%	21.1%

	lebih	Count	11	15
		% within kategori lemak jenuh	42.3%	57.7%
		% within tipe vegetarian	57.9%	78.9%

kategori kolesterol * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori kolesterol	baik	Count	19	18
		% within kategori kolesterol	51.4%	48.6%
		% within tipe vegetarian	100.0%	94.7%
	lebih	Count	0	1
		% within kategori kolesterol	.0%	100.0%
		% within tipe vegetarian	.0%	5.3%

kategori MUFA * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori MUFA	kurang	Count	19	19
		% within kategori MUFA	50.0%	50.0%
		% within tipe vegetarian	100.0%	100.0%

kategori PUFA * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori PUFA	kurang	Count	18	19
		% within kategori PUFA	48.6%	51.4%
		% within tipe vegetarian	94.7%	100.0%
	baik	Count	1	0
		% within kategori PUFA	100.0%	.0%
		% within tipe vegetarian	5.3%	.0%

kategori serat total * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori serat total	kurang	Count	12	16
		% within kategori serat total	42.9%	57.1%
		% within tipe vegetarian	63.2%	84.2%
	baik	Count	2	1
		% within kategori serat total	66.7%	33.3%
		% within tipe vegetarian	10.5%	5.3%

lebih	Count	5	2
	% within kategori serat total	71.4%	28.6%
	% within tipe vegetarian	26.3%	10.5%

kategori kolesterol total * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori kolesterol total	diinginkan	Count	15	11
		% within kategori kolesterol total	57.7%	42.3%
		% within tipe vegetarian	78.9%	57.9%
	batas tinggi	Count	3	5
		% within kategori kolesterol total	37.5%	62.5%
		% within tipe vegetarian	15.8%	26.3%
	tinggi	Count	1	3
		% within kategori kolesterol total	25.0%	75.0%
		% within tipe vegetarian	5.3%	15.8%

kategori trigliserida * tipe vegetarian Crosstabulation

			tipe vegetarian	
			vegan	non vegan
kategori trigliserida	Normal	Count	17	17
		% within kategori trigliserida	50.0%	50.0%
		% within tipe vegetarian	89.5%	89.5%
	batas tinggi	Count	2	2
		% within kategori trigliserida	50.0%	50.0%
		% within tipe vegetarian	10.5%	10.5%

Tests of Normality

	tipe vegetarian	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
usia responden	vegan	.114	19	.200*	.925	19	.143
	non vegan	.129	19	.200*	.934	19	.201
lama menjadi vegetarian	vegan	.256	19	.002	.834	19	.004
	non vegan	.259	19	.002	.777	19	.001
indeks massa tubuh responden	vegan	.132	19	.200*	.968	19	.743
	non vegan	.216	19	.019	.925	19	.142
kadar kolesterol total responden	vegan	.104	19	.200*	.985	19	.984
	non vegan	.118	19	.200*	.940	19	.258
kadar trigliserida responden	vegan	.255	19	.002	.834	19	.004
	non vegan	.221	19	.016	.901	19	.050

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Tests of Normality

	tipe vegetarian	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
pendidikan responden	vegan	.366	19	.000	.677	19	.000
	non vegan	.346	19	.000	.736	19	.000
pekerjaan responden	vegan	.279	19	.000	.839	19	.004
	non vegan	.201	19	.043	.877	19	.019
skor aktivitas fisik	vegan	.226	19	.012	.834	19	.004
	non vegan	.163	19	.200*	.920	19	.111
kategori usia	vegan	.180	19	.107	.867	19	.013
	non vegan	.193	19	.060	.900	19	.048
kategori aktivitas fisik	vegan	.234	19	.007	.805	19	.001
	non vegan	.323	19	.000	.753	19	.000
kategori IMT	vegan	.303	19	.000	.855	19	.008
	non vegan	.219	19	.017	.848	19	.006

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Tests of Normality^b

tipe vegetarian	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
persen asupan karbohidrat terhadap total asupan energi	vegan	.147	19	.200*	.952	19
	non vegan	.168	19	.162	.942	19
persen asupan lemak total terhadap total asupan energi	vegan	.202	19	.041	.953	19
	non vegan	.144	19	.200*	.931	19
persen asupan lemak jenuh terhadap total asupan energi	vegan	.121	19	.200*	.954	19
	non vegan	.171	19	.144	.880	19
asupan kolesterol dalam mg	non vegan	.295	19	.000	.585	19
persen asupan MUFA terhadap total asupan energi	vegan	.160	19	.200*	.887	19
	non vegan	.173	19	.136	.904	19
persen asupan PUFA terhadap total asupan energi	vegan	.156	19	.200*	.940	19
	non vegan	.215	19	.021	.860	19
asupan serat total	vegan	.175	19	.129	.833	19
	non vegan	.121	19	.200*	.946	19
						.343

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

b. asupan kolesterol dalam mg is constant when tipe vegetarian = vegan. It has been omitted.

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference		
usia responden	Equal variances assumed	.297	.589	-.464	36	.646	-2.158	4.653	-11.595	7.279
	Equal variances not assumed			-.464	35.539	.646	-2.158	4.653	-11.599	7.283
indeks massa tubuh responden	Equal variances assumed	.302	.586	-2.764	36	.009	-2.7911	1.0098	-4.8390	-.7431
	Equal variances not assumed			-2.764	34.436	.009	-2.7911	1.0098	-4.8422	-.7399
kadar kolesterol total responden	Equal variances assumed	.083	.775	-1.845	36	.073	-25.6421	13.8964	-53.8253	2.5411
	Equal variances not assumed			-1.845	35.862	.073	-25.6421	13.8964	-53.8291	2.5448
persen asupan karbohidrat terhadap total asupan energi	Equal variances assumed	.054	.817	-.841	36	.406	-2.10526	2.50392	-7.18345	2.97292
	Equal variances not assumed			-.841	35.636	.406	-2.10526	2.50392	-7.18525	2.97473
persen asupan lemak total terhadap total asupan energi	Equal variances assumed	.029	.866	.468	36	.643	.89474	1.91196	-2.98290	4.77237
	Equal variances not assumed			.468	35.953	.643	.89474	1.91196	-2.98307	4.77254

Mann-Whitney

Test Statistics^b

	lama menjadi vegetarian	pekerjaan responden	skor aktivitas fisik	pendidikan responden	kadar trigliserida responden	kategori usia	kategori aktivitas fisik	kategori IMT
Mann-Whitney U	26.000	176.500	126.000	162.000	175.500	163.000	122.500	109.000
Wilcoxon W	216.000	366.500	316.000	352.000	365.500	353.000	312.500	299.000
Z	-4.517	-.120	-1.591	-.616	-.146	-.523	-1.804	-2.222
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.904	.112	.538	.884	.601	.071	.026
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.000 ^a	.908 ^a	.116 ^a	.603 ^a	.885 ^a	.624 ^a	.091 ^a	.037 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: tipe vegetarian

Test Statistics^b

	kategori karbohidrat	kategori lemak total	kategori lemak jenuh	kategori kolesterol	kategori MUFA	kategori PUFA	kategori serat total
Mann-Whitney U	180.500	171.000	142.500	171.000	180.500	171.000	142.000
Wilcoxon W	370.500	361.000	332.500	361.000	370.500	361.000	332.000
Z	.000	-.474	-1.377	-1.000	.000	-1.000	-1.459
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000	.636	.168	.317	1.000	.317	.145
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	1.000 ^a	.795 ^a	.271 ^a	.795 ^a	1.000 ^a	.795 ^a	.271 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: tipe vegetarian

Test Statistics^b

	asupan kolesterol	persen asupan MUFA terhadap total asupan energi	persen asupan PUFA terhadap total asupan energi	asupan serat total	asupan serat larut air	persen asupan lemak jenuh terhadap total asupan energi
Mann-Whitney U	28.500	161.000	112.000	156.000	174.500	136.000
Wilcoxon W	218.500	351.000	302.000	346.000	364.500	326.000
Z	-4.946	-.569	-2.000	-.715	-.175	-1.299
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.569	.046	.474	.861	.194
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.000 ^a	.583 ^a	.046 ^a	.488 ^a	.863 ^a	.201 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: tipe vegetarian

Perbedaan Variabel-Variabel Kontrol antara Kolesterol Total Normal dan Kolesterol Total Tidak Normal

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
usia responden	Equal variances assumed	.011	.918	-2.193	36	.035	-10.340	4.715	-19.902	-.778
	Equal variances not assumed			-2.227	22.305	.036	-10.340	4.643	-19.962	-.718
indeks massa tubuh responden	Equal variances assumed	.338	.565	-.214	36	.832	-.2557	1.1951	-2.6795	2.1681
	Equal variances not assumed			-.223	23.702	.826	-.2557	1.1489	-2.6285	2.1171
persen asupan karbohidrat terhadap total asupan energi	Equal variances assumed	.003	.958	.113	36	.911	.30769	2.71921	-5.20712	5.82250
	Equal variances not assumed			.117	23.410	.908	.30769	2.62683	-5.12105	5.73644

persen asupan lemak total terhadap total asupan energi	Equal variances assumed Equal variances not assumed	.237	.629 -.085	-.090 18.883	36	.929 .933	-.18590 -.18590	2.06264 2.18027	-4.36912 -4.75117	3.99732 4.37937
--	--	------	---------------	-----------------	----	--------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Test Statistics^b

	lama menjadi vegetarian	skor aktivitas fisik	persen asupan lemak jenuh terhadap total asupan energi	asupan kolesterol	persen asupan MUFA terhadap total asupan energi	persen asupan PUFA terhadap total asupan energi	asupan serat total
Mann-Whitney U	118.000	136.500	151.000	138.500	134.000	145.000	153.000
Wilcoxon W	469.000	487.500	229.000	489.500	212.000	496.000	231.000
Z	-1.195	-.612	-.157	-.613	-.691	-.345	-.094
Asymp. Sig. (2-tailed)	.232	.540	.875	.540	.490	.730	.925
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.243 ^a	.545 ^a	.889 ^a	.588 ^a	.505 ^a	.745 ^a	.938 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: kategori kolesterol total modifikasi

Perbedaan Variabel-Variabel Kontrol antara Trigliserida Normal dan Trigliserida Tidak Normal

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Confidence Interval of the Difference	
				t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower		
		F	Sig.								
usia responden	Equal variances assumed	.697	.409	-2.354	36	.024	-16.662	7.078	-31.017	-2.307	
	Equal variances not assumed			-2.836	4.215	.044	-16.662	5.874	-32.647	-.676	
indeks massa tubuh responden	Equal variances assumed	.877	.355	-.605	36	.549	-1.0906	1.8022	-4.7456	2.5644	
	Equal variances not assumed			-.833	4.765	.445	-1.0906	1.3095	-4.5075	2.3263	
persen asupan karbohidrat terhadap total asupan energi	Equal variances assumed	.175	.678	-1.404	36	.169	-5.63235	4.01095	-13.76694	2.50224	
	Equal variances not assumed			-1.248	3.548	.288	-5.63235	4.51401	-18.82014	7.55543	
persen asupan lemak total terhadap total asupan energi	Equal variances assumed	1.194	.282	1.295	36	.203	3.95588	3.05414	-2.23820	10.14996	
	Equal variances not assumed			1.016	3.399	.376	3.95588	3.89206	-7.64758	15.55934	

Test Statistics^b

	lama menjadi vegetarian	aktivitas fisik	% asupan lemak jenuh terhadap total asupan energi	asupan kolesterol	% asupan MUFA terhadap total asupan energi	% asupan PUFA terhadap total asupan energi	asupan serat total
Mann-Whitney U	48.000	38.500	55.000	64.000	39.000	38.000	51.000
Wilcoxon W	643.000	48.500	65.000	659.000	49.000	48.000	646.000
Z	-.953	-1.403	-.618	-.212	-1.379	-1.427	-.809
Asymp. Sig. (2-tailed)	.341	.160	.536	.832	.168	.154	.419
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.368 ^a	.167 ^a	.566 ^a	.873 ^a	.182 ^a	.167 ^a	.447 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: kategori trigliserida modifikasi

Master Data

No	Usia	Tipe_vege	Lama_vege	Aktv_fsk	IMT	KT	TG	Per_KH	Per_L_Tot	Per_L_Jnh	As_Kols	Per_MUFA	Per_PUFA	Serat_Tot
1	26	non vegan	12.0	1332.0	21.4	170.0	74.0	54.00	28.00	13.26	147.70	6.31	7.77	7.90
2	51	non vegan	26.0	4305.0	23.5	256.0	124.0	77.00	13.00	8.32	3.80	1.75	2.56	24.20
3	34	non vegan	13.0	3516.0	20.0	198.0	31.0	62.00	20.00	7.64	3.80	4.26	7.75	22.10
4	23	non vegan	8.0	702.0	19.0	140.0	41.0	75.00	15.00	9.05	5.10	2.54	3.17	11.20
5	42	non vegan	19.0	1349.1	22.7	131.0	46.0	75.00	14.00	9.06	0.00	1.90	2.93	17.50
6	23	non vegan	2.5	3960.0	22.4	260.0	48.0	58.00	33.00	20.55	210.20	6.13	4.71	19.40
7	62	non vegan	14.0	870.0	27.0	214.0	171.0	71.00	20.00	13.19	36.80	3.60	2.82	16.60
8	53	non vegan	14.0	540.0	23.1	216.0	167.0	78.00	11.00	6.24	2.50	1.93	2.23	15.00
9	35	non vegan	17.0	1581.0	23.6	131.0	47.0	71.00	17.00	9.41	10.20	3.58	4.07	24.80
10	56	non vegan	13.0	2730.0	23.7	214.0	78.0	67.00	18.00	8.55	1.30	3.27	6.12	20.00
11	21	non vegan	8.0	2542.5	23.2	133.0	42.0	69.00	22.00	11.08	27.90	7.50	3.13	7.70
12	31	non vegan	13.0	4708.5	28.8	179.0	108.0	70.00	19.00	7.32	33.50	5.13	5.69	35.70
13	57	non vegan	15.0	1926.0	24.3	182.0	134.0	71.00	16.00	4.59	10.20	5.56	5.69	21.90
14	40	non vegan	18.0	1314.0	28.2	161.0	104.0	77.00	13.00	8.34	3.80	1.76	2.49	24.10
15	37	non vegan	11.0	1314.0	24.4	171.0	117.0	77.00	15.00	9.72	16.50	2.28	2.34	11.80
16	37	non vegan	20.0	2981.0	21.4	209.0	47.0	61.00	23.00	7.67	56.30	7.02	7.87	28.30
32	56	non vegan	35.0	346.5	29.7	211.0	133.0	69.00	15.00	3.84	0.00	3.17	7.52	40.00
33	61	non vegan	56.0	420.0	21.6	242.0	87.0	82.00	9.00	4.73	0.00	1.55	2.53	8.80
37	42	non vegan	19.0	1872.0	32.1	146.0	38.0	71.00	18.00	10.33	3.80	2.95	4.43	15.90
17	20	vegan	4.0	1496.0	18.3	147.0	42.0	69.00	19.00	9.04	0.00	3.83	5.67	22.70
18	41	vegan	4.0	1470.0	21.5	248.0	172.0	64.00	22.00	8.18	0.00	3.92	8.62	31.00
19	20	vegan	5.0	2776.5	18.9	115.4	102.6	65.00	20.00	7.04	0.00	4.19	8.02	29.20
20	20	vegan	6.0	441.0	17.0	195.0	72.0	69.00	21.00	11.09	0.00	4.23	5.04	7.10
21	40	vegan	3.0	115.5	24.1	197.0	118.0	84.00	8.00	4.28	0.00	1.33	2.03	15.50
22	55	vegan	3.0	720.0	22.6	147.5	48.5	59.00	29.00	16.74	0.00	5.37	6.11	10.00
23	28	vegan	1.3	3434.0	23.6	156.0	66.0	68.00	20.00	6.50	0.00	6.12	6.53	73.20
24	37	vegan	10.0	2610.0	17.5	207.0	97.0	63.00	19.00	7.11	0.00	3.66	8.19	11.60
25	31	vegan	0.1	2970.0	19.9	217.0	87.0	66.00	23.00	11.18	0.00	4.44	6.66	17.90

26	57	vegan	2.0	115.5	20.3	165.9	68.5	61.00	27.00	10.17	0.00	10.98	5.97	33.50
27	34	vegan	0.1	17.0	18.9	118.0	46.0	65.00	21.00	9.96	0.00	3.53	6.79	20.30
28	27	vegan	10.0	10.0	25.9	179.0	69.0	75.00	13.00	5.64	0.00	2.29	3.82	10.80
29	44	vegan	4.0	5.0	20.5	140.0	70.0	68.00	19.00	7.31	0.00	5.12	6.71	19.60
30	24	vegan	2.5	13.5	20.6	156.0	72.0	51.00	25.00	3.96	0.00	6.27	13.67	34.40
31	47	vegan	3.0	4.0	20.7	162.0	53.0	78.00	11.00	1.96	0.00	2.90	3.69	14.80
34	65	vegan	15.0	15.0	23.6	174.0	189.0	84.00	6.00	3.34	0.00	0.70	1.56	43.70
35	63	vegan	2.0	42.0	26.4	169.0	71.0	70.00	17.00	9.19	0.00	2.81	4.85	29.90
36	61	vegan	0.5	15.0	24.6	222.0	115.0	72.00	15.00	6.40	0.00	2.61	5.61	16.10
38	32	vegan	4.0	15.0	22.2	106.0	50.0	64.00	21.00	6.63	0.00	4.58	8.99	21.60

ANCOVA

1. ANCOVA Kolesterol Total

Descriptive Statistics

Dependent Variable:kadar kolesterol total responden

tipe vegetarian	Mean	Std. Deviation	N
vegan	169.568	38.0085	19
non vegan	187.579	41.4840	19
Total	178.574	40.2901	38

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:kadar kolesterol total responden

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	27117.198 ^a	13	2085.938	1.520	.181
Intercept	1309.709	1	1309.709	.954	.338
usia_res	11356.575	1	11356.575	8.273	.008
lama_vege	1849.366	1	1849.366	1.347	.257
skor_aktv_fisik	604.219	1	604.219	.440	.513
IMT_res	1309.093	1	1309.093	.954	.339
per_KH	2142.487	1	2142.487	1.561	.224
per_Lmk_tot	361.722	1	361.722	.264	.612
per_Lmk_jenuh	37.696	1	37.696	.027	.870
as_kols	5177.388	1	5177.388	3.772	.064
per_MUFA	321.981	1	321.981	.235	.633
per_PUFA	282.773	1	282.773	.206	.654
as_serat_tot	9.707	1	9.707	.007	.934
tipe_vege	5.730	1	5.730	.004	.949
Error	32944.715	24	1372.696		
Total	1271827.220	38			
Corrected Total	60061.914	37			

a. R Squared = ,451 (Adjusted R Squared = ,154)

2. ANCOVA Trigliserida

Descriptive Statistics

Dependent Variable:kadar trigliserida responden

tipe vegetarian	Mean	Std. Deviation	N
vegan	84.663	40.4345	19
non vegan	86.158	45.3973	19
Total	85.411	42.4095	38

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:kadar trigliserida responden

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	35644.281 ^a	13	2741.868	2.129	.053
Intercept	2142.421	1	2142.421	1.664	.209
usia_res	13863.257	1	13863.257	10.767	.003
lama_vege	116.889	1	116.889	.091	.766
IMT_res	164.524	1	164.524	.128	.724
per_KH	2723.836	1	2723.836	2.115	.159
per_Lmk_tot	298.909	1	298.909	.232	.634
per_Lmk_jenuh	126.314	1	126.314	.098	.757
as_kols	2988.390	1	2988.390	2.321	.141
per_MUFA	319.593	1	319.593	.248	.623
per_PUFA	360.212	1	360.212	.280	.602
as_serat_tot	1932.841	1	1932.841	1.501	.232
tipe_vege	675.698	1	675.698	.525	.476
Error	30902.574	24	1287.607		
Total	343755.260	38			
Corrected Total	66546.856	37			

a. R Squared = ,536 (Adjusted R Squared = ,284)