

**DENSITAS ENERGI MAKANAN DAN HEREDITAS
SEBAGAI FAKTOR RISIKO HIPERTENSI OBESITIK
PADA REMAJA AWAL**

Artikel Penelitian

disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi pada Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran

Universitas Diponegoro



disusun oleh
RIZKA DYAH AYU AVIHANI
G2C008063

**PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel penelitian dengan judul “Densitas Energi Makanan dan Hereditas sebagai Faktor Risiko Hipertensi Obesitik pada Remaja Awal” telah dipertahankan di hadapan penguji dan telah direvisi.

Mahasiswa yang mengajukan :

Nama : Rizka Dyah Ayu Avihani
NIM : G2C008063
Fakultas : Kedokteran
Program Studi : Ilmu Gizi
Universitas : Diponegoro Semarang
Judul Proposal : Densitas Energi Makanan dan Hereditas sebagai Faktor Risiko Hipertensi Obesitik pada Remaja Awal

Semarang, Desember 2012

Pembimbing,

Prof. dr. H. M. Sulchan, M.Sc, DA. Nutr, SpGK

NIP. 1949062019703001

DENSITAS ENERGI MAKANAN DAN HEREDITAS SEBAGAI FAKTOR RISIKO HIPERTENSI OBESITIK PADA REMAJA AWAL

Rizka Dyah Ayu Avihani* Muhammad Sulchan**

ABSTRAK

Latar belakang: Prevalensi hipertensi obesitik terus meningkat dengan cepat khususnya pada remaja. Densitas energi makanan dan hereditas merupakan beberapa faktor risiko hipertensi obesitik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya risiko faktor densitas energi makanan dan hereditas terhadap kejadian hipertensi obesitik pada remaja awal.

Metode: Penelitian dilakukan di SMP Negeri 3, SMP Negeri 30, SMP Kesatrian 2, dan Madrasah Al-Khoiriyah. Desain penelitian *case-control* dengan jumlah subyek 72 yang terdiri dari 36 kasus dan 36 kontrol. Subyek yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria inklusi. Data densitas energi makanan didapatkan dengan wawancara menggunakan *food frequency questionnaire* 1 bulan terakhir. Data hereditas diperoleh dari pengukuran orang tua kandung secara langsung. Pengukuran tinggi badan menggunakan *microtoise*, berat badan menggunakan timbangan digital, dan tekanan darah menggunakan *sphygmomanometer*.

Hasil: Prevalensi hipertensi obesitas sebesar 7,5%. Ditemukan hubungan yang bermakna antara densitas energi ($OR=5,8; CI=2,013-16,715; p=0,001$) dan hereditas ($OR=4,0; CI=1,518-11,000; p=0,004$) dengan kejadian hipertensi obesitik pada remaja awal.

Simpulan: Densitas energi makanan dan hereditas merupakan faktor risiko yang bermakna terhadap kejadian hipertensi obesitik pada remaja awal, dengan besar risiko 5,8 kali dan 4,0 kali.

Kata kunci: remaja awal, hipertensi obesitik, densitas energi makanan, hereditas

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro

** Dosen Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro

**DIETARY ENERGY DENSITY AND HEREDITY
ARE RISK FACTORS FOR OBESITY HYPERTENSION ON EARLY ADOLESCENCE**

Rizka Dyah Ayu Avihani* Muhammad Sulchan**

ABSTRACT

Background: Prevalence of obesity hypertension continues to rise rapidly, especially in adolescence. Dietary energy density and heredity are some of the risk factors of obesity hypertension. The purpose of this study was to determine magnitude of risk factors of dietary energy density and heredity on obesity hypertension occurrence on early adolescence.

Method: The study was carried out in SMP 3, SMP 30, SMP Kesatrian 2, and Madrasah Al-Khoiriyyah. The design of this study is case-control with the amount of subjects are 72 consist of 36 cases and 36 controls. The subjects were selected that met the inclusion criteria. Data dietary energy density is obtained by interview using *food frequency questionnaire* last one month. Data on heredity is obtained from measuring of biological parents directly. Height measurements using microtoise, weight using digital scales, and blood pressure using a sphygmomanometer.

Results: The prevalence of obesity hypertension is 7.5%. Found that there is a significant correlation between dietary energy density ($OR=5.8; CI=2.013-16.715; p=0.001$) and heredity ($OR=4.0; CI=1.518-11.000; p=0.004$) with obesity hypertension occurrence on early adolescence.

Conclusion: Dietary energy density and heredity are significant risk factor of obesity hypertension on early adolescence, that risk factors are respectively 5.8 times and 4.0 times

Key words: early adolescents, obesity hypertension, dietary energy density, heredity

* Student of Nutrition Science Study Program of Medical Faculty, Diponegoro University

** Lecture of Nutrition Science Study Program of Medical Faculty, Diponegoro University

PENDAHULUAN

Hipertensi obesitik adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan darah sebagai manifestasi dari akumulasi lemak yang berlebihan pada subkutan dan jaringan lain (obesitas). Hipertensi obesitik bukanlah suatu kesatuan penyakit tersendiri tetapi merupakan suatu kombinasi gejala kompleks dari berbagai sindrom metabolisme berkorelasi dengan kenaikan angka mortalitas, penyakit kardiovaskuler dan diabetes.^{1,2}

Prevalensi hipertensi dan obesitas terus meningkat dengan cepat khususnya diantara remaja. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007 prevalensi hipertensi pada remaja sebesar 8,4%, sedangkan prevalensi obesitas yaitu 19,1%.¹⁰

Hubungan antara obesitas dan hipertensi pada anak dan remaja telah dilaporkan dimana tekanan darah anak obes lebih tinggi daripada non obes. Penelitian pada anak sekolah di India melaporkan bahwa anak obesitas berisiko tiga kali lebih tinggi mengalami hipertensi dibandingkan anak yang non-obesitas.⁵ Mekanisme hipertensi obesitik telah difokuskan pada tiga mekanisme utama yaitu gangguan pada fungsi sistem saraf otonom, resistensi insulin dan kelainan dalam struktur dan fungsi pembuluh darah.^{6,7}

Faktor risiko terjadinya hipertensi obesitik pada remaja adalah interaksi antara faktor keturunan (hereditas) dan faktor lingkungan yang salah satunya adalah asupan makanan dengan densitas energi tinggi. Pengaruh faktor hereditas memainkan peranan dalam perkembangan obesitas. Bila kedua orang tua obesitas, 80% anaknya menjadi obesitas, bila salah satu orang tua obesitas, prevalensi menjadi 40% dan bila kedua orang tua tidak obesitas, prevalensi menjadi 14%.⁴

Peningkatan prevalensi obesitas berkaitan dengan peningkatan konsumsi makanan padat energi.^{8,9} Makanan padat energi adalah makanan dengan densitas energi yang tinggi, biasanya tinggi kandungan karbohidrat simpleks, ditambahkan gula dan lemak⁹, sehingga cenderung lezat, murah, dan banyak disukai. Berdasarkan RISKESDAS tahun 2007 di Indonesia, prevalensi makanan berisiko yang paling banyak dikonsumsi oleh anak usia 12-15 tahun adalah penyedap

(75,7%); manis(63,1%); dan berlemak(13,5%).¹⁰ Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan remaja untuk mengkonsumsi makanan padat energi.

Hipertensi obesitik pada usia remaja berisiko tinggi menjadi hipertensi obesitik dimasa dewasa dan berpotensi menderita sindrom metabolik dan penyakit degeneratif dikemudian hari.^{11,12} Berdasarkan uraian diatas, densitas energi dan hereditas merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi obesitik pada remaja awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis densitas energi makanan dan hereditas sebagai faktor risiko kejadian hipertensi obesitik pada remaja awal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup keilmuan gizi masyarakat menggunakan desain *case control*. Pengambilan data meliputi 2 tahap, yaitu pengambilan data awal dan pengambilan data lanjut.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua remaja awal usia 12-14 tahun di kota Semarang. Pemilihan sampel ditentukan dengan teknik *cluster sampling*, sehingga terpilih 5 SMP dari 212 SMP di kota Semarang. Selanjutnya dilakukan *proportional random sampling* dimana dilakukan pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi sehingga terpilih SMP N 3, SMP N 30, SMP Kesatrian 2, SMP 10 Nopember 2, dan Madrasah Al-Khoiriyyah. Pengambilan data lanjut dilakukan di 4 SMP dimana SMPN 10 Nopember 2 dieksklusi karena prevalensi hipertensi obesitik di SMP tersebut sangat rendah (0,027%). Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus kasus kontrol berpasangan dan didapatkan besar sampel minimal 38 kasus dan 38 kontrol, namun subyek yang memenuhi kriteria inklusi yang diteliti hanya 36 subyek. Kasus adalah siswa-siswi yang tergolong hipertensi obesitik sedangkan kontrol adalah siswa-siswi yang lain (teman kasus) yang tidak mengalami hipertensi obesitik. Setiap kasus dicari satu kontrol pasangannya yang disetarakan menurut jenis kelamin dan usia. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi siswa-siswi berusia 12-14 tahun, tidak sedang melakukan puasa atau diet yang ketat, tidak dalam keadaan sakit, dan kooperatif.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hipertensi obesitik, sedangkan variabel bebas adalah densitas energi makanan dan hereditas. Pengukuran

antropometri subyek dilakukan untuk menentukan status gizi berdasarkan *BMI-for age percentile*. Sedangkan pengukuran tekanan darah subyek dilakukan untuk menentukan status tekanan darah berdasarkan tekanan darah sistolik (TDS) atau tekanan darah diastolik (TDD) persentil menurut usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Kategori status gizi normal jika 5 sampai <95 persentil, obesitas jika ≥95 persentil. Sedangkan kategori tekanan darah normal jika TDS dan TDD ≤90 persentil, hipertensi jika TDS dan/atau TDD ≥95 persentil. Hipertensi obesitik adalah keadaan dimana hasil skrining menunjukkan IMT ≥ persentil 95 disertai nilai tekanan darah sistolik dan/atau tekanan darah diastolik ≥ persentil 95.^{13,14}

Densitas energi makanan adalah jumlah energi dalam berat tertentu dari makanan yang dihitung dengan cara membagi asupan energi total per hari (dalam kkal) dengan berat makanan total yang dikonsumsi (dalam gram).¹⁵ Data densitas energi makanan diklasifikasikan berdasarkan *cutoffs* tertile menurut jenis kelamin berdasarkan penelitian Jason, dkk. Asupan makanan untuk perempuan dinyatakan memiliki densitas energi normal apabila makanan yang dikonsumsi dalam sehari memiliki densitas energi 1,45–1,98 kkal/g, dan dinyatakan tinggi apabila densitas >1,99 kkal/g. Klasifikasi untuk laki-laki asupan makanan dinyatakan memiliki densitas energi normal apabila densitas energi 1,53–2,08 kkal/g, dan dinyatakan tinggi apabila densitas >2,09 kkal/g.^{8,15} Faktor hereditas didefinisikan sebagai faktor keturunan kejadian hipertensi obesitik, yang datanya diperoleh dengan mengukur antropometri dan tekanan darah orang tua kandung subyek. Subyek dikategorikan memiliki hereditas hipertensi obesitas apabila salah satu atau kedua orang tua kandung subyek menderita hipertensi obesitas, sedangkan subyek yang dikategorikan tidak memiliki hereditas hipertensi obesitas adalah subyek yang kedua orang tuanya tidak menderita hipertensi obesitas. Status gizi orang tua subyek dikategorikan berdasarkan *WHO Consultation on Obesity*, obesitas dinyatakan apabila IMT≥25.¹¹ Status tekanan darah dikategorikan berdasarkan grafik *British Heart Foundation*.¹⁶

Pengolahan dan analisis data menggunakan program komputer. Analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel yang diteliti. Analisis bivariat menggunakan *Chi Square*, kemudian dihitung nilai Odds Ratio (OR).

HASIL PENELITIAN

Karakteristik subyek penelitian

Hasil skrining awal melibatkan 1186 subyek yang berasal dari 5 SMP di Semarang menunjukkan 355(30,03%) subyek termasuk hipertensi, 155(13,11%) subyek adalah obesitas, dan 89(7,5%) subyek termasuk dalam hipertensi obesitik. Penelitian ini melibatkan 72 remaja SMP yang terdiri dari 36 kasus dan 36 kontrol. Karakteristik subyek penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik subyek penelitian

Karakteristik	Kasus		Kontrol		Total
	N	%	N	%	
Jenis Kelamin					
Laki-laki	22	61,1%	22	61,1%	44
Perempuan	14	38,9%	14	38,9%	28
Total	36	100%	36	100%	72
Usia					
12 tahun	4	11,1%	4	11,1%	8
13 tahun	17	47,2%	17	47,2%	34
14 tahun	15	41,7%	15	41,7%	30
Total	36	100%	36	100%	72

Tabel 1 menunjukkan subyek berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 anak (61,1%) dan perempuan 28 anak (38,9%). Subyek yang berusia 12 tahun sebanyak 8 anak (11,1%), 13 tahun sebanyak 34 anak (47,2%) dan 14 tahun sebanyak 30 anak (41,7%). Tabel 2 menunjukkan nilai median tekanan darah sistolik pada kasus sebesar 130mmHg dengan nilai terendah 110mmHg dan tertinggi 170mmHg, tekanan darah diastolik sebesar 80mmHg dengan nilai terendah 60mmHg dan tertinggi 100mmHg serta IMT/U 98,45 persentil. Sedangkan nilai median tekanan darah sistolik pada kontrol sebesar 100mmHg dengan nilai terendah 80mmHg dan tertinggi 120mmHg, tekanan darah diastolik sebesar 60mmHg dengan nilai terendah 50mmHg dan tertinggi 70mmHg serta IMT/U 36,45 pers

entil. Tabel 3 menunjukkan nilai median tekanan darah sistolik pada ayah kasus sebesar 131mmHg, tekanan darah diastolik sebesar 87mmHg serta IMT 25,50 kg/m². Nilai median tekanan darah sistolik pada ibu kasus sebesar 130mmHg, tekanan darah diastolik sebesar 81mmHg serta IMT 26,82 kg/m².

Tabel 2. Nilai median, minimum, maksimum IMT/U (persentil), dan tekanan darah subyek

Variabel	Kasus			Kontrol		
	Median	Min	Max	Median	Min	Max
IMT/U	98,45	95,20	100,00	36,45	6,00	83,00
Tekanan Darah						
TDS (mmHg)	130	110	170	100	80	120
TDD (mmHg)	80	60	100	60	50	70

Tabel 3. Nilai median, minimum, maksimum tekanan darah, dan IMT orang tua kandung subyek

Variabel	Kasus			Kontrol		
	Median	Min	Max	Median	Min	Max
IMT						
Ayah	25,50	20,50	39,62	23,60	18,41	35,96
Ibu	26,82	20,80	34,10	26,46	16,80	30,80
TDS (mmHg)						
Ayah	131	110	229	130	110	220
Ibu	130	96	200	130	100	184
TDD (mmHg)						
Ayah	87	70	129	80	70	120
Ibu	81	64	110	81	69	109

Densitas energi makanan sebagai faktor risiko hipertensi obesitik

Rerata densitas energi makanan kelompok kasus adalah $2,12 \pm 0,30$ sedangkan kelompok kontrol adalah $1,90 \pm 0,25$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa kelompok kasus cenderung memiliki asupan makanan dengan densitas energi yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Subyek dengan asupan makanan berdensitas energi tinggi sebanyak 28 anak (38,9%) sedangkan subyek dengan asupan makanan berdensitas energi normal sebanyak 44 anak (61,1%). Sebanyak 21 subyek (75%) dengan asupan makanan berdensitas energi tinggi mengalami hipertensi obesitik. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa densitas energi makanan ($p=0,001$; OR=5,8) merupakan faktor risiko kejadian hipertensi obesitik pada remaja awal. Hal ini berarti remaja yang memiliki asupan makanan dengan densitas energi yang tinggi berisiko 5,8 kali lebih besar menjadi hipertensi obesitik.

Tabel 4. Hubungan densitas energi makanan dengan hipertensi obesitik

	Kasus		kontrol		p	OR	95%CI
	N	%	N	%			
Densitas energi							
Tinggi	21	58,3	7	19,4	0,001	5,800	2,013 – 16,715
Normal	15	41,7	29	80,6			

Hereditas sebagai faktor risiko hipertensi obesitik

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar subyek kasus memiliki hereditas hipertensi obesitik dari ayah dan atau ibu kandung sebanyak 26 anak (72,2%) dan sebagian besar subyek kontrol tidak memiliki hereditas hipertensi obesitik yaitu sebanyak 22 anak (61,1%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa hereditas merupakan faktor risiko kejadian hipertensi obesitik dengan $p<0,05$ dan OR 4,0. Hal ini menunjukkan bahwa remaja yang memiliki hereditas hipertensi obesitik dari orang tua kandungnya berisiko 4 kali lebih besar menjadi hipertensi obesitik.

Tabel 5. Hubungan hereditas dengan hipertensi obesitik

Hereditas	Kasus		Kontrol		p	OR	95%CI
	N	%	N	%			
Ada	26	72,2	14	38,9	0,004*	4,086	1,518 – 11,000
Tidak ada	10	27,8	22	61,1			

PEMBAHASAN

Penelitian pendahuluan terhadap 1186 subyek diketahui prevalensi kejadian hipertensi obesitik pada remaja awal usia 12–14 tahun sebesar 7,5%. Prevalensi hipertensi pada anak obesitik ini lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di SMP swasta di Semarang pada tahun 2006, yang menjumpai prevalensi obesitas dengan hipertensi pada anak usia 12–14 tahun sebesar 6,3%.¹⁸ Meningkatnya kejadian hipertensi obesitik menunjukkan bahwa hipertensi obesitik merupakan masalah yang sedang berkembang pada usia pubertas. Remaja dengan hipertensi obesitik dapat meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik, dan komplikasi penyakit yang ditimbulkan oleh sindrom metabolik, seperti diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner (PJK), stroke, gagal jantung, sindrom ovarium polikistik (PCOS), dan perlemakan hati (*fatty liver*) non-alkoholik yang salah satunya adalah *non alcoholic steato hepatitis* (NASH).¹⁹

Densitas energi makanan sebagai faktor risiko hipertensi obesitik

Remaja terutama di kota besar mengalami pergeseran pola makan dari pola makan tradisional ke pola makan barat. Pemilihan makanan pada remaja

tidak lagi didasarkan pada kandungan gizi, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh sosialisasi antar teman sebaya. Umumnya remaja cenderung mengkonsumsi makanan dengan densitas energi yang tinggi yang biasanya tinggi kandungan karbohidrat simpleks, ditambahkan gula dan lemak.⁹

Meskipun beberapa makanan padat energi sehat, namun ternyata lebih banyak makanan padat energi tidak sehat yang justru banyak dipilih dan dikonsumsi kalangan remaja. Makanan padat energi yang sehat contohnya adalah kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, telur, kentang, susu, dan minyak zaitun.²⁰ Makanan padat energi yang tidak sehat disebut makanan padat energi rendah gizi (*Energy-dense, nutrient-poor foods (EDNP)*). EDNP dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu: *visible fat* (margarin, mentega, minyak, krim, saus dressing, gajih, steak, sosis, dan makanan yang digoreng); *sweeteners* (gula, sirup, permen, minuman manis); *dessert* (biskuit, kue, pie, pastry, donat, es krim, milkshake, puding, kue keju); snack asin (keripik kentang, keripik jagung, tortilla); dan lain-lain (kopi, teh, kaldu, saus tomat, saus sambal).²¹

Konsumsi makanan dengan densitas energi yang rendah mampu menurunkan asupan energi total.⁸ Sedangkan konsumsi makanan dengan densitas energi yang tinggi secara berlebihan berkontribusi dalam peningkatan asupan energi total dan turut menyebabkan keseimbangan energi yang positif.^{22,23} Penelitian di Amerika pada subyek dengan asupan makanan berdensitas energi rendah memiliki asupan energi total yang lebih rendah (275–425 kkal/hari lebih rendah) dibandingan subyek dengan asupan makanan berdensitas energi tinggi, meskipun mereka mengkonsumsi makanan lebih banyak (300–400 gram/hari lebih banyak).⁸ Kebiasaan senang makan makanan dengan densitas energi yang tinggi memungkinkan tubuh memperoleh tambahan energi sehingga tanpa disadari asupan energi ke dalam tubuh melebihi kebutuhan dan dampaknya berupa bertambahnya timbunan lemak dalam tubuh. Kebiasaan seperti itu akan memudahkan terjadinya obesitas. Banyaknya lemak dalam tubuh menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Selain itu obesitas juga terkait dengan level insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat.

Makanan atau minuman manis mengandung unsur karbohidrat sederhana yang menghasilkan energi tinggi. Fruktosa (gula sederhana yang menghasilkan rasa manis), tidak memberikan efek kepuasan setelah makan. Seseorang yang mengkonsumsi makanan/minuman manis tidak akan merasa puas dan akan makan terus menerus. Konsumsi yang berlebihan akan meningkatkan asupan energi yang selanjutnya disimpan tubuh sebagai cadangan lemak. Penumpukan lemak tubuh pada perut akan menyebabkan obesitas sentral, sedangkan penumpukan pada pembuluh darah akan menyumbat peredaran darah dan membentuk plak (aterosklerosis) yang berdampak pada hipertensi dan jantung koroner. Konsumsi jenis pangan yang digoreng (*deep frying*) berpengaruh meningkatnya asupan energi dari lipid. Makanan yang digoreng memiliki rasa yang gurih, renyah, enak dan kaya lemak. Hal ini menyebabkan seseorang ingin makan terus menerus, sehingga memiliki asupan energi yang tinggi dan tingkat kepuasan yang rendah. Rendahnya tingkat kepuasan dapat berpengaruh terhadap kemampuan respon insulin dan leptin, hormon yang menstimulasi rasa lapar-kenyang.^{24,25}

Hasil *Food Frequency Questionare* (FFQ) dalam penelitian ini menunjukkan baik kasus dan kontrol lebih menyukai makanan dengan densitas energi yang tinggi seperti mi instan (densitas=3,7 kkal/g), *fried chicken* (densitas=3,3 kkal/g), bakso (densitas=3,7 kkal/g), roti manis (densitas=2,8 kkal/g), dan gorengan (densitas=2,0 – 3,4 kkal/g). Asupan makanan dikatakan berdensitas tinggi (padat energi) jika rata-rata densitas energi >2,09 kkal/g untuk laki-laki dan >1,99 kkal/g untuk perempuan.^{8,15} Penelitian ini ditemukan adanya hubungan antara densitas energi makanan dengan kejadian hipertensi obesitik ($p=0,001$) dimana remaja yang asupan makanannya berdensitas energi tinggi berisiko 5,8 kali lebih besar untuk mengalami hipertensi obesitik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian di Amerika Serikat yang menemukan bahwa konsumsi makanan padat energi berhubungan dengan obesitas dan gangguan terkait sindrom metabolik.^{8,15}

Hereditas sebagai faktor risiko hipertensi obesitik

Adanya faktor hereditas atau riwayat obesitas dan hipertensi pada keluarga tertentu menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi obesitik. Kasus hipertensi esensial 70%-80% diturunkan dari orang tuanya. Jika salah satu dari orang tua memiliki riwayat hipertensi maka memiliki kemungkinan 25% terkena hipertensi.⁶ Bila kedua orang tua obesitas, 80% anaknya menjadi obesitas, bila salah satu orang tua obesitas, kejadian obesitas menjadi 40% dan bila kedua orang tua tidak obesitas, prevalensi menjadi 14%.⁴

Hipertensi merupakan salah satu gangguan genetik yang bersifat kompleks. Ekspresi dari hipertensi pada seseorang merupakan hasil dari perubahan-perubahan pada genetik. Faktor keturunan berpengaruh terhadap hipertensi primer melalui beberapa gen yang terlibat dalam regulasi vaskular dan reabsorpsi natrium oleh ginjal. Efek poligenik misalnya, dihasilkan dari peningkatan fungsi mutasi dan polimorfisme pada penerjemahan komponen gen atau pengaturan molekul-molekul pada sistem renin-angiotensin dan transpor natrium ginjal.^{26,27}

Parental fatness merupakan faktor genetik yang berperan besar terhadap kejadian obesitas. Kadar serum leptin pada orang obes tinggi sehingga menimbulkan hipotesis bahwa insensitivitas terhadap leptin mengakibatkan perkembangan progresif obesitas pada orang yang overweight. Mutasi dan polimorfisme gen dan neuropeptida lain dan regulasi neurohormonal selera makan dan kontrol berat badan telah ditemukan pada obesitas, bahwa mutasi proopiomelanocorticotropin (POMC) gen dan polimorfisme reseptor adrenegik β , MC4R berhubungan dengan obesitas berat dan morbiditas.²⁸ Penelitian lain tentang mekanisme kerentanan genetik terhadap obesitas adalah melalui efek pada *resting metabolic rate* (RMR), proses pembakaran dalam tubuh diluar kegiatan olahraga (*thermogenesis non exercise*), kecepatan oksidasi lipid dan kontrol nafsu makan yang jelek. Dengan demikian kerentanan terhadap obesitas ditentukan secara genetik sedang lingkungan menentukan ekspresi fenotip.²⁹

Penelitian ini ditemukan hubungan yang bermakna antara faktor hereditas dengan kejadian hipertensi obesitik ($p=0,004$) dimana anak dengan orang tua yang

menderita hipertensi obesitik memiliki risiko 4 kali untuk mengalami hipertensi obesitik. Hal ini sesuai dengan penelitian di Amerika menunjukkan bahwa obesitas pada usia 10-14 tahun dengan salah satu orang tuanya obesitas, 79% akan menjadi obesitas dewasa.³⁰ Penelitian pada remaja di India didapatkan bahwa 37,5% kejadian hipertensi berhubungan dengan adanya riwayat hipertensi dari orang tua.³¹

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini tidak tertutup kemungkinan banyaknya terdapat bias, baik bias dari subyek penelitian, maupun instrumen penelitian. Bias pada penggunaan FFQ untuk asupan dimana belum dapat menggambarkan pola asupan responden pada masa lampau. Selain itu jumlah sampel minimal yang tidak dapat dipenuhi.

SIMPULAN

1. Prevalensi hipertensi obesitik pada remaja awal sebesar 7,5%.
2. Subyek yang memiliki asupan makanan dengan densitas energi tinggi berisiko 5,8 kali lebih besar mengalami hipertensi obesitik.
3. Subyek yang memiliki hereditas hipertensi obesitik berisiko 4 kali lebih besar mengalami hipertensi obesitik.

SARAN

Untuk mencegah terjadinya hipertensi obesitik pada remaja dapat dilakukan sejak usia dini salah satunya dengan mengatur asupan makanan yaitu dengan membatasi konsumsi makanan berdensitas energi tinggi. Selain itu, perlu dilakukan monitoring tekanan darah dan status gizi secara berkala melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapan kepada Allah SWT yang atas berkat dan rahmatNya sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah, Staf Pengajar dan adik-adik murid SMP N 3,

SMP N 30, SMP Ksatrian, SMP Sepuluh Nopember 2, dan MTs. Al Khairiyah Semarang beserta orang tua atas kerja sama yang baik selama penelitian, dan kepada orang tua, keluarga, sahabat-sahabatku serta semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungannya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Editorial. Insulin Resistance Syndrome in Children and Adolescents: Clinical Meaning and Indication for Action. International Journal of Obesity. 2004; 28:829-832
2. Behrman, Kliegman, Arvin. Ilmu Kesehatan Anak Vol. 1 Edisi 15. Editor edisi bahasa Indonesia: Samik Wahab, et al. Jakarta: EGC; 1999
3. Rena I. Kosti, Demosthenes B. Panagiotakos. The Epidemic Of Obesity In Children And Adolescents In The World. Cent Eur J Publ Health 2006; 14 (4): 151–159.
4. Syarif, D.R. 2003. “Childhood Obesity: Evaluation and Management”. Surabaya: Naskah Lengkap National Obesity Symposium II: 123-39.
5. Gulati Sanjeev. Childhood Hypertension. Indian Pediatrics 2006;43:326-333
6. Sorof J and Stephen D. Obesity Hypertension in Children: A Problem of Epidemic Proportions. Hypertension 2002; 40:441-447
7. McCance KL, Huether SE. Pathophysiology the biologic basis for disease in adults and children. fifth edition: Elsevier mosby.2006.p.1409-4,1086-4,1173
8. Jason H Ledikwe, et al. Dietary Energy Density is Associated with Energy Intake and Weight Status in US Adults. Am J Clin Nutr 2006; 83:1362-8
9. Kant AK, Graubard BI: Energy density of diets reported by Americans adults: association with food group intake, nutrient intake, and body weight. Int J Obes Relat Metab Disord 29:950-956, 2005
10. Badan Litbang Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Nasional 2007. Jakarta.
11. WHO. Obesity: Preventing and Managing The Global Epidemic, WHO Technical Report Series 2000; 894, Geneva.

12. Heird, W.C. Parental Feeding Behavior and Children's Fat Mass. *Am J Clin Nutr*, 2002; 75: 451-452.
13. Centers of Disease Control and Prevention. About BMI for Children and Teens. 2011. Available from: URL: http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/about_childrens_bmi.html
14. Wardlow GM, Smith AM. Nutrition from Infancy Through Adolescence. Dalam: Wardlow GM, Smith AM. Contemporary Nutrition 7th edition. 2009.p.588-590
15. Jason A. Mendoza, et al. Dietary Energy Density is Associated with Obesity and The Metabolic Syndrome in U.S. Adults. American Diabetes Association 2007; 30: 974-78
16. British Heart Foundation. Blood Pressure Charts. [serial online] 2007. Available from: <http://www.heartstats.org/temp/TabsP9.2spweb07>
17. M Verma, J Chhatwal, SM George. Obesity and Hypertension in Children. Indian Pediatrics. 1994; 31:1065-1068
18. Christianus Wagesetiawan. Hubungan Tingkat Hipertensi dengan Kejadian Mikroalbuminuria pada Anak Obesitas Usia 12-14 Tahun. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Biomedik dan PPDS1; 2007
19. Bethene, Ervin. Prevalence of Metabolic Syndrome Among Adults 20 Years of Age and Over, by Sex, Age, Race, and Ethnicity, and Body Mass Index: United Stated, 2003-2006. 2009. Division of Health and Nutrition Examination Surveys
20. Shereen Jegtvig. What Does Energy-Dense Mean? Medical Review Board 2012. Available from: <http://nutrition.about.com/od/gettingstarted/f/What-Is-Energy-Density.htm>
21. Ashima K Kant. Consumption of energy-dense, nutrient-poor foods by adult Americans: nutritional and health implications. The third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. *The American Journal of Clinical Nutrition* 2000; 72:929-36

22. Jacob C Seidell, Tommy LS Visscher. Aspek Kesehatan Masyarakat pada Gizi Lebih. Dalam Buku : Gizi Kesehatan Masyarakat. Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2005.p.203-15
23. Ashima K. Reported Consumption of Low-Nutrient-Density Foods by American Children and Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med/Vol 157; 2003
24. Johnson et al. 2007. Potential role of sugar (fructose) in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 86:899 –906.
25. Farida Nur Aisyiyah. Faktor Risiko Hipertensi pada Empat Kabupaten /Kota dengan Prevalensi Hipertensi Tertinggi di Jawa dan Sumatera. Skripsi. 2009. Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
26. Adrogue, H.J., and Madias, N.E. Sodium and Potassium in the Pathogenesis of Hypertension. The New England Journal of Medicine. 2007; 356: p1966-78. Available from: <http://content.nejm.org/cgi/reprint/356/19/1966.pdf>
27. Lam TC, Cheung BMY, Chung SSM. Genetic factors of hypertension. Med Progress 2001; 10:11-6.
28. Kiess W, Reich A, Muller G, Meyer K, Galler A, Bennek J, et al. Clinical aspects of obesity in childhood and adolescence-diagnosis, treatment, and prevention. International Journal of Obesity. 2001; 25(1): 575-79
29. Kopelman,G.D. Obesity as a Medical Problem, NATURE, 2000; 404: 635-43.
30. Whitaker, R.C.,et al. Predicting Obesity in Young Adulthood from Childhood and Parental Obesity, N Engl J Med, 1997; 337: 869 -73
31. Soudarssanane MB, Karthigeyan M, Stephen S, Sahai A. Key predictors of high blood pressure and hypertension among adolescents: a simple prescription for prevention. Indian Journal of Community Medicine 2006;31(3):164-169

Lampiran 1

ANALISIS UNIVARIAT

Kategori Hipertensi Obesitik Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hipertensi Obesitik	36	50.0	50.0	50.0
	Normal	36	50.0	50.0	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

KASUS

Statistics

	Usia Anak	Tekanan Darah		Persentil IMT / Usia	Densitas Energi
		Sistolik Anak	Diastolik Anak		
N	Valid	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0
Mean		13.3056	128.7222	81.2222	98.2528
Median		13.0000	130.0000	80.0000	98.4500
Std. Deviation		.66845	14.61039	8.18400	1.47735
Minimum		12.00	110.00	60.00	95.20
Maximum		14.00	170.00	100.00	100.00
					3.04

Statistics

	IMT Ayah	IMT Ibu	Tekanan Darah		Tekanan Darah Sistolik Ibu	Tekanan Darah Diastolik Ibu
			Sistolik Ayah	Diastolik Ayah		
N	Valid	35	36	35	35	36
	Missing	1	0	1	1	0
Mean		26.2640	26.1236	136.1143	87.9714	128.6944
Median		25.5000	26.8250	131.0000	87.0000	130.0000
Std. Deviation		3.54397	3.37964	22.94594	12.26301	19.07402
Minimum		20.50	20.80	110.00	70.00	96.00
Maximum		39.62	34.10	229.00	129.00	200.00
						110.00

Usia Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	4	11.1	11.1	11.1
	13	17	47.2	47.2	58.3
	14	15	41.7	41.7	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	22	61.1	61.1	61.1
	Perempuan	14	38.9	38.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Hereditas Hipertensi Obesitik dari Ayah dan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	26	72.2	72.2	72.2
	Tidak ada	10	27.8	27.8	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Kategori Densitas Energi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	21	58.3	58.3	58.3
	Normal	15	41.7	41.7	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

KONTROL

Statistics

		Usia Anak	Tekanan Darah Sistolik Anak	Tekanan Darah Diastolik Anak	Percentil IMT / Usia	Densitas Energi
N	Valid	36	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		13.3056	101.9444	63.4722	36.1750	1.9036
Median		13.0000	100.0000	60.0000	36.4500	1.8950
Std. Deviation		.66845	12.20526	5.83333	22.21385	.25227
Minimum		12.00	80.00	50.00	6.00	1.37
Maximum		14.00	120.00	70.00	83.00	2.45

Statistics

		IMT Ayah	IMT Ibu	Tekanan Darah Sistolik Ayah	Tekanan Darah Diastolik Ayah	Tekanan Darah Sistolik Ibu	Tekanan Darah Diastolik Ibu
N	Valid	34	36	34	34	36	36
	Missing	2	0	2	2	0	0
Mean		24.0494	25.1826	134.1471	85.1176	131.5278	84.0000
Median		23.6050	26.4650	130.0000	80.0000	130.0000	81.0000
Std. Deviation		3.11595	4.08812	20.58410	10.74995	18.67846	9.60655
Minimum		18.41	16.80	110.00	70.00	100.00	69.00
Maximum		35.96	30.80	220.00	120.00	184.00	109.00

Usia Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	4	11.1	11.1	11.1
	13	17	47.2	47.2	58.3
	14	15	41.7	41.7	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	22	61.1	61.1	61.1
	Perempuan	14	38.9	38.9	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Hereditas Hipertensi Obesitik dari Ayah dan Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	14	38.9	38.9	38.9
	Tidak ada	22	61.1	61.1	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Kategori Densitas Energi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	7	19.4	19.4	19.4
	Normal	29	80.6	80.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Lampiran 2

ANALISIS BIVARIAT

1. Densitas Energi Makanan sebagai Faktor Risiko Obesitas Hipertensi pada Remaja Awal

Kategori Densitas Energi * Kategori hipertensi Obesitik Crosstabulation

			Kategori Hipertensi Obesitik Anak		Total
			Hipertensi Obesitik	Normal	
Kategori Densitas Energi	Tinggi	Count	21	7	28
		Expected Count	14.0	14.0	28.0
		% of Total	29.2%	9.7%	38.9%
	Normal	Count	15	29	44
		Expected Count	22.0	22.0	44.0
		% of Total	20.8%	40.3%	61.1%
	Total	Count	36	36	72
		Expected Count	36.0	36.0	72.0
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.455 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	9.877	1	.002		
Likelihood Ratio	11.858	1	.001		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	11.295	1	.001		
N of Valid Cases ^b	72				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kategori Asupan Makanan Padat Energi (Tinggi / Normal)	5.800	2.013	16.715
For cohort Kategori Hipertensi Obesitik Anak = Hipertensi Obesitik	2.200	1.384	3.496
For cohort Kategori Hipertensi Obesitik Anak = Normal	.379	.193	.746
N of Valid Cases	72		

2. Hereditas sebagai Faktor Risiko Obesitas Hipertensi pada Remaja Awal

Hereditas Hipertensi Obesitik * Kategori hipertensi Obesitik Crosstabulation

		Kategori Hipertensi Obesitik Anak		Total
		Hipertensi Obesitik	Normal	
Hereditas Hipertensi Obesitik Ada dari Ayah dan Ibu	Count	26	14	40
		20.0	20.0	40.0
		36.1%	19.4%	55.6%
	Tidak ada	10	22	32
		16.0	16.0	32.0
		13.9%	30.6%	44.4%
	Total	36	36	72
		36.0	36.0	72.0
		50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.100 ^a	1	.004		
Continuity Correction ^b	6.806	1	.009		
Likelihood Ratio	8.268	1	.004		
Fisher's Exact Test				.009	.004
Linear-by-Linear Association	7.988	1	.005		
N of Valid Cases ^b	72				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Hereditas Hipertensi Obesitik dari Ayah dan Ibu (Ada / Tidak ada)	4.086	1.518	11.000
For cohort Kategori Hipertensi Obesitik Anak = Hipertensi Obesitik	2.080	1.186	3.649
For cohort Kategori Hipertensi Obesitik Anak = Normal	.509	.314	.825
N of Valid Cases	72		

Master Tabel


No	ID_Nama	Sex	Usia_Ank	Usia_Ayah	Usia_Ibu	TB_Ank	BB_Ank	Perc_TB	Perc_IMT	TB_Ayah	BB_Ayah	IMT_Ayah	TB_Ibu	BB_Ibu	IMT_Ibu	TDS_Ank	TDD_Ank	Perc_TDS	Perc_TDD	TDS_Ayah	TDD_Ayah
1.	DB	L	13.0	52.0	53.0	163.3	85.8	62.0	99.8	168.0	72.0	25.7	151.3	78.1	34.1	120.0	90.0	90.0	99.0	131.0	90.0
2.	AN	P	13.0	41.0	40.0	154.7	64.0	24.8	97.3	169.0	71.0	24.5	157.0	70.0	28.0	120.0	80.0	95.0	95.0	120.0	80.0
3.	GR	L	14.0	50.0	46.0	156.3	74.8	13.4	99.6	165.0	67.0	24.8	155.4	70.6	29.4	120.0	80.0	90.0	95.0	130.0	80.0
4.	MD	L	13.0	50.0	43.0	143.3	33.2	4.1	12.9	163.8	64.0	23.88	154.0	51.0	21.52	90.0	60.0	50.0	50.0	141.0	90.0
5.	BD	L	13.0	40.0	36.0	152.0	53.9	33.4	95.7	163.2	65.5	24.2	151.0	68.0	29.82	120.0	70.0	95.0	50.0	123.0	86.0
6.	YN	L	13.0	42.0	36.0	148.6	67.1	13.4	99.8	165.4	64.0	23.7	155.5	72.0	30.0	147.0	82.0	99.0	99.0	119.0	80.0
7.	EV	P	12.0	41.0	39.0	145.6	64.1	12.8	99.7	170.0	77.8	26.8	160.0	60.0	23.1	120.0	60.0	95.0	90.0	110.0	70.0
8.	MF	L	13.0	39.0	36.0	144.8	51.1	4.7	97.0	170.0	74.0	25.5	154.4	71.5	29.8	130.0	76.0	99.0	90.0	110.0	72.0
9.	AR	P	12.0		45.0	152.6	56.2	44.1	95.8				148.7	45.7	20.8	144.0	70.0	99.0	90.0		
10.	AM	P	12.0	36.0	36.0	152.4	67.5	47.5	99.5	160.0	65.0	25.0	157.0	55.0	22.0	131.0	86.0	99.0	99.0	140.0	80.0
11.	AA	L	13.0	46.0	46.0	152.5	63.7	7.5	98.8	160.0	83.5	32.0	154.0	53.0	22.0	120.0	71.0	95.0	90.0	229.0	129.0
12.	MA	L	13.0	38.0	37.0	158.1	62.5	61.1	98.0	166.0	74.7	26.68	156.8	59.7	23.88	130.0	75.0	99.0	90.0	128.0	84.0
13.	MS	L	14.0	61.0	58.0	164.7	52.9	40.0	51.0	162.0	62.0	23.66	149.0	43.1	19.41	100.0	50.0	50.0	50.0	120.0	80.0
14.	AA	L	14.0	40.0	35.0	160.7	64.1	29.0	95.7	168.2	80.0	28.6	156.8	69.2	27.7	130.0	100.0	99.0	99.0	120.0	78.0
15.	EP	L	14.0	49.0	48.0	157.9	98.6	22.4	99.9	158.5	72.9	29.2	150.0	51.0	22.17	140.0	100.0	99.0	99.0	165.0	99.0
16.	UM	P	14.0	39.0	34.0	145.1	55.2	1.7	96.4	162.5	104.6	39.62	152.0	50.0	21.74	110.0	80.0	90.0	95.0	150.0	110.0
17.	YC	L	14.0	47.0	31.0	152.0	61.9	10.6	96.7	159.0	62.6	25.04	167.0	60.0	21.51	130.0	80.0	99.0	95.0	150.0	87.0
18.	BS	L	13.0	48.0	43.0	167.8	76.6	82.6	98.9	170.0	60.0	20.76	152.8	54.1	23.22	160.0	80.0	99.0	95.0	120.0	80.0
19.	MA	L	13.0	47.0	45.0	162.1	51.0	46.7	57.6	170.0	68.3	23.63	149.4	66.6	29.87	100.0	60.0	50.0	50.0	120.0	80.0
20.	ME	L	14.0	54.0	51.0	164.5	66.9	43.3	95.2	165.1	65.5	23.99	160.0	60.0	23.44	140.0	70.0	99.0	90.0	120.0	80.0
21.	AW	L	14.0	62.0	58.0	148.5	59.1	2.5	98.4	175.0	64.0	20.92	146.5	59.2	27.58	150.0	90.0	99.0	99.0	130.0	80.0
22.	NS	L	14.0	44.0	46.0	164.2	68.8	56.3	97.3	155.0	65.0	27.08	155.5	68.7	28.39	110.0	80.0	50.0	95.0	140.0	90.0
23.	AR	L	13.0	45.0	45.0	173.8	85.0	93.0	99.2	175.8	86.0	27.83	152.1	65.1	28.18	140.0	80.0	99.0	95.0	140.0	90.0
24.	FM	L	12.0	40.0	37.0	145.9	60.4	22.9	99.7	178.0	65.0	20.5	150.0	64.1	28.49	130.0	80.0	99.0	95.0	120.0	80.0
25.	AR	P	13.0	50.0	48.0	152.0	69.2	32.7	99.6	160.9	64.0	24.7	149.2	64.6	28.97	130.0	90.0	99.0	99.0	140.0	90.0
26.	NH	L	13.0	42.0	37.0	146.4	60.5	27.2	99.7	175.2	88.9	28.96	165.0	65.0	23.9	110.0	80.0	50.0	95.0	142.0	90.0
27.	HR	L	13.0	44.0	35.0	144.2	33.3	4.3	10.1	170.0	70.0	24.22	156.0	62.7	25.76	90.0	60.0	50.0	50.0	120.0	80.0
28.	WF	P	13.0		36.0	148.3	40.9	5.0	35.5				148.2	62.1	28.27	100.0	70.0	50.0	50.0		
29.	AF	L	14.0	55.0	46.0	161.2	48.3	36.1	41.1	166.5	68.0	24.55	151.3	40.9	17.86	110.0	70.0	50.0	90.0	140.0	80.0
30.	HH	L	13.0	53.0	52.0	173.5	65.0	91.3	83.0	173.0	70.5	23.58	157.2	61.1	24.77	120.0	70.0	90.0	90.0	140.0	85.0
31.	MS	L	14.0	47.0	51.0	158.1	46.2	19.0	37.8	158.7	89.9	35.96	154.0	66.9	28.21	120.0	70.0	90.0	90.0	136.0	79.0
32.	AA	L	14.0	37.0	33.0	170.4	49.3	77.1	13.6	165.0	60.0	22.06	160.0	43.0	16.8	110.0	60.0	50.0	50.0	120.0	80.0
33.	FA	L	13.0	41.0	39.0	149.5	35.1	14.8	6.7	167.0	65.5	23.48	154.5	68.1	28.52	110.0	60.0	50.0	50.0	130.0	85.0
34.	AJ	P	14.0	46.0	39.0	153.2	63.1	17.2	97.3	171.2	76.0	25.94	152.0	61.0	26.41	110.0	80.0	50.0	95.0	145.0	90.0

35.	AH	P	13.0	56.0	50.0	156.2	84.5	45.9	100.0	162.0	65.0	24.81	154.0	66.6	28.1	110.0	80.0	90.0	95.0	110.0	70.0
36.	RI	P	14.0	43.0	44.0	145.6	36.0	1.5	11.1	160.0	55.0	21.48	145.0	55.6	26.48	90.0	60.0	50.0	50.0	120.0	80.0
37.	NH	L	13.0	45.0	41.0	159.1	66.0	37.5	98.1	160.9	68.8	26.56	160.0	60.0	23.44	120.0	90.0	90.0	99.0	180.0	110.0
38.	DP	L	13.0	39.0	43.0	153.6	42.8	34.7	47.4	171.7	54.3	18.41	154.0	67.0	28.27	110.0	60.0	90.0	50.0	123.0	70.0
39.	AR	P	13.0	42.0	32.0	155.0	43.8	45.3	42.4	160.0	60.0	23.44	151.8	54.2	23.57	100.0	70.0	50.0	90.0	135.0	80.0
40.	AF	L	14.0	52.0	45.0	157.0	42.9	15.1	19.0	163.2	60.0	22.56	143.8	47.1	22.75	90.0	60.0	50.0	50.0	135.0	90.0
41.	OY	L	13.0	55.0	50.0	143.8	32.3	4.2	6.0	168.0	69.5	24.65	148.2	65.1	29.59	100.0	70.0	50.0	90.0	170.0	110.0
42.	DC	P	12.0	42.0	40.0	148.2	41.0	19.2	53.8	163.0	70.0	26.32	153.0	57.6	24.62	85.0	50.0	50.0	50.0	120.0	80.0
43.	AA	L	13.0	42.0	36.0	165.5	46.2	80.8	19.8	172.0	65.0	21.96	159.4	64.7	25.47	120.0	70.0	50.0	50.0	130.0	85.0
44.	AS	L	13.0	58.0	47.0	164.9	50.3	87.7	54.3	160.0	76.0	29.69	149.5	67.1	29.96	115.0	70.0	50.0	50.0	220.0	120.0
45.	ID	L	14.0		43.0	157.0	42.4	21.9	19.1				155.0	46.0	19.17	120.0	60.0	90.0	50.0		
46.	AR	P	14.0	52.0	41.0	139.5	36.9	0.1	39.4	160.0	63.0	24.61	146.0	65.3	30.66	110.0	60.0	90.0	50.0	130.0	80.0
47.	YK	P	14.0	48.0	41.0	153.2	40.9	15.7	17.0	166.4	77.3	27.91	158.0	57.0	22.8	80.0	60.0	50.0	50.0	160.0	113.0
48.	AA	L	13.0	41.0	40.0	166.5	73.0	70.1	98.2	170.0	70.0	24.22	157.0	75.3	30.61	140.0	90.0	99.0	99.0	130.0	85.0
49.	S	P	14.0	37.0	38.0	151.0	41.6	10.3	29.8	170.0	60.0	20.76	146.5	57.2	26.6	90.0	60.0	50.0	50.0	120.0	80.0
50.	TB	L	14.0	47.0	41.0	159.0	51.6	22.7	68.3	170.0	71.2	24.64	153.8	65.1	27.47	110.0	70.0	90.0	90.0	140.0	80.0
51.	IN	P	14.0	40.0	46.0	152.9	46.4	15.6	53.6	170.3	70.0	24.14	149.5	67.8	30.8	120.0	70.0	90.0	90.0	120.0	80.0
52.	H	L	12.0	44.0	44.0	151.2	39.0	53.2	37.4	176.2	68.0	21.94	164.0	47.3	17.58	100.0	60.0	50.0	50.0	120.0	80.0
53.	YI	L	13.0	48.0	41.0	144.2	40.0	5.3	66.3	165.0	66.0	24.26	153.3	68.1	28.98	110.0	70.0	50.0	50.0	145.0	85.0
54.	LC	P	14.0	44.0	43.0	153.4	59.8	22.0	95.6	167.5	74.0	26.43	152.0	61.0	26.41	140.0	90.0	99.0	99.0	150.0	100.0
55.	AA	L	14.0	38.0	36.0	158.4	43.1	23.5	16.7	165.5	60.0	21.9	151.9	65.4	28.43	90.0	60.0	50.0	50.0	130.0	80.0
56.	PM	L	13.0	43.0	36.0	160.6	73.5	43.8	99.3	169.0	65.7	22.97	157.7	71.6	28.76	120.0	80.0	90.0	95.0	140.0	90.0
57.	AK	P	14.0	49.0	45.0	156.9	45.3	32.9	31.4	171.0	68.0	23.29	159.6	56.4	22.12	100.0	70.0	50.0	90.0	110.0	90.0
58.	DR	P	14.0	37.0	38.0	148.7	60.8	4.1	97.6	176.0	86.1	27.78	160.4	75.0	29.18	120.0	80.0	90.0	95.0	120.0	90.0
59.	HA	P	14.0	50.0	51.0	153.0	38.3	19.0	6.4	167.3	62.0	22.14	151.0	60.3	26.45	90.0	60.0	50.0	50.0	140.0	90.0
60.	HA	P	13.0	42.0	41.0	151.2	47.9	15.9	73.4	170.0	67.0	23.18	141.0	40.0	20.1	90.0	60.0	50.0	50.0	140.0	90.0
61.	MV	L	13.0	39.0	37.0	166.0	72.4	77.2	98.3	177.3	79.0	25.16	160.5	59.4	23.02	120.0	80.0	90.0	95.0	138.0	90.0
62.	RS	L	14.0	39.0	34.0	159.6	66.2	34.7	97.8	168.0	71.1	25.21	151.0	62.1	27.24	120.0	80.0	90.0	95.0	150.0	110.0
63.	MH	P	14.0	48.0	42.0	173.2	85.5	96.9	98.5	166.4	79.5	28.7	161.5	77.2	29.58	130.0	80.0	95.0	90.0	140.0	90.0
64.	IN	P	13.0	52.0	50.0	145.9	38.0	2.5	24.9	164.9	55.0	20.22	151.8	64.4	28.0	80.0	60.0	50.0	50.0	120.0	80.0
65.	ZN	P	12.0	41.0	34.0	162.1	53.4	79.9	71.1	160.0	75.0	29.3	156.8	72.0	29.27	100.0	70.0	50.0	90.0	135.0	85.0
66.	NC	P	13.0	40.0	39.0	157.2	77.1	44.9	99.6	178.0	99.0	30.9	151.4	56.0	24.3	142.0	74.0	99.0	90.0	110.0	80.0
67.	NI	P	14.0	46.0	44.0	151.0	76.1	9.3	99.8	170.0	70.0	24.1	152.1	52.7	22.9	110.0	80.0	90.0	95.0	120.0	80.0
68.	IK	L	13.0	36.0	35.0	158.1	39.9	63.8	11.0	161.9	60.0	22.9	157.6	54.7	22.06	90.0	60.0	50.0	50.0	120.0	80.0
69.	MI	L	13.0	45.0	44.0	145.1	34.9	5.8	18.1	168.4	74.1	26.09	150.0	45.0	20.0	110.0	70.0	90.0	90.0	161.0	97.0
70.	AG	L	13.0	49.0	49.0	139.9	36.4	1.3	55.8	179.0	72.0	22.5	156.3	66.9	27.42	120.0	65.0	50.0	50.0	140.0	80.0
71.	DS	P	12.0	43.0	37.0	153.7	44.6	52.9	59.5	169.0	69.7	24.37	150.6	61.2	26.96	100.0	60.0	50.0	50.0	110.0	70.0
72.	FN	P	14.0	42.0	38.0	164.1	83.3	66.5	99.3	170.0	87.8	30.38	161.3	58.0	22.31	170.0	90.0	99.0	99.0	154.0	89.0

No	TDS_Ibu	TDD_Ibu	Stagiz_Ank	Stagiz_Ayah	Stagiz_Ibu	Kat_TD_Ank	Kat_TD_Ayah	Kat_TD_Ibu	Kat_Hiper_Obes	Hered_Obes	Hered_Hipert	Hered_Hipert_Obes	Densitas_E	Kat_Dens_E
1.	148.0	92.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.18	Tinggi
2.	96.0	84.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.9	Normal
3.	157.0	78.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Normal	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.38	Tinggi
4.	135.0	85.0	Normal	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	2.08	Normal
5.	110.0	70.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.25	Tinggi
6.	122.0	82.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.05	Normal
7.	130.0	90.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Normal	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.26	Tinggi
8.	146.0	64.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Normal	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.84	Normal
9.	133.0	71.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.84	Normal
10.	110.0	70.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.03	Tinggi
11.	120.0	80.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.76	Normal
12.	120.0	69.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.01	Normal
13.	120.0	80.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.05	Normal
14.	145.0	93.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Normal	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.39	Tinggi
15.	120.0	77.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.87	Tinggi
16.	120.0	80.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.3	Tinggi
17.	111.0	74.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.16	Tinggi
18.	130.0	80.0	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.19	Tinggi
19.	124.0	82.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Normal		Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.11	Tinggi
20.	120.0	80.0	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.15	Tinggi
21.	160.0	100.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Normal	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.11	Tinggi
22.	131.0	84.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.84	Normal
23.	117.0	69.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.34	Tinggi
24.	112.0	86.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.59	Normal
25.	130.0	90.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.01	Tinggi
26.	111.0	74.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.27	Tinggi
27.	116.0	81.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Normal		Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.88	Normal
28.	134.0	82.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Normal	Normal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.94	Normal
29.	123.0	80.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.76	Normal
30.	120.0	74.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.02	Normal
31.	142.0	81.0	Normal	Obesitas	Obesitas	Normal	Normal	Normal	Normal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.77	Normal
32.	119.0	75.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.45	Tinggi
33.	174.0	104.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.65	Normal
34.	140.0	90.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.92	Normal
35.	120.0	75.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.71	Tinggi

36.	100.0	75.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.54	Normal
37.	137.0	85.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.28	Tinggi	
38.	120.0	80.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Normal	Normal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.81	Normal	
39.	111.0	84.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.45	Tinggi	
40.	134.0	85.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	2.19	Tinggi	
41.	153.0	95.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.97	Normal	
42.	107.0	69.0	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.93	Normal	
43.	127.0	89.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.82	Normal	
44.	149.0	69.0	Normal	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.37	Normal	
45.	135.0	85.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.79	Normal	
46.	120.0	80.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Normal	Normal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.31	Tinggi	
47.	120.0	80.0	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Ada	Ada	Ada	1.93	Normal	
48.	200.0	110.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Normal	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.91	Normal	
49.	150.0	100.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.84	Normal	
50.	170.0	109.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	2.03	Normal	
51.	140.0	90.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.6	Normal	
52.	110.0	70.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.91	Normal	
53.	130.0	90.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.65	Normal	
54.	140.0	90.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.85	Normal	
55.	140.0	100.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.76	Normal	
56.	137.0	94.0	Obesitas	Normal	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.85	Normal	
57.	114.0	78.0	Normal	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Normal	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	1.86	Normal	
58.	130.0	100.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.17	Tinggi	
59.	184.0	98.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.5	Normal	
60.	130.0	75.0	Normal	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Normal	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	1.93	Normal	
61.	140.0	100.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.91	Normal	
62.	130.0	90.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.77	Normal	
63.	130.0	90.0	Obesitas	Obesitas	Obesitas	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	1.96	Normal	
64.	140.0	80.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Normal	Normal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.62	Normal	
65.	130.0	80.0	Normal	Obesitas	Obesitas	Normal	Normal	Normal	Normal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1.72	Normal	
66.	107.0	68.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	3.04	Tinggi	
67.	113.0	67.0	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Hipertensi Obesitik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.21	Tinggi	
68.	123.0	90.0	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	2.3	Tinggi	
69.	110.0	80.0	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Normal	Ada	Ada	Ada	2.08	Normal	
70.	141.0	79.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	2.11	Tinggi	
71.	140.0	90.0	Normal	Normal	Obesitas	Normal	Normal	Hipertensi	Normal	Ada	Ada	Ada	1.8	Normal	
72.	110.0	72.0	Obesitas	Obesitas	Normal	Hipertensi	Hipertensi	Normal	Hipertensi Obesitik	Ada	Ada	Ada	2.32	Tinggi	


CDC Growth Charts: United States



Published May 30, 2000.

SOURCE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with
the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).

CDC Growth Charts: United States




Published May 30, 2000.

SOURCE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).




SAFER • HEALTHIER • PEOPLE™

Systolic Blood Pressure Chart by Age



Diastolic Blood Pressure Chart by Age



Contoh Perhitungan Asupan Makanan

ID_Nama: AR

HASIL PERHITUNGAN DIET

Nama Makanan	Jumlah	energy
nasi putih	300 g	390.1 kcal
roti daging	4 g	11.4 kcal
mie sedap goreng	6 g	27.2 kcal
mie rebus	2 g	11.1 kcal
ubi goreng	6 g	11.1 kcal
fried chicken	25 g	83.0 kcal
santan	6 g	4.3 kcal
fried chicken	2 g	6.6 kcal
telur dadar	26 g	48.6 kcal
telur asin	6 g	9.3 kcal
telur goreng	8 g	15.3 kcal
santan	7 g	5.0 kcal
nugget	42 g	84.3 kcal
sayur sop	3 g	3.1 kcal
siomay	170 g	120.7 kcal
cilok	60 g	153.6 kcal
tahu goreng	100 g	206.0 kcal
bakso daging sapi	20 g	74.0 kcal
risoles	7 g	17.3 kcal
permen	15 g	58.0 kcal
kerupuk ikan berpati	5 g	16.8 kcal
gula pasir	26 g	100.6 kcal
susu dancow instant	35 g	162.4 kcal

Analisis:

$$\text{Total energi} = 1619,7 \text{ kkal}$$

$$\text{Total jumlah makanan} = 881 \text{ gram}$$

$$\text{Densitas energi} = \frac{1619,7}{881} = 1,84 \text{ kkal/g}$$