

**REVISI**

**HUBUNGAN KADAR SENG (Zn) RAMBUT DENGAN  
Z-SCORE PANJANG BADAN MENURUT UMUR  
(PB/U) BALITA USIA 12-24 BULAN**

Artikel Penelitian

disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
studi pada Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran  
Universitas Diponegoro



disusun oleh

**MURSID TRI SUSILO**

G2C009013

**PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

2013

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Artikel penelitian dengan judul “Hubungan Kadar Seng (Zn) Rambut dengan Z-score Panjang Badan Menurut Umur (PB/U) Balita Usia 12-24 Bulan” telah dipertahankan di depan penguji dan telah direvisi.

Mahasiswa yang mengajukan :

Nama : Mursid Tri Susilo  
NIM : G2C009013  
Fakultas : Kedokteran  
Program Studi : Ilmu Gizi  
Universitas : Diponegoro Semarang

Semarang, 27 September 2013

Pembimbing,

Nurmasari Widyastuti, S.Gz.,MSi.Med

NIP.198111052006042001

# HUBUNGAN KADAR SENG (Zn) RAMBUT DENGAN Z-SCORE PANJANG BADAN MENURUT UMUR (PB/U) BALITA USIA 12-24 BULAN

Mursid Tri Susilo<sup>1</sup>, Nurmasari Widyastuti<sup>2</sup>

## ABSTRAK

**Latar Belakang :** *Stunting* merupakan keadaan tubuh yang pendek sebagai akibat dari pertumbuhan linear yang terhambat, ditandai dengan *z-score* panjang badan menurut umur (PB/U) kurang dari -2 SD. Kadar seng rambut dapat menggambarkan kadar seng kronis pada masa lampau sehingga tepat untuk mengukur kadar seng pada kondisi *stunting* yang merupakan kondisi malnutrisi yang sudah berlangsung lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kadar seng (Zn) rambut dengan *z-score* panjang badan menurut umur (PB/U) balita usia 12-24 bulan sehingga dapat menjadi acuan dalam menjelaskan pengukuran kadar seng (Zn) rambut sebagai indikator kejadian *stunting* secara biokimia.

**Metode :** Penelitian observasional dengan desain *cross sectional*, jumlah subjek 58 balita usia 12-24 bulan di kecamatan Semarang Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan *consecutive sampling*. Data asupan makanan diperoleh menggunakan *food recall* 3x24 jam. Kadar seng rambut diukur dengan metode *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS). Analisis bivariat menggunakan uji *Pearson* dan *Rank-Spearman*.

**Hasil :** Angka kejadian balita *stunting* ( $< -2SD$ ) yaitu 36,21%. Semua subjek memiliki kadar seng rambut normal ( $198,61 \pm 49,73$  ppm) dan tidak terdapat hubungan antara kadar seng (Zn) rambut dengan *z-score* PB/U ( $r = -0,069$ ;  $p=0,607$ ).

**Kesimpulan :** Kadar seng (Zn) rambut tidak berhubungan dengan *z-score* PB/U ( $r = -0,069$ ;  $p=0,607$ ).

**Kata Kunci :** kadar seng rambut, *z-score* PB/U, *stunting*

- 
1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas kedokteran Universitas Diponegoro Semarang
  2. Dosen Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

## **THE RELATIONSHIP BETWEEN HAIR ZINC (Zn) LEVEL AND LENGTH FOR AGE Z-SCORE (LTA) AMONG TODDLERS AGED 12-24 MONTHS**

Mursid Tri Susilo<sup>1</sup>, Nurmasari Widyastuti<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

**Background :** Stunting is a short stature condition as a result of linear growth disorders that characterized by Length for Age Z-score (LTA) < -2 SD. Hair zinc level indicate chronic zinc level in the long term so that appropriate for measuring zinc level on the condition of stunting malnutrition that has lasted a long time. The aim of this research is to investigate the relationship between hair zinc (Zn) level and Length for Age Z-score (LTA) among toddlers aged 12-24 months so it can be a reference to explain the zinc level measuring as an indicator of *stunting* prevalence biochemically .

**Method :** An observational study with cross-sectional design on 58 toddlers aged 12-24 months in East Semarang. Subjects were recruited by consecutive sampling. Dietary intake data acquired using a 3x24 hours food recall. Hair zinc level were measured by Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). Bivariate analysis used Pearson and Rank-Spearman.

**Results :** There were 36,21 % of stunted toddlers (< -2 SD). All of subjects had a normal hair zinc level ( $198,61 \pm 49,73$  ppm) and there wasn't relationship between hair zinc level and Length for Age Z-score (LTA) ( $r = -0,069$ ;  $p=0,607$ ).

**Conclusion :** There wasn't relationship between hair zinc level and Length for Age Z-score (LTA) ( $r = -0,069$ ;  $p=0,607$ ).

**Keywords :** hair zinc level, length for age Z-score (LTA), stunting

- 
1. Students of Nutrition Science Study Program, Medical Faculty of Diponegoro University
  2. Lecturer of Nutrition Science Study Program, Medical Faculty of Diponegoro University

## PENDAHULUAN

Upaya perbaikan gizi dihadapkan pada masalah gizi makro dan mikro. Defisiensi seng (Zn) merupakan masalah gizi mikro yang belum sepenuhnya teratasi, hal ini ditunjukkan dengan angka kejadian defisiensi seng yang tinggi di Indonesia. Sebesar 17,3 % penduduk di dunia mengalami defisiensi seng pada tahun 2005, sementara itu 32 % balita Indonesia mengalami defisiensi seng pada tahun 2006.<sup>1,2,3</sup>

Seng adalah mineral esensial yang berperan dalam sintesis, sekresi, dan kontrol hormon pertumbuhan (*Growth Hormon*). Rendahnya sintesis hormon pertumbuhan dapat menghambat pertumbuhan linier dan diduga menyebabkan kondisi *stunting* pada masa balita.<sup>4,5,6</sup> *Stunting* merupakan keadaan tubuh yang pendek sebagai akibat dari pertumbuhan linear yang terhambat, ditandai dengan *z-score* panjang badan menurut umur (PB/U) kurang dari -2 SD.<sup>7,8</sup> Keadaan *stunting* digunakan sebagai indikator masalah gizi kronis yang muncul akibat dari kurang gizi yang sudah berlangsung lama atau penyakit infeksi yang terjadi sehingga memerlukan waktu bagi balita *stunting* untuk tumbuh dan berkembang serta pulih kembali.<sup>9</sup> Anak *stunting* cenderung sulit mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan optimal secara fisik maupun psikomotorik yang erat kaitannya dengan kemunduran kecerdasan dan produktivitas.<sup>10</sup>

Prevalensi balita *stunting* di Asia Tenggara tergolong tinggi yaitu sebesar 29,1 % pada tahun 2007 sedangkan Indonesia sebesar 35,6 % pada tahun 2010.<sup>11,12</sup> Menurut Riskesdas 2010, prevalensi balita *stunting* pada tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah adalah 33,9 % sedangkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Jawa tengah pada tahun 2010 menunjukkan prevalensi balita *stunting* di Semarang sebesar 27,5%.<sup>12,13</sup>

Kuantitas dan kualitas zat gizi yang terasup di dalam makanan akan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan balita oleh karena itu makanan harus dapat memenuhi kebutuhan gizi balita.<sup>14,15</sup> Pertumbuhan balita juga berhubungan dengan berat bayi saat lahir. Penelitian yang dilakukan di Tanzania menyebutkan bahwa bayi dengan berat lahir rendah merupakan faktor risiko *stunting*.<sup>16</sup>

Penelitian mengenai hubungan kadar seng dengan *z-score* PB/U masih terbatas dimana masih terdapat hasil yang tidak konsisten. Penelitian pada balita usia 0-36 bulan di Palestina menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kadar seng serum dengan *z-score* PB/U dimana prevalensi kadar seng serum yang rendah (defisiensi) pada balita *stunting* ( $z\text{-score} < -2\text{ SD}$ ) lebih tinggi dibandingkan dengan balita *nonstunting* ( $z\text{-score} \geq -2\text{ SD}$ ) yaitu masing-masing sebesar 70,1 % dan 11,6%.<sup>17</sup> Namun penelitian pada balita usia 6-59 bulan di Nusa Tenggara Barat, Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak ada hubungan kadar seng serum dengan *z-score* PB/U.<sup>18</sup>

Kadar seng tubuh dapat diketahui dengan menggunakan *biomarker* kadar seng rambut. Analisis kadar seng rambut lebih tepat menggambarkan kadar seng kronis pada masa lampau sehingga tepat untuk mengukur kadar seng pada kondisi *stunting* yang merupakan kondisi malnutrisi yang sudah berlangsung lama. Kadar seng serum tidak selalu menggambarkan secara tepat kadar seng tubuh karena tergantung pada kadar albumin. Selain itu, pengambilan sampel seng rambut akan menghindari risiko invasif yang mungkin terjadi pada pengambilan serum seng.<sup>6,19,20</sup>

Penelitian seng rambut pada balita masih terbatas dan jarang dilakukan. Sementara itu penelitian kadar seng rambut pernah dilakukan pada anak sekolah dasar usia 6-9 tahun oleh Arindha 2012 yang menyatakan ada hubungan kadar seng rambut dengan derajat *stunting* yang ditentukan berdasarkan *z-score* TB/U. *Z-score* TB/U meningkat dengan meningkatnya kadar seng rambut.<sup>21</sup> Angka prevalensi balita *stunting* tertinggi di kota Semarang terjadi di wilayah kecamatan Semarang Timur yaitu sebesar 40,2 % (96 balita *stunting*).<sup>22</sup>

Subjek penelitian ialah balita usia 12-24 bulan karena usia tersebut merupakan tahapan *golden period* disaat pertumbuhan terjadi sangat pesat dan kritis sehingga zat gizi mikro seng memiliki peran yang besar dalam proses pertumbuhan linear.<sup>23</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar seng (Zn) rambut dengan *z-score* PB/U balita usia 12-24 bulan.

## METODE

Penelitian menggunakan rancangan *cross sectional* yang melibatkan balita usia 12-24 bulan di wilayah kerja puskesmas Bugangan, kecamatan Semarang Timur, kota Semarang. Populasi target penelitian ini adalah balita dengan usia 12-24 bulan. Populasi terjangkau adalah balita usia 12-24 bulan di kelurahan Bugangan, kelurahan Mlatiharjo, dan kelurahan Kebon Agung di wilayah kerja puskesmas Bugangan, kecamatan Semarang Timur, kota Semarang. Dari 3 puskesmas yang ada di wilayah kecamatan Semarang Timur, dipilih 1 puskesmas secara acak untuk mewakili seluruh puskesmas yang ada yaitu puskesmas Bugangan. Wilayah kerja puskesmas Bugangan yaitu kelurahan Bugangan, kelurahan Mlatiharjo, dan kelurahan Kebon Agung.

Pengambilan subjek penelitian dengan melakukan pengambilan data secara *consecutive sampling* pada balita usia 12-24 bulan. Pengumpulan data karakteristik sampel menggunakan kuesioner meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, penyakit infeksi yang diderita, dan berat badan lahir. Pengukuran tinggi badan menggunakan *Microtoise* dengan panjang maksimal 200 cm dan tingkat ketelitian 0,1 cm.<sup>24,25</sup> Pengolahan data menggunakan software WHO Anthroplus untuk penentuan status gizi balita.

Subjek minimal yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 52 balita. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah usia subjek penelitian minimum 12 bulan dan maksimum 24 bulan serta orang tua dari subjek penelitian bersedia mengisi *informed consent*. Kriteria eksklusi penelitian yaitu subjek penelitian tidak dapat ditemui karena alasan tertentu sehingga data tidak lengkap, mengundurkan diri pada saat penelitian sedang berlangsung, atau meninggal.

Sampel rambut yang digunakan yaitu rambut kepala bagian *occipital* (kepala bagian belakang) sepanjang 1,5-3 cm dari kulit kepala dengan total berat rambut per sampel yaitu 0,3-0,5 gram.<sup>26</sup> Pemeriksaan kadar seng rambut dengan menggunakan metoda *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS) dengan alat *spectrophotometer Perkin Elmer* dilakukan di laboratorium Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Kimia Universitas Diponegoro. Pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas laboratorium.

Pengumpulan data asupan zat gizi makro (energi, protein, dan lemak) dan asupan zat gizi mikro (seng, besi, kalsium, dan vitamin A) diperoleh melalui wawancara menggunakan *food recall* 24 jam selama tiga hari tidak berturut-turut. Analisis data menggunakan program komputer. Uji *korelasi Pearson* digunakan untuk menguji hubungan kadar seng rambut dengan *z-score* PB/U.

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan 58 balita usia 12-24 bulan sebagai subjek penelitian di Kelurahan Bugangan, Kelurahan Mlatiharjo, dan Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur. Jumlah balita laki-laki sebanyak 23 (39,7 %) dan balita perempuan 35 (60,3 %) dengan rata-rata usia subjek penelitian adalah  $17,98 \pm 3,63$  bulan. Rata-rata *z-score* PB/U subjek penelitian yaitu  $-1,26 \pm 1,40$  SD dengan angka kejadian balita *stunting* sebanyak 21 (36,21%). Rata-rata berat badan lahir balita *stunting* adalah  $3,01 \pm 0,33$  kg sedangkan balita normal adalah  $3,19 \pm 0,51$  kg. Hasil analisis uji *Pearson* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara berat badan lahir dengan *z-score* PB/U ( $r = 0,210$  ;  $p = 0,114$ ).

**Tabel 1. Karakteristik subjek penelitian**

No	Karakteristik	Kategori <i>Stunting</i>			
		<i>Stunting</i> (n=21)		Normal (n=37)	
		n	%	n	%
1	Jenis kelamin				
	• Laki-laki	8	38,1	15	40,5
	• Perempuan	13	61,9	22	59,5
2	Penyakit infeksi diare				
	• Diare	2	9,5	1	2,7
	• Tidak diare	19	90,5	36	97,3
3	Penyakit infeksi ISPA				
	• ISPA	5	23,8	5	13,5
	• Tidak ISPA	16	76,2	32	86,5

### Kadar Seng (Zn) Rambut

Nilai rata-rata kadar seng rambut pada subjek penelitian yaitu  $198,61 \pm 49,73$  ppm dengan kadar seng rambut terendah  $121,34$  ppm dan tertinggi  $374,40$  ppm. Nilai rata-rata kadar seng rambut balita *stunting* yaitu  $198,32 \pm 55,67$  ppm sedangkan balita normal  $198,77 \pm 46,84$  ppm. Semua subjek dalam penelitian ini memiliki kadar seng rambut normal ( $\geq 100$  ppm).<sup>27</sup> Hasil analisis uji *Pearson* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kadar seng rambut dengan *z-score* PB/U ( $r = -0,069$  ;  $p = 0,607$ ). Deskripsi dari asupan makanan subjek penelitian ditampilkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Gambaran Asupan Makanan Berdasarkan Kategori *Stunting***

Variabel (mean $\pm$ SD)	Kategori <i>Stunting</i>	
	<i>Stunting</i> (mean $\pm$ SD)	Normal (Mean $\pm$ SD)
Asupan energi $991,89 \pm 197$ kkal	$884,34 \pm 184$ kkal	$1052,93 \pm 179$ kkal
Asupan protein $34,99 \pm 10,14$ gram	$32,86 \pm 8,90$ gram	$38,40 \pm 9,7$ gram
Asupan lemak $45,31 \pm 12,48$ gram	$40,67 \pm 14,11$ gram	$47,95 \pm 10,79$ gram
Asupan seng $4,40 \pm 1,49$ miligram	$3,65 \pm 1,30$ miligram	$4,82 \pm 1,44$ miligram
Asupan besi $7,82 \pm 6,81$ miligram	$5,60 \pm 3,42$ miligram	$9,07 \pm 7,90$ miligram
Asupan kalsium $557,99 \pm 287,27$ miligram	$455,97 \pm 255,41$ miligram	$615,90 \pm 291,39$ miligram
Asupan vitamin A $754,26 \pm 915,30$ mikrogram	$504,98 \pm 206,85$ mikrogram	$895,74 \pm 1116,19$ mikrogram

### PEMBAHASAN

Angka kejadian *stunting* pada penelitian ini adalah sebanyak 21 balita (36,21%). Angka tersebut lebih rendah dari data Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2011 yang menyatakan prevalensi *stunting* di kecamatan Semarang Timur sebesar 40,2%.<sup>22</sup> Angka kejadian balita *stunting* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian *stunting* masih tinggi pada balita usia 12-24 bulan. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari data prevalensi *stunting* Jawa Tengah sebesar 33,9 % dan Indonesia 35,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah kecamatan Semarang Timur termasuk dalam wilayah dengan angka kejadian *stunting* tinggi di Indonesia.

Angka kejadian *stunting* balita perempuan (61,9%) lebih tinggi daripada balita laki-laki (38,1%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian pada balita usia 1-5 tahun di Nusa Tenggara Barat, dimana prevalensi *stunting* balita perempuan (51,7%) lebih tinggi daripada balita laki-laki (48,3%).<sup>18</sup> Kondisi *stunting* yang terjadi pada balita tidak lepas dari faktor penyakit infeksi yang berlangsung lama sehingga mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan balita. Penyakit infeksi yang terjadi merupakan salah satu penyebab terjadinya *stunting* pada balita.<sup>9</sup> Masalah infeksi sering ditemui di dalam sebuah masyarakat. Hubungan timbal balik antara penyakit infeksi dengan balita *stunting* dapat dilihat secara luas bahwa Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sering menyertai balita *stunting*. Penyakit diare dengan mudah terjadi pada anak dengan daya tahan tubuh yang lemah, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus maka berisiko terjadinya *stunting*.<sup>28</sup>

Berdasarkan data riwayat penyakit infeksi selama 3 bulan terakhir, angka kejadian diare balita *stunting* (9,5 %) lebih tinggi daripada balita normal (2,7 %) begitu pula dengan angka kejadian ISPA balita *stunting* (23,8 %) lebih tinggi daripada balita normal (13,5 %). Hal ini mendeskripsikan bahwa angka terjadinya penyakit infeksi diare dan ISPA pada balita *stunting* lebih tinggi daripada balita normal.

Berat badan saat lahir dikaitkan dengan proses pertumbuhan yang akan terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Tanzania bahwa bayi dengan berat lahir rendah merupakan faktor risiko terjadinya *stunting*, namun penelitian yang dilakukan di Semarang Timur ini menunjukkan hasil yang berbeda.<sup>16</sup> Rata-rata berat badan lahir balita *stunting* ( $3,01 \pm 0,33$  kg) sedangkan balita normal ( $3,19 \pm 0,51$  kg). Nilai kedua rata-rata tersebut lebih tinggi dari batas Bayi Berat Lahir Rendah 2500 gram dengan risiko tinggi terjadinya *stunting*. Analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara berat badan lahir dengan kategori *stunting* ( $r = 0,210$ ;  $p = 0,114$ ).

## Asupan Zat Gizi

Jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) zat gizi yang terasup di dalam makanan akan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan balita, oleh karena itu makanan harus dapat memenuhi kebutuhan gizi balita.<sup>14,15</sup> Rata-rata asupan protein balita *stunting* ( $32,86 \pm 8,90$  gram) dan balita normal ( $38,40 \pm 179$  gram) diatas angka kecukupan protein populasi balita usia 12-24 bulan menurut AKG (26 gram). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata subjek penelitian tidak mengalami defisiensi asupan protein. Pertumbuhan tinggi badan balita salah satunya dipengaruhi oleh asupan protein. Asam amino essensial yang terkandung di dalam protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan imunitas tubuh. Asam amino ini tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus disuplai dari makanan.<sup>29</sup>

Rata-rata asupan seng balita *stunting* ( $3,65 \pm 1,30$  mg) di bawah angka kecukupan seng populasi balita usia 12-24 bulan menurut AKG (4 mg), sedangkan rata-rata asupan seng balita normal ( $4,82 \pm 1,44$  mg) di atas kecukupan AKG. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata asupan seng balita *stunting* mengalami defisiensi asupan seng dibandingkan dengan balita normal. Asupan seng yang optimal mendukung proses pertumbuhan, fungsi imunitas, dan pembentukan tulang.<sup>30</sup>

Rata-rata asupan zat besi balita *stunting* ( $5,60 \pm 3,42$  mg) di bawah angka kecukupan zat besi populasi balita usia 12-24 bulan menurut AKG (7 mg), sedangkan rata-rata asupan zat besi balita normal ( $9,07 \pm 7,90$  mg) diatas kecukupan AKG. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata asupan zat besi balita *stunting* mengalami defisiensi dibandingkan dengan balita normal. Asupan zat besi yang rendah memungkinkan terjadinya anemia defisiensi besi. Dampak anemia gizi besi pada balita dihubungkan dengan terganggunya fungsi kognitif, perilaku dan pertumbuhan.<sup>31</sup>

## **Hubungan Kadar Seng (Zn) Rambut dengan Z-score PB/U**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka kejadian balita *stunting* ( $z\text{-score} < -2 \text{ SD}$ ) sebesar 36,21% namun semua subjek penelitian memiliki kadar seng rambut normal ( $\geq 100 \text{ ppm}$ ) dengan rata-rata  $198,61 \pm 49,73 \text{ ppm}$ . Rata-rata kadar seng (Zn) rambut balita *stunting* ( $198,32 \pm 55,67 \text{ SD}$ ) sedangkan balita normal ( $198,77 \pm 46,84 \text{ SD}$ ). Analisis statistik menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kadar seng (Zn) rambut dengan  $z\text{-score}$  PB/U ( $r = -0,069$ ;  $p = 0,607$ ).

Hasil penelitian sebelumnya tahun 2012 yang dilakukan di daerah Pati dengan subjek anak sekolah usia 6-9 tahun menemukan hubungan signifikan antara kadar seng rambut dengan  $z\text{-score}$  TB/U. Perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi karena perbedaan usia subjek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada subjek berumur 12-24 bulan, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada subjek berumur 6-9 tahun. Usia erat kaitannya dengan pertumbuhan pada anak, dimana  $z\text{-score}$  TB/U menjadi salah satu indikator paling praktis dan cukup akurat untuk mengidentifikasi pertumbuhan seorang anak, disamping indikator  $z\text{-score}$  berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).  $Z\text{-score}$  PB/U menjadi satu-satunya indikator untuk menginterpretasikan keberhasilan pertumbuhan pada usia balita. Umur merupakan salah satu dasar dalam menentukan nilai  $z\text{-score}$  PB/U individu, sehingga perbedaan umur subjek pada dua penelitian tersebut dapat mengakibatkan perbedaan hasil analisis dimana terdapat hubungan signifikan antara kadar seng rambut dengan  $z\text{-score}$  TB/U pada anak SD usia 6-9 tahun namun tidak terdapat hubungan signifikan antara kadar seng rambut dengan  $z\text{-score}$  PB/U pada balita usia 12-24 bulan.

Tidak adanya hubungan yang signifikan antara kadar seng rambut dengan  $z\text{-score}$  PB/U pada balita usia 12-24 bulan ini, dapat diakibatkan oleh karakteristik rambut yang diambil sebagai objek penelitian. Rambut dipilih sebagai indikator kecukupan seng dalam tubuh karena sel-sel rambut memiliki simpanan seng yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lain pada tubuh seperti kuku, kulit maupun serum darah sehingga kadar seng akan lebih mudah terdeteksi, namun

penggunaan sampo rambut, konsumsi obat-obatan maupun suplemen tidak ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga menjadi salah satu keterbatasan yang mengakibatkan data seng rambut menjadi tidak objektif sebagai gambaran kecukupan seng pada balita.

Penelitian di Palestina tahun 2010 pada balita usia 1-3 tahun juga meneliti tentang hubungan kadar seng dengan kejadian *stunting*.<sup>17</sup> Akan tetapi, penelitian tersebut menggunakan kadar seng serum dalam darah sebagai indikator *stunting*. Hubungan signifikan ditemukan antara kadar seng dalam darah dengan kejadian *stunting* pada anak usia 1-3 tahun. Penggunaan kadar serum sebagai indikator kecukupan seng pada balita cukup mempengaruhi hasil yang diperoleh. Pengambilan darah oleh tenaga kesehatan terlatih (petugas laboratorium), serta tidak adanya paparan kontaminasi dari luar tubuh menjadikan hasil signifikan lebih bisa terlihat dibandingkan pada penelitian dengan menggunakan rambut sebagai indikator kecukupan seng tubuh.

Pengukuran kadar seng rambut dapat digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi mineral seng di dalam tubuh. Kadar seng di dalam tubuh dapat digambarkan melalui kadar seng di dalam rambut, begitu pula dengan konsentrasi paparan mineral seng lain yang bersumber dari luar tubuh misalnya debu, kotoran, atau sampo rambut. Adanya paparan asing tersebut mengakibatkan kadar seng rambut lebih tinggi dari keadaan seharusnya. Selain itu, terjadi efek paradoksial antara kadar seng rambut dengan kadar seng darah. Pada kondisi defisiensi seng di dalam darah, tidak selalu ditunjukkan melalui defisiensi kadar seng rambut. Perubahan kandungan seng rambut lebih lambat daripada perubahan seng dalam darah. Respon perubahan konsentrasi seng dalam rambut terjadi pada periode 6 minggu atau kurang, sejak terjadinya perubahan kronis status seng pada manusia. Kadar seng darah sangat cepat berubah seiring dengan konsumsi yang mengikuti pola diurnal, serta kondisi fisiologis seseorang. Oleh karena itu, interpretasi kadar seng rambut harus dilakukan dengan hati-hati. Pemeriksaan kadar seng rambut lebih baik dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kadar seng darah dalam menginterpretasikan kemungkinan defisiensi seng.<sup>32</sup>

Pemilihan rambut sebagai indikator kecukupan seng memiliki keuntungan dibandingkan serum darah yaitu menghindari risiko invasif pada subjek penelitian dan kepraktisan bagi peneliti. Pemilihan indikator sangat dipengaruhi oleh karakteristik subjek dan pertimbangan-pertimbangan lain untuk memperlancar jalannya penelitian dengan tetap mempertimbangkan kualitas data yang diperoleh. Faktor lain yang mempengaruhi panjang badan balita seperti faktor genetik tidak dapat dikontrol di dalam penelitian ini. Analisis dengan melibatkan sel-sel atau jaringan tubuh yang lebih kompleks seperti DNA memungkinkan hasil penelitian yang lebih baik dalam menunjukkan faktor yang mempengaruhi panjang badan balita.

Belum ada indikator yang paling baik dan paling valid untuk menggambarkan kecukupan seng, oleh karena itu diperlukan instrumen pengambilan dan pengolahan data simpanan seng di dalam tubuh dengan sensitivitas yang lebih baik agar tetap bisa dipakai selama penelitian dengan subjek yang berbeda tanpa terjadi bias atau mampu memperkecil kemungkinan terjadinya bias.

## **KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengambilan sampel rambut pada bagian paling dekat dengan kulit kepala sehingga menggunakan rambut kepala bagian ujung. Sampel rambut tersebut lebih rentan terhadap kontaminasi seperti debu atau kotoran pada batang rambut. Selain itu, tidak diteliti mengenai konsumsi obat dan suplemen yang juga kemungkinan dapat berpengaruh terhadap kadar seng rambut subjek penelitian.

## **SIMPULAN**

Angka kejadian balita *stunting* dalam penelitian ini adalah sebesar 36,21 %. Semua subjek penelitian memiliki kadar seng rambut normal dengan rata-rata kadar seng balita *stunting*  $198,32 \pm 55,67$  ppm dan balita normal  $198,77 \pm 46,84$  ppm. Tidak terdapat hubungan antara kadar seng (Zn) rambut dengan *z-score* PB/U.

## **SARAN**

1. Perlu dilakukan pendekatan lebih komprehensif terhadap subjek penelitian sehingga didapatkan sampel rambut yang lebih tepat yaitu bagian rambut paling dekat dengan kulit kepala.
2. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai konsumsi obat dan suplemen yang juga mempengaruhi kadar seng rambut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan segala kemudahan yang telah diberikan. Terima kasih kepada orang tua dan keluarga atas doa serta dukungannya. Terima kasih kepada Dosen penguji dan pembimbing atas kritik dan saran yang diberikan. Terimakasih kepada Kepala Puskesmas Bugangan Kecamatan Semarang Timur, seluruh balita dan orang tua subjek yang berperan dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Abas B, Jahari, Arum Atmawikarta, Atmarita, Dini Latief, Drajat, Endang, dkk. Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK). Republik Indonesia 2012.
2. K. Ryan Wessells, Kenneth H. Brown. Estimating the Global Prevalence of Zinc Deficiency: Results Based on Zinc Availability in National Food Supplies and the Prevalence of Stunting. Department of Nutrition,

University of California Davis, Davis, California, United States of America.2012.

3. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.Studi Masalah Gizi Mikro di 10 Propinsi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan (P3GM) Bogor. 2006.
4. Sareen S.G,Jack L,James L.Groff.Advanced Nutrition And Human Metabolism Fifth Edition. Wadsworth.Belmont,CA 94002-3098 USA.2009.
5. Lita Dwi Astari, Amini Nasoetion, Cesilia Meti Dwiriani. Hubungan Konsumsi ASI dan MP-ASI Serta Kejadian Stunting Anak Usia 6-12 Bulan di Kabupaten Bogor. Media Gizi dan Keluarga.2006. 30 (1) 15-23.
6. Brown, K.H., et al., International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG) technical document Assessment of the risk of zinc deficiency in populations and options for its control. Food Nutr Bull, 2004. 25(1 Suppl 2): p. S99-203.
7. Manary, M. J. & Solomons, N. W.Gizi Kesehatan Masyarakat, Gizi dan Perkembangan Anak. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Terjemahan Public Health Nutrition, Editor. Gibney, M.J, Margetts, B.M., Kearney, J.M. & Arab, L Blackwell Publishing Ltd, Oxford.2009.
8. World Health Organization.WHO Child Growth Standards. Geneva.2006.
9. United Nation System Standing Committee on Nutrition (UNSCN).Fifth Report On The World Nutrition Situation. Geneva : SCN.2004.
10. Deanna K.Olney, Ernesto Pollitt, Patricia K.Kariger, Sabra S.Khalfan, Nadra S.Ali, James M.Tielsch.Young Zanzibari Zhildren with Iron Deficiency, Iron Deficiency Anemia, Stunting, or Malaria Have Lower Motor Activity Scores and Spend Less Time in Locomotion.American Society for Nutrition.2007.
11. United Nation System Standing Committee on Nutrition (UNSCN).6th Report on The World Nutrition Situation Progress In Nutrition Situation.Geneva : SCN.2008.

12. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2010.
13. Tim Pemantauan Status Gizi (PSG) Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Jawa Tengah. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. Semarang. 2010.
14. Sulistijani, D.A., Herlianty M.P. Menjaga kesehatan bayi dan balita. Jakarta : Puspa Swara. 2001.
15. Roi David. Hubungan Asupan Makanan dengan Status Gizi Anak Usia 1-3 Tahun di Posyandu Balita Pos Balai Desa Plumpang Tuban. Stikes Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. 2012
16. Pongou R, Salomon JA, Ezzati M. Health impacts of macroeconomic crises and policies : determinants of variation in childhood malnutrition trends in Cameroon. *International Journal of Epidemiology* 2006 Jun; 35(3):648-656. Available from: URL: [www.bvsde.paho.org](http://www.bvsde.paho.org)
17. Zakout, Z.R. The Relationship Between Stunting and Zinc Deficiency Among Toddlers Aged 1-3 Years in Gaza Strip. Al-Azhar University-Gaza Faculty of Pharmacy Clinical Nutrition Program. 2010.
18. Taufiqurrahman. Defisiensi Vitamin A dan Zinc Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Stunting pada Balita di Nusa Tenggara Barat. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Volume XIX*. 2009.
19. Lowe NM, Fekete K, Decsi T. Methods of Assessment of Zinc Status in Humans: a Systematic Review. *Am J Clin Nutr* 2009; 89(suppl):2040S-51S.
20. Huwae FJ. Hubungan Antara Kadar Seng (Zn) dengan Memori Jangka Pendek pada Anak Sekolah Dasar. [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro. 2006.
21. Arindha Rahmawati, Yekti Wirawanni. Perbedaan Kadar Seng (Zn) Rambut Berdasarkan Derajat Stunting pada Anak Usia 6-9 Tahun. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas

- Diponegoro Semarang. *Journal of Nutrition College*, volume 1, nomor 1, 2012. hal 12-25
22. Dinas Kesehatan Kota Semarang. Laporan Pemantauan Status Gizi Kota Semarang. 2011.
  23. Gladys Gunawan, Eddy Faflyana, Kusnandi Rusmil. Hubungan Status Gizi dan Perkembangan Anak Usia 1-2 tahun. Sub Bagian Tumbuh Kembang Pediatri Sosial-Bagian SMF Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/RSUD Ulin, Banjarmasin. 2011.
  24. Riset Kesehatan Dasar. Pedoman pengukuran dan pemeriksaan. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI. Jakarta. 2007.
  25. Suhartini. Tahap perkembangan motorik bayi. FKIK Universitas Negeri Yogyakarta. 2005.
  26. Gibson RS. *Principle of Nutritional Assessment*. Second edition. Oxford University Press. 2005. p.380..
  27. Yasar U, Ozyigit. Use of Human as a Potential Biomonitor for Zinc in the Pendik District Istanbul Turkey. *Roumanian Society of Biological Sciences*. 2009;14(3):4477-84.
  28. Riswandri. Kebiasaan Membuka Jendela Rumah, Jumlah Anggota Keluarga dan Letak Ternak Kandang Berhubungan dengan Kejadian ISPA di Kecamatan Parung-Jawa Barat. Jawa Barat. Karya Tulis Ilmiah. 2002.
  29. Golden M H. Proposed recommended nutrient densities for moderately malnourished children. *Food and Nutrition Bulletin*, vol 30, no 3. 2009.
  30. Mahan LK, Sylvia ES. *Krause's Food and Nutrition Therapy*. 12th ed. Canada: Saunders Elsevier; 2008.
  31. Listyani Hidayati, Hamam Hadi, Amitya Kumara. Kekurangan Energi dan Zat Gizi Merupakan Faktor Risiko Kejadian Stunted pada Anak Usia 1-3 Tahun Yang Tinggal di Wilayah Kumuh Perkotaan Surakarta. *Jurnal Kesehatan*, ISSN 1979-7621, Vol. 3, No. 1, Juni 2010: 89-104
  32. Biolab Medical Unit. Hair Mineral Analysis. *Nutritional and Environmental Medicine*. England. September. 2012.

## MATERI *INFORMED CONSENT* PENELITIAN

- Judul Penelitian : Hubungan Kadar Seng (Zn) Rambut dengan *Z-Score* Panjang Badan Menurut Umur (PB/U) Balita Usia 12-24 Bulan di Kecamatan Semarang Timur.
- Peneliti : Mursid Tri Susilo
- Pembimbing : Nurmasari Widyastuti,S.Gz,Msi,Med.
- Lembaga : Universitas Diponegoro Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Gizi
- Latar Belakang : Kekurangan zat gizi mikro seng (Zn) diduga menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada anak-anak dengan manifestasi terhadap kejadian stunting. Hubungan status seng tubuh dengan pertumbuhan masih menjadi kontroversi karena mendapatkan hasil penelitian yang berbeda. Sementara itu, penelitian defisiensi seng dengan menggunakan indikator seng rambut masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan kadar seng rambut dengan *z-score* panjang badan menurut umur (PB/U) balita usia 12-24 bulan di Kecamatan Semarang Timur.
- Tujuan : Mengetahui hubungan kadar seng (Zn) rambut dengan *z-score* panjang badan menurut umur (PB/U) balita usia 12-24 bulan di Kecamatan Semarang Timur.
- Prosedur : Skrining dilakukan pertama kali untuk menentukan subjek, kemudian dilakukan pengukuran variabel sebanyak subjek minimal
- Manfaat : 1. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menjelaskan pengukuran kadar seng (Zn) rambut sebagai indikator kejadian *stunting* secara *biokimia*.  
2. Sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu intervensi untuk membantu memecahkan masalah defisiensi seng (Zn) dan *stunting* pada balita usia 12-24 bulan.
- Risiko : Tidak terdapat risiko atau bahaya yang ditimbulkan dari penelitian ini

**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI SUBJEK PENELITIAN**  
**(INFORMED CONSENT)**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Orang Tua : .....  
Nama anak : .....  
Tempat dan Tanggal lahir anak : .....  
Alamat : .....  
No Telepon/HP : .....

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa :

Setelah memperoleh penjelasan sepenuhnya, menyadari, mengerti, dan memahami tentang tujuan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian, serta sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri dan membatalkan dari keikutsertaan, maka saya setuju / tidak setuju \*) mengikutsertakan anak kami dan bersedia berperan dalam penelitian yang berjudul **“Hubungan Kadar Seng (Zn) Rambut dengan Z-score Panjang Badan Menurut Umur (PB/U) Balita Usia 12-24 Bulan di Kecamatan Semarang Timur”** yang akan dilakukan oleh :

Nama : Mursid Tri Susilo  
Alamat : Saditan Baru RT 06 RW 05 no.36 Kec.Brebes, Kab.Brebes, Jawa Tengah  
Instansi : Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan.

Mengetahui,  
Penanggungjawab Penelitian

Semarang, Juli 2013  
Yang menyatakan,  
Responden Penelitian

Mursid Tri Susilo

.....

\*) coret yang tidak perlu

## KUESIONER PENELITIAN

Nomor Responden : .....

Tanggal Wawancara : .....

Nama Pewawancara : .....

### A. Identitas subyek dan responden

1. Nama anak :
2. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Tanggal lahir anak :
4. Umur :                    tahun                    bulan
5. Anak ke :                    dari                    bersaudara
6. Nama Ibu :
7. Umur Ibu :
8. Alamat :
9. No. Telepon :

### B. Pengukuran antropometri

1. Panjang badan anak saat lahir :                    cm
2. Berat badan anak saat lahir :                    kg
3. Panjang badan anak :                    cm
4. Berat badan anak :                    kg

**C. Pemberian ASI**

1. Setelah kelahiran anak diberikan:
  - ASI
  - Susu Formula
  - Lainnya, sebutkan....
2. Anak mendapatkan ASI sampai usia:
  - < 6 bulan, sebutkan...
  - ≥ 6 bulan, sebutkan...
3. Anak mendapatkan makanan pendamping ASI (air putih, madu, susu formula, teh, dll) saat usia:
  - < 6 bulan, sebutkan...
  - ≥ 6 bulan, sebutkan...

**D. Status sosial ekonomi**

1. Jumlah anggota keluarga : orang
2. Jumlah anak balita : orang
3. Pendidikan terakhir Ayah :
  - Tidak Sekolah
  - Tamat SD/ sederajat
  - Tamat SMP/ sederajat
  - Tamat SMA/ sederajat
  - Tamat perguruan tinggi
4. Pendidikan terakhir Ibu :
  - Tidak Sekolah
  - Tamat SD/ sederajat
  - Tamat SMP/ sederajat
  - Tamat SMA/ sederajat
  - Tamat perguruan tinggi
5. Pekerjaan Ayah :
  - Tidak bekerja
  - Pegawai negeri
  - Pegawai swasta
  - Wiraswasta
  - Lainnya, sebutkan.....
6. Pekerjaan Ibu :
  - Tidak bekerja
  - Pegawai negeri
  - Pegawai swasta
  - Wiraswasta
  - Lainnya, sebutkan.....

7. Anggota keluarga yang bekerja.....orang
8. Total pendapatan keluarga :
- a. Pendapatan ayah :.....
  - b. Pendapatan Ibu :.....
  - c. Pendapatan anggota keluarga yang lain, sebutkan:
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
  - d. Pendapatan total keluarga : .....

## E. Riwayat Penyakit Infeksi

**Petunjuk :** Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan kondisi balita

1. Apakah anak ibu menderita diare dalam tiga bulan terakhir?
  - a. Ya, berapa kali dalam sehari dan berapa lama
  - b. Tidak

Jawaban : Jika menjawab a dengan frekuensi diare  $\geq 3$  kali/hari selama minimal 2 hari, maka menderita diare dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dan jika menjawab b, maka tidak menderita diare dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.

2. Berapa kali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir anak ibu terkena diare?
  - a.  $< 3$  kali
  - b.  $\geq 3$  kali

Jawaban : Jika menjawab a, maka tidak menderita diare dan jika menjawab b, maka menderita diare.

3. Apakah diare yang terjadi muncul setiap bulan dan berturut-turut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir?
  - a. Ya
  - b. Tidak

Jawaban : Jika menjawab a, maka termasuk kategori menderita diare dan jika menjawab b, maka termasuk kategori tidak menderita diare.

4. Apakah anak ibu menderita gejala batuk dalam tiga bulan terakhir?
  - a. Ya, bagaimana gejala yang terjadi dan berapa lama?

- 
- b. Tidak?

Jawaban : Jika menjawab iya dengan disertai salah satu atau lebih gejala seperti pilek, demam atau sesak nafas  $\leq 2$  minggu maka menderita infeksi saluran pernafasan atas akut.

5. Berapa kali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir anak ibu menderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA)?
  - a.  $< 3$  kali
  - b.  $\geq 3$  kali

Jawaban : Jika menjawab a, maka tidak menderita ispa dan jika menjawab b, maka menderita ispa.

6. Apakah gejala ispa yang terjadi muncul setiap bulan dan berturut-turut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir?
  - a. Ya
  - b. Tidak

Jawaban : Jika menjawab a, maka termasuk kategori menderita ispa dan jika menjawab b, maka termasuk kategori tidak menderita ispa.

**Formulir *Food Recall***

Nama Subyek :

No ID :

Hari :

Waktu	Menu Makanan	Bahan Makanan	URT	Gram

## HASIL LABORATORIUM UJI SENG RAMBUT

NO ID	<i>Part per million (ppm)</i>
1	162.00
2	125.75
3	203.49
4	230.14
5	187.35
6	165.29
7	179.07
8	219.50
9	234.28
10	270.30
11	180.45
12	165.30
13	220.14
14	173.79
15	246.12
16	182.30
17	170.48
18	134.27
19	149.85
20	193.22
21	210.39
22	214.65
23	278.70
24	239.31
25	245.16
26	256.40
27	189.63
28	168.32
29	145.60
30	129.78
31	134.65
32	140.13
33	229.76
34	220.33
35	208.96
36	176.89
37	184.40
38	210.45
39	256.10
40	278.43
41	135.00
42	187.65
43	121.34
44	136.12
45	246.86
46	275.56
47	248.90
48	209.87
49	374.40
50	237.56
51	249.07
52	167.85
53	175.40
54	165.29
55	214.65
56	140.13
57	135.00
58	187.35

**Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian untuk balita :**

Kelompok Umur	Energi	Protein	Lemak	Seng	Zat Besi	Kalsium	Vitamin A
1-3 tahun	1125 kkal	26 gram	44 gram	4 miligram	7 miligram	650 miligram	400 mikrogram

Sumber : AKG Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X 2012

### KATEGORI STUNTING = NORMAL

#### Statistics<sup>a</sup>

#### JENIS KELAMIN

N	Valid	37
	Missing	0
Mean		1.59
Std. Error of Mean		.082
Median		2.00
Mode		2
Std. Deviation		.498
Variance		.248
Range		1
Minimum		1
Maximum		2
Sum		59

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

#### JENIS KELAMIN<sup>a</sup>

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid LAKI-LAKI	15	40.5	40.5	40.5
PEREMPUAN	22	59.5	59.5	100.0
Total	37	100.0	100.0	

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

## KATEGORI STUNTING = STUNTING

Statistics<sup>a</sup>

JENIS KELAMIN

N	Valid	21
	Missing	0
Mean		1.62
Std. Error of Mean		.109
Median		2.00
Mode		2
Std. Deviation		.498
Variance		.248
Range		1
Minimum		1
Maximum		2
Sum		34

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

JENIS KELAMIN<sup>a</sup>

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	8	38.1	38.1	38.1
	PEREMPUAN	13	61.9	61.9	100.0
	Total	21	100.0	100.0	

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

## KATEGORI STUNTING = NORMAL

Statistics<sup>a</sup>

UMUR DALAM BULAN

N	Valid	37
	Missing	0
Mean		17.46
Std. Error of Mean		.627
Median		18.00
Mode		12
Std. Deviation		3.812
Variance		14.533
Range		12
Minimum		12
Maximum		24
Sum		646

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

## KATEGORI STUNTING = STUNTING

Statistics<sup>a</sup>

UMUR DALAM BULAN

N	Valid	21
	Missing	0
Mean		18.90
Std. Error of Mean		.686
Median		19.00
Mode		20
Std. Deviation		3.145
Variance		9.890
Range		11
Minimum		13
Maximum		24
Sum		397

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

## KATEGORI STUNTING = NORMAL

### Statistics<sup>a</sup>

Z-SCORE PB/U

N	Valid	37
	Missing	0
Mean		-.4924
Std. Error of Mean		.18705
Median		-.7900
Mode		-1.23
Std. Deviation		1.13781
Variance		1.295
Range		4.82
Minimum		-1.82
Maximum		3.00
Sum		-18.22

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

## KATEGORI STUNTING = STUNTING

### Statistics<sup>a</sup>

Z-SCORE PB/U

N	Valid	21
	Missing	0
Mean		-2.6067
Std. Error of Mean		.10301
Median		-2.4300
Mode		-2.42
Std. Deviation		.47206
Variance		.223
Range		1.60
Minimum		-3.64
Maximum		-2.04
Sum		-54.74

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

## KATEGORI STUNTING = NORMAL

Statistics<sup>a</sup>

### KATEGORI DIARE

N	Valid	37
	Missing	0
Mean		.03
Std. Error of Mean		.027
Median		.00
Mode		0
Std. Deviation		.164
Variance		.027
Range		1
Minimum		0
Maximum		1
Sum		1

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

### KATEGORI DIARE<sup>a</sup>

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NORMAL	36	97.3	97.3	97.3
	DIARE	1	2.7	2.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

## KATEGORI STUNTING = STUNTING

Statistics<sup>a</sup>

### KATEGORI DIARE

N	Valid	21
	Missing	0
Mean		.10
Std. Error of Mean		.066
Median		.00
Mode		0
Std. Deviation		.301
Variance		.090
Range		1
Minimum		0
Maximum		1
Sum		2

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

### KATEGORI DIARE<sup>a</sup>

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NORMAL	19	90.5	90.5	90.5
	DIARE	2	9.5	9.5	100.0
	Total	21	100.0	100.0	

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

## KATEGORI STUNTING = NORMAL

Statistics<sup>a</sup>

KATEGORI ISPA

N	Valid	37
	Missing	0
Mean		.14
Std. Error of Mean		.057
Median		.00
Mode		0
Std. Deviation		.347
Variance		.120
Range		1
Minimum		0
Maximum		1
Sum		5

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

KATEGORI ISPA<sup>a</sup>

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NORMAL	32	86.5	86.5	86.5
	ISPA	5	13.5	13.5	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

## KATEGORI STUNTING = STUNTING

Statistics<sup>a</sup>

KATEGORI ISPA

N	Valid	21
	Missing	0
Mean		.24
Std. Error of Mean		.095
Median		.00
Mode		0
Std. Deviation		.436
Variance		.190
Range		1
Minimum		0
Maximum		1
Sum		5

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

KATEGORI ISPA<sup>a</sup>

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NORMAL	16	76.2	76.2	76.2
	ISPA	5	23.8	23.8	100.0
	Total	21	100.0	100.0	

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

## KATEGORI STUNTING = NORMAL

### Statistics<sup>a</sup>

BERAT BADAN LAHIR

N	Valid	37
	Missing	0
Mean		3.1946
Std. Error of Mean		.08351
Median		3.2000
Mode		3.50
Std. Deviation		.50796
Variance		.258
Range		2.25
Minimum		1.80
Maximum		4.05
Sum		118.20

a. KATEGORI STUNTING = NORMAL

## KATEGORI STUNTING = STUNTING

### Statistics<sup>a</sup>

BERAT BADAN LAHIR

N	Valid	21
	Missing	0
Mean		3.0143
Std. Error of Mean		.07288
Median		3.0000
Mode		2.80
Std. Deviation		.33397
Variance		.112
Range		1.10
Minimum		2.50
Maximum		3.60
Sum		63.30

a. KATEGORI STUNTING = STUNTING

Kadar seng rambut dengan kategori stunting

### KATEGORI STUNTING = NORMAL

Statistics<sup>b</sup>

KADAR SENG RAMBUT

N	Valid	37
	Missing	0
Mean		198.7708
Std. Error of Mean		7.69966
Median		193.2200
Mode		187.35 <sup>a</sup>
Std. Deviation		46.83522
Variance		2193.538
Range		157.36
Minimum		121.34
Maximum		278.70
Sum		7354.52

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

b. KATEGORI STUNTING = NORMAL

## KATEGORI STUNTING = STUNTING

### Statistics<sup>b</sup>

#### KADAR SENG RAMBUT

N	Valid	21
	Missing	0
Mean		198.3148
Std. Error of Mean		12.14700
Median		182.3000
Mode		140.13 <sup>a</sup>
Std. Deviation		55.66455
Variance		3098.542
Range		239.75
Minimum		134.65
Maximum		374.40
Sum		4164.61

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

b. KATEGORI STUNTING = STUNTING

#### Pearson Hubungan kadar seng rambut dengan z-score PB/U

##### Correlations

		KADAR SENG RAMBUT	Z-SCORE PB/U
KADAR SENG RAMBUT	Pearson Correlation	1	-.069
	Sig. (2-tailed)		.607
	N	58	58
Z-SCORE PB/U	Pearson Correlation	-.069	1
	Sig. (2-tailed)	.607	
	N	58	58

Hubungan berat badan lahir dengan z-score PB/U

**Correlations**

		BERAT BADAN LAHIR	Z-SCORE PB/U
BERAT BADAN LAHIR	Pearson Correlation	1	.210
	Sig. (2-tailed)		.114
	N	58	58
Z-SCORE PB/U	Pearson Correlation	.210	1
	Sig. (2-tailed)	.114	
	N	58	58