

POTENSI YOGURT TANPA LEMAK DENGAN
PENAMBAHAN TEPUNG PISANG DAN TEPUNG GEMBILI
SEBAGAI ALTERNATIF MENURUNKAN KOLESTEROL

Artikel Penelitian

disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
pada Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro



disusun oleh :

RUTH KARLINA

22030110141022

PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel penelitian dengan judul “Potensi Yogurt Tanpa Lemak dengan Penambahan Tepung Pisang dan Tepung Gembili sebagai Alternatif Menurunkan Kolesterol” telah dipertahankan di hadapan reviewer dan telah direvisi.

Mahasiswa yang mengajukan

Nama	: Ruth Karlina
NIM	: 22030110141022
Fakultas	: Kedokteran
Program Studi	: Ilmu Gizi
Universitas	: Diponegoro Semarang
Judul Proposal	: Potensi Yogurt Tanpa Lemak dengan Penambahan Tepung Pisang dan Tepung Gembili sebagai Alternatif Menurunkan Kolesterol.

Semarang, 21 Februari 2014

Pembimbing,

Arintina Rahayuni, STP, MPd.

NIP. 19650912 198803 200

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
ABSTRAK	vi
PENDAHULUAN	1
METODE	3
HASIL	4
PEMBAHASAN	7
SIMPULAN	14
SARAN	15
UCAPAN TERIMAKASIH.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil analisis kadar lemak yogurt sinbiotik tanpa lemak.....	4
Tabel 2. Hasil analisis kadar serat yogurt sinbiotik tanpa lemak.....	5
Tabel 3. Hasil analisis total BAL yogurt sinbiotik tanpa lemak	5
Tabel 4. Hasil analisis viskositas yogurt sinbiotik tanpa lemak	6
Tabel 5. Hasil analisis pH yogurt sinbiotik tanpa lemak	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur pembuatan yogurt sinbiotik tanpa lemak	22
Lampiran 2. Formulasi bahan pembuatan yogurt sinbiotik tanpa lemak....	22
Lampiran 3. Hasil uji statistik normalitas zat gizi yogurt sinbiotik tanpa lemak	23
Lampiran 4. Hasil uji kadar lemak yogurt sinbiotik tanpa lemak	23
Lampiran 5. Hasil uji statistik kadar lemak yogurt sinbiotik tanpa lemak..	24
Lampiran 6. Hasil uji kadar serat yogurt sinbiotik tanpa lemak	25
Lampiran 7. Hasil uji statistik kadar serat yogurt sinbiotik tanpa lemak....	26
Lampiran 8. Hasil uji total BAL yogurt sinbiotik tanpa lemak.....	29
Lampiran 9. Hasil uji statistik total BAL yogurt sinbiotik tanpa lemak	30
Lampiran 10. Hasil uji warna yogurt sinbiotik tanpa lemak.....	33
Lampiran 11. Hasil uji viskositas yogurt sinbiotik tanpa lemak.....	34
Lampiran 12. Hasil uji statistik viskositas yogurt sinbiotik tanpa lemak ...	35
Lampiran 13. Hasil uji pH yogurt sinbiotik tanpa lemak.....	38
Lampiran 14. Hasil uji statistik pH yogurt sinbiotik tanpa lemak	39

The Potential of Non-Fat Yogurt with Addition of Plantain and Lesser Yam Flour as Alternative to Lower Cholesterol

Ruth Karlina* Arintina Rahayuni **

ABSTRACT

Background : Hypercholesterolemia is one of the risk factor for cardiovascular disease, which becomes as one of the main cause of death in the world. Yogurt is a fermented milk product, produced by lactic acid bacteria and has been proved to lower cholesterol. The addition of prebiotic, like FOS and inulin into probiotic can support hypocholesterolemic effect on yogurt. Plantain (*Musa paradisiaca* fa. *Corniculata*) contains a high FOS, whereas lesser yam (*Dioscorea esculenta*) high in inulin.

Objective : To analyze the effect of the addition of plantain and lesser yam flour in the production of nonfat yogurt on the fat content, fiber content, total of lactic acid bacteria (LAB), propionic acid levels, as well as physical characteristic, defined as color, viscosity, and pH.

Methods : A randomized experimental design using two variations of the addition of flour (N_1 and N_2), i.e. 16.5 g plantain flour (containing 1% of FOS) and 13.5 g of lesser yam flour (containing 2% of inulin) and 1 control (N_0). Statistical analysis of fat content, fiber, total of LAB, viscosity, and pH analyzed using the Kruskal-Wallis test, with 99% CI, and post hoc test using Mann-Whitney afterwards. Propionic acid level tests and colors are just described.

Results : The treatment in both groups gives out a significant influence on the fiber content ($N_1 = 0.026\%$, $N_2 = 0.078\%$), total of LAB ($N_1 = 6.86 \times 10^8$ cfu/ml, $N_2 = 7.04 \times 10^7$ cfu/ml), viscosity ($N_1 = 230.083$ cP, $N_2 = 9.752$ cP), and pH ($N_1 = 4.873$, $N_2 = 5.72$). N_1 group has the highest levels of propionic acid, which is equal to 569.96 ppm and has yellowish orange as the color, while the N_2 has a 52.51 ppm propionic acid levels and colored orangish pink.

Conclusion : The addition of plantain and lesser yam flours doesn't generate a significant effect on fat content, but the addition of plantain flour in of yogurt has the best potential to lower cholesterol, because it has the lowest fat content, the highest total of LAB and propionic acid levels, and the most optimal pH.

Keywords : yogurt, prebiotic, fructooligosaccharide, inulin, cholesterol.

*Student of Nutrition Science Study Program, Medical Faculty of Diponegoro University Semarang.

** Lecturer of Nutrition Science Study Program, Medical Faculty of Diponegoro University Semarang.

Potensi Yogurt Tanpa Lemak dengan Penambahan Tepung Pisang dan Tepung Gembili sebagai Alternatif Menurunkan Kolesterol

Ruth Karlina* Arintina Rahayuni **

ABSTRAK

Latar Belakang : Hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskuler, yang menjadi penyebab utama kematian di dunia. Yogurt merupakan susu yang difermentasi bakteri asam laktat, dan telah terbukti dapat menurunkan kolesterol. Penambahan prebiotik, seperti FOS dan inulin pada probiotik dapat menunjang efek hipokolesterolemi yogurt. Pisang tanduk (*Musa paradisiaca fa. corniculata*) merupakan bahan makanan tinggi FOS, sedangkan gembili (*Dioscorea esculenta*) mengandung tinggi inulin.

Tujuan : Menganalisis pengaruh penambahan tepung pisang dan tepung gembili dalam pembuatan yogurt tanpa lemak terhadap kadar lemak, kadar serat, total BAL, kadar asam propionat, serta karakteristik fisik berupa warna, viskositas, dan pH .

Metode : Penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap menggunakan 2 variasi penambahan tepung (N_1 dan N_2), yaitu 16.5 g tepung pisang (mengandung 1% FOS) dan 13.5 g tepung gembili (mengandung 2% inulin), serta 1 kontrol (N_0). Analisis statistik kadar lemak, serat, total bakteri asam laktat, viskositas, dan pH menggunakan uji *Kruskal-Wallis* CI 99% dengan uji lanjut *Mann-Whitney*. Uji kadar asam propionat dan warna hanya dideskripsikan.

Hasil : Perlakuan pada kedua kelompok, memberikan pengaruh yang signifikan pada kadar serat ($N_1 = 0.026\%$, $N_2 = 0.078\%$), total BAL ($N_1 = 6.86 \times 10^8$ cfu/ml, $N_2 = 7.04 \times 10^7$ cfu/ml), viskositas ($N_1 = 230.083$ cP, $N_2 = 9.752$ cP), dan pH ($N_1 = 4.873$, $N_2 = 5.72$). Kelompok N_1 memiliki kadar asam propionat tertinggi, yakni sebesar 569.96 ppm dan berwarna *yellowish orange*, sedangkan N_2 memiliki kadar asam propionat 52.51 ppm, serta berwarna *orangish pink* .

Simpulan : Penambahan tepung pisang dan tepung gembili tidak berpengaruh secara signifikan pada kadar lemak, namun penambahan tepung pisang pada yogurt memiliki potensi terbaik untuk menurunkan kolesterol, karena memiliki kadar lemak terendah, total BAL dan kadar asam propionat tertinggi, serta pH paling mendekati pH optimal.

Kata Kunci : yogurt, prebiotik, fruktooligosakarida, inulin, kolesterol.

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

** Dosen Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

PENDAHULUAN

Menurut WHO, penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab utama kematian di dunia. Pada tahun 2004 terdapat sekitar 17.1 juta orang di dunia meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Prediksi WHO di tahun 2030, penyakit kardiovaskuler dapat menyebabkan kematian sekitar 23.6 juta orang di dunia.¹ Faktor risiko utama terjadinya penyakit kardiovaskuler adalah tingginya kadar kolesterol darah (hiperkolesterolemia), yang dapat menyebabkan pembentukan plak di dinding pembuluh darah (aterosklerosis) dan menyebabkan risiko serangan jantung tiga kali lebih besar. Penurunan 1% kolesterol darah dapat mengurangi 2-3% risiko penyakit jantung koroner (sumbatan di pembuluh koroner jantung).²

Prinsip penggunaan bakteri asam laktat, telah lama dipercaya sebagai cara alami untuk menurunkan kadar kolesterol darah pada manusia.³ Yogurt merupakan salah satu produk olahan susu yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan.⁴ *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* merupakan dua jenis bakteri standar yang digunakan dalam pembuatan yogurt.⁵ Penggunaan susu tanpa lemak sebagai bahan dasar pembuatan yogurt akan meminimalkan kadar lemak pada hasil akhir.

Umumnya yogurt yang dijual di pasaran merupakan yogurt probiotik. Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang bila dalam jumlah yang cukup dapat memberikan efek kesehatan bagi tubuh.⁶ Salah satu efek kesehatannya dapat menurunkan kolesterol. Di sisi lain, terdapat jenis yogurt sinbiotik, yakni yogurt probiotik dengan tambahan prebiotik.⁷ Prebiotik merupakan bahan makanan terfermentasi secara selektif yang memberikan perubahan spesifik, baik pada komposisi dan/atau aktivitas mikrobiota gastrointestinal, yang memberi keuntungan terhadap keadaan dan kesehatan tubuh.⁸ Penelitian pada hewan menunjukkan

penurunan kolesterol dan/atau trigliserida sehubungan dengan konsumsi prebiotik.^{9,10} Prebiotik mengurangi absorpsi kolesterol dengan memacu ekskresinya melalui feses, dan memproduksi asam lemak rantai pendek (*short-chain fatty acids/SCFAs*), terutama asam propionat yang dapat menghambat sintesis asam lemak dan kolesterol di hati, sehingga menurunkan kadar kolesterol darah.¹¹⁻¹³ Di samping itu, bukti percobaan pada manusia, hewan, dan *in vitro* membuktikan bahwa prebiotik dapat meningkatkan jumlah mikroflora usus, seperti *Lactobacilli*.⁸

Frukto-oligosakarida (FOS) dan inulin merupakan jenis prebiotik yang banyak diteliti sehubungan dengan manfaat kesehatan. FOS termasuk golongan oligosakarida tak tercerna, sehingga digolongkan sebagai serat pangan. Di Indonesia, sumber FOS yang relatif tinggi dan mudah ditemui adalah pisang. Secara umum, terkandung 2mg/g FOS pisang matang.¹⁴ Penambahan 1% FOS pada yogurt dapat meningkatkan jumlah bakteri asam laktat (*Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus acidophilus*, dan *Bifidobacterium* sp.).¹⁵

Selain FOS, inulin juga termasuk serat pangan larut air, yang difermentasi di usus menghasilkan SCFAs.¹⁶ Sebagai fungsi serat, inulin mengurangi absorpsi lemak dan mengurangi kadar kolesterol darah.^{17,18} Bahan makanan tinggi inulin yang produksinya melimpah di Indonesia adalah umbi gembili (*Dioscorea esculenta*). Dibandingkan dengan semua jenis umbi, gembili memiliki kadar inulin tertinggi, dengan 14.77% berat keringnya.¹⁹ Pemberian 18g inulin per hari pada pria dan wanita hiperkolesterolemia, dapat menurunkan kadar total kolesterol darah secara signifikan, sebanyak 8.7%.²⁰ Penambahan 2% inulin dalam yogurt sinbiotik yang mengandung *L. acidophilus* dan *L. casei* dapat meningkatkan bakteri probiotik dan kualitas organoleptik.^{21,22}

Yogurt tanpa lemak dengan penambahan prebiotik dapat menjadi pangan alternatif yang berpotensi menurunkan kolesterol. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis pengaruh penambahan tepung

pisang dan tepung gembili dalam pembuatan yogurt tanpa lemak terhadap kadar lemak, kadar serat, total BAL, kadar asam propionat, serta karakteristik fisik berupa warna, viskositas, dan pH.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian di bidang produksi makanan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap menggunakan penambahan dua jenis prebiotik, tepung pisang sebagai sumber FOS (perlakuan 1) dan tepung gembili sebagai sumber inulin (perlakuan 2) dan satu kontrol (tanpa penambahan prebiotik) ($t = 3$), yang disimbolkan dengan N_1 , N_2 , dan N_0 . Setiap kelompok perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali.

Subjek dalam penelitian ini adalah yogurt sinbiotik tanpa lemak yang terbuat dari fermentasi susu skim/tanpa lemak sebagai bahan utama, oleh *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus*, dengan penambahan 16.5 g tepung pisang sebagai sumber FOS dan 13.5 g tepung gembili sebagai sumber inulin. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan yogurt sinbiotik tanpa lemak adalah susu skim/tanpa lemak segar, susu bubuk skim, inokulum murni *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* dari Laboratorium Bioteknologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tepung pisang dan tepung gembili yang dibuat oleh peneliti.

Tepung pisang dibuat dari pisang tanduk (*Musa paradisiaca* fa. *corniculata*) dan tepung gembili dibuat dari umbi gembili (*Dioscorea esculenta*). Pembuatan tepung menggunakan prinsip perendaman dalam larutan natrium metabisulfit selama 10 menit, pengeringan menggunakan oven, dihaluskan, dan diayak melewati ayakan 80 mesh. Pada penelitian pendahuluan, dilakukan uji kadar FOS pada tepung pisang, dengan

menggunakan HPLC, yang dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Proses fermentasi yogurt oleh *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* dilakukan selama 12 jam pada suhu 43°C, setelah dilakukan pasteurisasi selama 10 menit pada suhu 90°C.

Uji kadar lemak, kadar serat, total bakteri asam laktat, kadar asam propionat, warna, viskositas, dan pH. Kadar lemak diukur menggunakan metode *Majonnier*,⁴ kadar serat menggunakan metode gravimetri, total bakteri asam laktat menggunakan TPC (*Total Plate Count*) dengan media MRS (*De Man Rogosa and Sharpe*),⁴ dan kadar asam propionat menggunakan HPLC. Untuk mengetahui karakteristik fisik, berupa uji warna dapat dilakukan dengan alat kromameter, konsistensi dengan *viscotester*, dan untuk mengetahui pH dengan pH meter. Analisis kadar lemak dan serat dilakukan di Laboratorium Pangan dan Gizi, uji total bakteri asam laktat dilakukan di Laboratorium Bioteknologi, dan uji warna, viskositas, serta pH diuji di Laboratorium Rekayasa Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Uji kadar asam propionat dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengaruh penambahan prebiotik terhadap kadar asam propionat dan karakteristik fisik (warna, viskositas, dan pH) hanya dideskripsikan, sedangkan kadar lemak, kadar serat, dan total bakteri asam laktat, diolah menggunakan uji statistik *Kruskal-Wallis*, karena data berdistribusi tidak normal. Uji dilakukan dengan derajat kepercayaan 99%, dan dilanjutkan dengan uji *posthoc Mann-Whitney* untuk mengetahui beda nyata antar kelompok perlakuan dan kontrol.

HASIL

1. Kadar Lemak

Kadar lemak yogurt diukur dengan menggunakan metode *Majonnier*. Yogurt pada kelompok kontrol memiliki nilai rata-rata kadar lemak tertinggi, sedangkan yogurt dengan penambahan tepung pisang memiliki nilai rata-rata kadar lemak terendah. Hasil uji statistik *Kruskal-Wallis* menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penambahan prebiotik terhadap kadar lemak yogurt sinbiotik tanpa lemak (Lampiran 3).

Tabel 1. Hasil Analisis Kadar Lemak Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Kadar Lemak (%)
N ₀ (kontrol)	0.48 ± 0.07
N ₁ (penambahan tepung pisang)	0.41 ± 0.032
N ₂ (penambahan tepung gembili)	0.42 ± 0.04
P = 0.142	

Uji *Kruskal-Wallis*. Uji post-hoc *Mann Whitney*; N₀ memiliki perbedaan bermakna dengan N₁ dan N₂; N₁ memiliki perbedaan bermakna dengan kelompok perlakuan N₂.

2. Kadar Serat

Kadar serat yogurt sinbiotik tanpa lemak diukur dengan menggunakan metode gravimetri. Yogurt pada kelompok kontrol memiliki nilai rata-rata kadar serat terendah, sedangkan yogurt dengan penambahan tepung gembili memiliki nilai rata-rata kadar serat tertinggi. Hasil uji statistik *Kruskal-Wallis* menyatakan ada pengaruh penambahan prebiotik terhadap kadar serat yogurt sinbiotik tanpa lemak (Lampiran 5).

Tabel 2. Hasil Analisis Kadar Serat Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Kadar Serat (%)
N ₀ (kontrol)	0 ± 0
N ₁ (penambahan tepung pisang)	0.03 ± 0.02
N ₂ (penambahan tepung gembili)	0.08 ± 0.01

P = 0.000

Uji *Kruskal-Wallis*. Uji post-hoc *Mann Whitney*; N₀ memiliki perbedaan bermakna dengan N₁ dan N₂; N₁ memiliki perbedaan bermakna dengan kelompok perlakuan N₂.

3. Total Bakteri Asam Laktat (BAL)

Total bakteri asam laktat diukur dengan menggunakan *total plate count*. Yogurt pada kelompok dengan penambahan tepung pisang memiliki nilai rata-rata total BAL tertinggi, sedangkan yogurt pada kelompok kontrol memiliki nilai rata-rata total BAL terendah. Hasil uji statistik *Kruskal-Wallis* menyatakan ada pengaruh penambahan prebiotik terhadap total bakteri asam laktat yogurt sinbiotik tanpa lemak (Lampiran 7).

Tabel 3. Hasil Analisis Total BAL Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Total BAL (cfu/ml)
N ₀ (kontrol)	$1.22 \pm 5.11 \times 10^7$
N ₁ (penambahan tepung pisang)	$0.69 \pm 2.97 \times 10^9$
N ₂ (penambahan tepung gembili)	$0.7 \pm 6.52 \times 10^8$

P = 0.001

Uji *Kruskal-Wallis*. Uji post-hoc *Mann Whitney*; N₀ memiliki perbedaan bermakna dengan N₁ dan N₂; N₁ memiliki perbedaan bermakna dengan kelompok perlakuan N₂.

4. Kadar Asam Propionat

Data kadar asam propionat diukur dengan menggunakan HPLC. Yogurt pada kelompok kontrol memiliki kadar asam propionat terendah, yaitu <2.6 ppm. Yogurt dengan penambahan tepung pisang memiliki kadar asam propionat tertinggi, yaitu 569.96 ppm, sedangkan pada kelompok perlakuan dengan penambahan tepung gembili diperoleh hasil 52.51 ppm.

5. Karakteristik Fisik

a. Warna

Uji warna menggunakan alat kromameter, kemudian hasil diinterpretasikan ke dalam warna menggunakan *CIE Chromaticity Diagram* (Lampiran 10). Yogurt pada kelompok kontrol memiliki warna *white light*, pada kelompok dengan penambahan tepung gembili berwarna *orangish pink*, dan pada kelompok dengan penambahan tepung pisang berwarna *yellowish orange*.

b. Viskositas

Hasil uji viskositas diperoleh dengan menggunakan alat *viscotester*. Semakin besar hasil keluaran uji, semakin besar tingkat kekentalan yogurt tersebut. Yogurt pada kelompok kontrol memiliki nilai rata-rata viskositas terendah, sedangkan yogurt dengan penambahan tepung pisang memiliki nilai rata-rata viskositas tertinggi. Hasil uji statistik *Kruskal-Wallis* menyatakan ada pengaruh penambahan prebiotik terhadap viskositas yogurt sinbiotik tanpa lemak (Lampiran 10).

Tabel 4. Hasil Analisis Viskositas Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Viskositas (cP)
N ₀ (kontrol)	7.01 ± 1.48
N ₁ (penambahan tepung pisang)	230.08 ± 15.21
N ₂ (penambahan tepung gembili)	9.75 ± 0.73
P = 0.000	

Uji *Kruskal-Wallis*. Uji post-hoc *Mann Whitney*; N₀ memiliki perbedaan bermakna dengan N₁ dan N₂; N₁ memiliki perbedaan bermakna dengan kelompok perlakuan N₂.

c. pH

Data hasil pengukuran menggunakan pHmeter menunjukkan yogurt pada kelompok kontrol memiliki nilai

rata-rata pH terendah. Yogurt dengan penambahan tepung gembili memiliki nilai rata-rata pH tertinggi. Hasil uji statistik *Kruskal-Wallis* menyatakan ada pengaruh penambahan prebiotik terhadap pH yogurt sinbiotik tanpa lemak (Lampiran 13).

Tabel 5. Hasil Analisis pH Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	pH
N ₀ (kontrol)	4.23 ± 0
N ₁ (penambahan tepung pisang)	4.87 ± 0.12
N ₂ (penambahan tepung gembili)	5.72 ± 0.5
P = 0.000	

Uji *Kruskal-Wallis*. Uji post-hoc *Mann Whitney*; N₀ memiliki perbedaan bermakna dengan N₁ dan N₂; N₁ memiliki perbedaan bermakna dengan kelompok perlakuan N₂.

PEMBAHASAN

1. Kadar Lemak

Yogurt bersifat hipokolesterolemik, dan jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu dapat menurunkan kadar kolesterol pada serum darah manusia. Kadar lemak yang rendah dalam yogurt dengan penggunaan susu tanpa lemak, sehingga dapat menunjang sifat hipokolesterolemik.²³

SNI membedakan jenis yogurt, salah satunya berdasarkan kadar lemak yang terkandung di dalamnya. Yogurt tanpa lemak (*non fat*) seharusnya memiliki kadar lemak susu kurang dari 0.5%.⁴ Data yang diperoleh dalam penelitian, menyatakan bahwa yogurt pada kelompok kontrol dan perlakuan memiliki kadar lemak di bawah 0.5%. Semua kelompok yogurt memenuhi syarat kadar lemak SNI untuk yogurt tanpa lemak.

Susu segar tanpa lemak dan susu bubuk skim yang dijadikan bahan utama pembuatan yogurt, dapat menghasilkan kadar lemak pada produk akhir di bawah 0.5%. Penambahan tepung pisang dan tepung gembili tidak mempengaruhi kadar lemak yogurt. Kadar lemak terendah terdapat pada kelompok dengan penambahan tepung pisang, yakni sebesar 0.41%. Kadar lemak tertinggi terdapat pada kelompok kontrol, yakni sebesar 0.48%, namun perbedaan antar kelompok perlakuan dan kontrol tidak signifikan. Penambahan tepung pisang dan tepung gembili menambah volume yogurt yang dihasilkan dibandingkan dengan yogurt pada kelompok kontrol. Hal tersebut memungkinkan konsentrasi lemak per ml sampel yang dianalisis pada kelompok perlakuan menjadi lebih sedikit dibandingkan kelompok kontrol yang lebih pekat.

2. Kadar Serat

Penentuan kadar serat pada penelitian ini menggunakan metode gravimetri, yakni dengan prinsip degradasi asam basa. Gravimetri memiliki kelemahan, yaitu memerlukan waktu yang relatif lama dan hanya dapat digunakan untuk mengukur kadar pada komponen yang cukup besar, terutama serat kasar. FOS dan inulin merupakan serat pangan yang tergolong dalam serat larut air. Penentuan kadar serat larut air lebih sensitif jika menggunakan analisis dengan prinsip enzimatis,²⁴ namun karena keterbatasan biaya, maka dalam penelitian ini menggunakan metode gravimetri yang lebih murah.

Penggunaan metode gravimetri menyebabkan kadar serat yang dihitung hanya terdeteksi dalam jumlah kecil pada kelompok dengan penambahan prebiotik, bahkan 0% pada yogurt kelompok kontrol. Data penelitian menunjukkan, yogurt dengan penambahan tepung gembili memiliki kadar serat tertinggi, yakni sejumlah

0.08%, sedangkan kelompok sampel dengan penambahan tepung pisang memiliki kadar serat sebesar 0.03%. Berdasarkan penelitian pendahuluan, tepung pisang tanduk (*Musa paradisiaca* fa. *corniculata*) yang digunakan dalam penelitian, memiliki kadar FOS sebesar 6.08%. Kadar inulin yang terkandung dalam tepung gembili sebesar 14.77%.²⁵ Perbedaan kadar prebiotik yang terkandung dalam masing-masing tepung mempengaruhi hasil analisis secara statistik, sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan baik antar kelompok perlakuan dan kontrol, maupun antar kelompok perlakuan.

FOS yang terkandung dalam tepung pisang dan inulin yang terkandung dalam tepung gembili tidak hanya memiliki fungsi serat sebagai agen hipokolesterol, namun juga berfungsi sebagai prebiotik di kolon. Adanya prebiotik dapat meningkatkan jumlah mikroflora usus, melalui mekanisme fermentasi dan menciptakan suasana asam yang menjadi faktor penunjang pertumbuhan mikroflora.²⁶

3. Total Bakteri Asam Laktat (BAL)

Jumlah bakteri asam laktat (BAL) yang dihitung dalam penelitian ini, terdiri dari *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus*. Banyaknya BAL yang terkandung dalam yogurt dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komponen media tumbuh, suhu saat inokulasi, lama fermentasi, lama penyimpanan, suhu penyimpanan, kandungan nutrisi substrat, dan pH. BAL memerlukan beberapa zat gizi untuk tumbuh, terutama sumber nitrogen. Sumber nitrogen umumnya diperoleh dari asam amino atau peptida yang dihasilkan dari proses proteolisis.²⁷ Tepung pisang mengandung 3.8 – 4.1 % protein,²⁸ sedangkan gembili mengandung 7.4% protein.²⁹ Oleh karena itu, total BAL pada kelompok perlakuan lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol.

Di sisi lain, penambahan FOS dan inulin pada yogurt juga dapat meningkatkan jumlah BAL dibandingkan yogurt pada kelompok kontrol.³⁰ Penambahan 1% FOS pada yogurt dapat meningkatkan jumlah bakteri asam laktat, sedangkan penambahan 2 dan 3% FOS secara signifikan mengurangi jumlah bakteri asam laktat selama penyimpanan dingin.^{31, 32} Penambahan 2% inulin dalam yogurt, menghasilkan hasil organoleptik yang paling disukai panelis dan dapat meningkatkan bakteri probiotik.³³ Pada penelitian ini, jumlah BAL paling banyak ditemukan pada yogurt dengan penambahan tepung pisang (sumber FOS). Terdapat perbedaan yang signifikan, baik antar kelompok perlakuan, maupun antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.

Masing-masing kultur yang digunakan untuk proses fermentasi yogurt memiliki suhu dan pH optimum, yang akan menentukan pertumbuhan bakteri tersebut. Saat kedua bakteri difermentasikan bersama, *Lactobacillus bulgaricus* memulai fermentasi terlebih dahulu, dan memproduksi asam amino yang mendukung pertumbuhan *Streptococcus thermophilus*, kemudian bakteri ini akan melanjutkan fermentasi dengan cepat untuk memproduksi asam laktat dari laktosa hingga pH mencapai sekitar 5.0. Sejalan dengan pertumbuhannya, bakteri ini melepaskan substansi (karbondioksida dan asam format) yang menunjang pertumbuhan *Lactobacillus bulgaricus*. Peningkatan jumlah *Lactobacillus bulgaricus* menyebabkan penurunan pH. Pertumbuhan *Streptococcus thermophilus* semakin menurun karena lebih tidak tahan terhadap asam.³⁴ *Lactobacillus bulgaricus* akan tumbuh optimal pada suhu 42-45°C dan pH berkisar antara 5.4 – 4.6, dengan produksi asam laktat 1.5 – 4%. *Streptococcus thermophilus* akan tumbuh optimal pada suhu 45°C dan berhenti tumbuh pada pH 4.2, dengan produksi asam laktat 0.8 – 1%.^{35, 36}

SNI menetapkan jumlah BAL minimal pada yogurt adalah 10^7 cfu/ml.⁴ Semua kelompok yogurt, baik kontrol dan perlakuan memenuhi syarat minimal total BAL SNI. Total BAL terendah terdapat pada yogurt kelompok kontrol, yakni sebesar 1.22×10^7 cfu/ml dan total BAL terbanyak terdapat pada kelompok yogurt dengan penambahan tepung pisang, yaitu sebesar 6.87×10^8 cfu/ml. Kelompok yogurt dengan penambahan tepung gembili memiliki total BAL 7.04×10^7 cfu/ml.

Keberadaan prebiotik dapat memperbaiki mikroflora usus, dengan meningkatkan pertumbuhan probiotik.³⁷ Penurunan kadar kolesterol oleh adanya probiotik, dapat melalui beberapa mekanisme. Dekonjugasi asam empedu oleh enzim *Bile-Salt Hydrolase* (BSH) yang dihasilkan probiotik, sehingga asam empedu kurang larut dan kurang diserap di saluran cerna, dan dieliminasi melalui feses. Pada respon homeostasis, kolesterol digunakan untuk sintesis asam empedu baru, sehingga menurunkan kadar kolesterol. Efek hipokolesterolemi juga dapat melalui asimilasi kolesterol dan membran sel probiotik selama pertumbuhan. Kolesterol juga dapat dikonversi menjadi koprostanol oleh probiotik, yang secara langsung diekskresikan feses.³⁸

4. Kadar Asam Propionat

FOS dan inulin sebagai prebiotik, selain untuk meningkatkan pertumbuhan probiotik, juga untuk memproduksi asam lemak rantai pendek (SCFA/*short-chain fatty acid*). Asam propionat merupakan salah satu SCFA hasil fermentasi prebiotik yang dimetabolisme di hati. Asam propionat dapat menurunkan konsentrasi kolesterol darah, dengan mencegah kolesterologenesis hepatic (sintesis kolesterol di hati).^{39, 40}

Sebuah penelitian menyatakan, FOS menghasilkan total SCFA tertinggi saat terfermentasi di saluran cerna manusia, dibanding dengan galaktooligosakarida (GOS), mananoligosakarida (MOS), dan chitooligosakarida (COS).⁴¹ Penelitian lain mengatakan, SCFA yang paling banyak dihasilkan dari proses fermentasi inulin umbi gembili adalah asam asetat, propionat dan butirat. Hal ini terjadi karena terjadi pemecahan polisakarida, yang kemudian dihidrolisis lebih lanjut.⁴² Hasil penelitian menyatakan, yogurt dengan penambahan tepung pisang (FOS) memiliki kadar asam propionat tertinggi, yaitu 569.96 ppm. Yogurt dengan penambahan tepung gembili (inulin) memiliki kadar asam propionat 52.51 ppm, sedangkan kelompok kontrol memiliki kadar asam propionat terendah, yaitu <2.6 ppm.

5. Karakteristik Fisik

a. Warna

Hasil uji analisis warna menunjukkan bahwa terdapat perbedaan warna antara kelompok kontrol dan perlakuan. Pada umumnya yogurt tanpa penambahan pewarna makanan tertentu akan berwarna putih. Yogurt pada kelompok kontrol memiliki warna *white light*, sedangkan pada kelompok dengan penambahan tepung pisang berwarna *yellowish orange*. Yogurt dengan penambahan tepung pisang berwarna lebih gelap. Hal tersebut terjadi karena reaksi *browning* secara enzimatis, yakni perubahan warna, sebagai hasil dari *polyphenol oxidase* (PPO) yang terpapar oksigen, kemudian teroksidasi menjadi kuinon. Kuinon terkondensasi dan bereaksi secara nonenzimatis dengan komponen fenol lain dan asam amino, sehingga menghasilkan warna kecoklatan.⁴³

Yogurt pada kelompok dengan penambahan tepung gembili berwarna *orangish* sedikit lebih gelap dibandingkan kelompok kontrol. Menurut penelitian, gembili (*Dioscorea esculenta*) mengandung α -karoten dan β -karoten. Hal tersebut memungkinkan yogurt dengan penambahan tepung gembili berwarna sedikit oranye.⁴⁴ Pada penelitian ini, belum dilakukan uji penerimaan terhadap perbedaan warna yogurt dengan penambahan tepung pisang dan tepung gembili.

b. Viskositas

Tingkat kekentalan yogurt dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bahan utama penyusun yogurt (jenis susu) dan lama penyimpanan.⁴⁵ Di samping itu, penambahan serat dapat mempengaruhi tekstur dan konsistensi produk yang dihasilkan.⁴⁶ Sebuah penelitian menunjukkan, penambahan inulin dapat membantu meningkatkan kekentalan pada produk fermentasi.⁴⁷ Konsistensi yogurt dengan penambahan FOS dan inulin meningkat selama masa penyimpanan 21 hari dalam lemari pendingin.³⁰

Hasil uji viskositas dinyatakan dalam satuan cP (*centi poise*). Semakin besar nilai yang dihasilkan, berarti sampel yang diuji semakin kental atau *viscous*, sebaliknya, jika semakin kecil nilai yang dihasilkan, sampel yang diuji semakin cair atau encer. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yogurt dengan penambahan tepung pisang memiliki nilai viskositas tertinggi, dengan nilai rata-rata sebesar 230.08 cP, sedangkan kelompok dengan penambahan tepung gembili memiliki nilai viskositas sebesar 9.75 cP.

Pisang tanduk mengandung kadar pati (37%) relatif tinggi dibanding jenis pisang lain. Sebuah penelitian menunjukkan, kadar pati yang terkandung dalam gembili

sebesar 23.25%.⁴⁸ Penambahan 3% pati pada pembuatan yogurt dapat meningkatkan viskositas secara signifikan.⁴⁹ Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gelatinisasi pati. Proses gelatinisasi pati terjadi saat air diserap ke dalam sel, sehingga terjadi pembengkakan dengan adanya pemanasan. Air di dalam sel terikat kuat oleh struktur heliks ganda, dan menyebabkan pembengkakan tersebut bersifat *irreversible*.⁵⁰

Nilai viskositas terendah berada pada kelompok kontrol, dengan nilai rata-rata sebesar 7.01 cP, yang mendekati viskositas yogurt pada umumnya. Di sisi lain, viskositas pada kelompok dengan penambahan tepung pisang terlalu kental untuk dikonsumsi, sehingga dapat dilakukan pengenceran. Pengenceran dapat dilakukan sebanyak ± 32 kali untuk mendapatkan viskositas mendekati kelompok kontrol, dengan total BAL 2.15×10^7 cfu/ml (memenuhi standar SNI untuk total BAL).

c. pH

Pada penelitian ini, tingkat keasaman yogurt dinyatakan dalam pH. Total bakteri asam laktat dan pH pada yogurt dapat saling mempengaruhi dan berkaitan. Yogurt pada umumnya memiliki pH 4.6.⁵¹ Data hasil penelitian, menunjukkan pH pada kelompok kontrol memiliki nilai terendah, yaitu sebesar 4.23. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan nutrisi yang terkandung dalam substrat.

BAL memerlukan sumber nitrogen untuk tumbuh. Sumber nitrogen umumnya diperoleh dari asam amino atau peptida yang dihasilkan dari proses proteolisis.²⁸ Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penambahan tepung pisang dan tepung gembili akan meningkatkan kadar protein dalam

substrat. Proses proteolisis oleh BAL akan menghasilkan asam amino, yang bersifat amfoterik (menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa dalam larutan asam).⁵² Oleh karena itu, yogurt pada kedua kelompok perlakuan memiliki pH lebih tinggi dan memiliki total BAL lebih banyak, karena masih dalam pH optimal pertumbuhan BAL dibandingkan dengan kelompok kontrol.

SIMPULAN

1. Kedua kelompok perlakuan memenuhi syarat kadar lemak SNI untuk yogurt tanpa lemak ($<0.5\%$). Yogurt dengan penambahan tepung pisang, memiliki kadar lemak terendah, yaitu 0.41% . Yogurt dengan penambahan tepung gembili memiliki kadar serat tertinggi, yaitu 0.08% . Yogurt dengan penambahan tepung pisang memiliki kadar asam propionat tertinggi, yaitu 569.96 ppm.
2. Kedua kelompok perlakuan memenuhi syarat total BAL SNI (minimal 10^7 cfu/ml). Yogurt dengan penambahan tepung pisang memiliki total bakteri asam laktat tertinggi, yaitu 6.87×10^8 cfu/ml, dengan pH 4.87 .
3. Yogurt dengan penambahan tepung gembili memberi warna *orangish pink*, dan pada kelompok dengan penambahan tepung pisang berwarna *yellowish orange*. Yogurt dengan penambahan tepung pisang memiliki viskositas tertinggi, yaitu 230.08 cP.

SARAN

1. Hasil penelitian merekomendasikan yogurt sinbiotik tanpa lemak dengan penambahan tepung pisang, karena memiliki potensi menurunkan kolesterol paling optimal dibandingkan kelompok kontrol dan kelompok dengan penambahan tepung gembili, yakni dengan kadar lemak terendah, total bakteri asam laktat tertinggi, kadar asam propionat tertinggi, dan berada pada pH optimal untuk pertumbuhan *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus*.
2. Melakukan uji organoleptik untuk mengetahui daya terima yogurt sinbiotik tanpa lemak.
3. Melakukan penelitian yogurt sinbiotik tanpa lemak dengan mengkombinasikan tepung pisang dan tepung gembili pada konsentrasi tertentu.
4. Melakukan pengenceran pada perlakuan dengan penambahan tepung pisang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala berkat dan karunia yang telah diberikan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Arintina Rahayuni, S.TP, M.Pd selaku pembimbing dan para penguji atas segala bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua, sahabat dan teman-teman atas dukungan dan doa, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

1. WHO. Cardiovascular disease. Fact sheet no. 317. WHO, Geneva, Switzerland 2009. Diunduh dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/print.html>.
2. Manson JE, Tosteson H, Ridker PM, Satterfield S, Herbert P, O'Connor GT, et al. The primary prevention of myocardial infarction. *The New England Journal of Medicine* 1992; 326 (21):1406-1416.
3. McNamara DJ, Lowell AM, Sabb JE. Effect of yogurt intake on plasma lipid and lipoprotein levels in normolipidemic males. *Atherosclerosis*, 1989;79: 167-171.
4. Standar Nasional Indonesia. Yogurt. ICS 67.100.10. SNI 2981:2009.
5. Food and Drug Administration. Yogurt. 21 CFR 131.200, Code of Federal Regulations. U. S. Dept. of Health and Human Services, Washington, DC. 1996.
6. Lambert JM, Bongers RS, de Vos WM, Kleerebezem M. Functional Analysis of Four Bile Salt Hydrolase and Penicillin Acylase Family Members in *Lactobacillus plantarum* WCFS1. *Appl. Environ. Microbiol.* 2008, 74, 4719-4726.
7. Schrezenmeir J, de Vrese M. Probiotics, prebiotics, and synbiotics - Approaching a definition. *Am J Clin Nutr.* 2001;73S:361S-364S.
8. Gibson GR, Probert HM, Van Loo J, Rastall RA & Roberfroid M. Dietary modulation of the human colonic microbiota: updating the concept of prebiotics. *Nutrition Research Reviews* 2004;17, 259-275.
9. Jackson KG, Taylor GRL, Clohessy AM, Williams CM. The effect of the daily intake of inulin on fasting lipid, insulin and glucose

- concentrations in middle-aged men and women. *Br J Nutr* 1999;82:23-30.
10. Vigne JL, Lairon D, Borel P, Portugal H, Pauli AM, Hauton JC, Lafont H. Effect of pectin, wheat bran and cellulose on serum lipids and lipoproteins in rats fed on a low- or high-fat diet. *Br J Nutr* 1987;58:405-413.
 11. Trautwein EA, Rieckhoff D, Erbersdobler HF. Dietary Inulin Lowers Plasma Cholesterol and Triacylglycerol and Alters Biliary Bile Acid Profile in Hamsters. *J. Nutr.* 1998; 128, 1937-1943.
 12. Delzenne NM dan Kok NN. Effects of fructans-type prebiotics on lipid metabolism. *Am. J. Clin. Nutr.*, 2001; 73, 456S–458S.
 13. Beylot M., Effects of inulin-type fructans on lipid metabolism in man and in animal models. *Br. J. Nutr.*, 2005; suppl., 1, S163–S168.
 14. Campbell JM, Bauer LL, Fahey GC, Hogarth AJCL, Wolf BW, dan Hunter DE. Selected fructooligosaccharide (1-kestose, nystose, and 1 F-fructofuranosylnystose) composition of foods and feeds. *J. Agric. Food Chem.* 1997;45:3076-3082.
 15. Bouhnik Y, Achour L, Paineau D, Riottot M, Attar A, dan Bornet F. Four-week short chain fructo-oligosaccharides ingestion leads to increasing fecal bifidobacteria and cholesterol excretion in healthy elderly volunteers. *Nutr. J* 2007; 6:42, doi:10.1186/1475-2891-6-42.
 16. Roberfroid M. Dietary fiber, inulin, and oligofructose: a review comparing their physiological effects. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 1993;33: 103–148.
 17. Cherbut, C. Inulin and oligofructose in the dietary fibre concept. *British Journal of Nutrition* 2002; 87, Suppl. 2, S159-S162. DOI: 10.1079/BJN2002532.
 18. Boeni S, Purahmad R. Use of inulin and probiotic lactobacilli in symbiotic yogurt production. Scholar Research Library: Annals of

Biological Research, 2012;3 (7):3486-3491. Diunduh dari www.scholarsresearchlibrary.com.

19. Winarti S, Harmayani E, dan Nurismanto R. Characteristic and inulin profil of wild yam (*Dioscorea spp.*). *Agritech.*, 2011;Vol. 31, No. 4.
20. Davidson MH, Maki KC. Effects of dietary inulin on serum lipids. *J. Nutr.* 1999; 129, 1474S–1474S.
21. Winarti S, Harmayani E, dan Nurismanto R. Karakteristik dan profil inulin beberapa jenis uwi (*Dioscorea spp.*). *Agritech.*, November 2011;Vol. 31, no. 4.
22. Boeni S. dan Pourahmad R. Use of inulin and probiotic lactobacilli in symbiotic yogurt production. *Annals of Biological Research*, 2012; 3 (7):3486-3491.
23. Hepner G, Fried R, Jeor SS, Fusetti L, dan Morin R. Hypocholesterolemic effect of yogurt and milk. *The American Journal of Clinical Nutrition* 32: January 1979, pp. 19-24.
24. McCleary BV, DeVries JW, Rader JI, Cohen G, Prosky L, Mugford DC, Champ M, dan Okuma K. Collaborative study report: Determination of insoluble, soluble, and total dietary fiber (codex definition) by an enzymatic-gravimetric method and liquid chromatography. *AACC International Report*, 2011; 56(6) : 238-247.
25. Ooi LG & Liong MT. Cholesterol-lowering effect of probiotics and prebiotics: A review of in vivo and in vitro findings. *Int. J. Mol. Sci.* 2010, 11, 2499-2522; doi:10.3390/ijms11062499.
26. Winarti S, Harmayani E, dan Nurismanto R. Karakteristik dan profil inulin beberapa jenis uwi (*Dioscorea spp.*). *Agritech.*, November 2011; 31(4).
27. Nadra MCM. Nitrogen metabolism in lactic acid bacteria from fruits: a review. *Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology*, 2007; 500-510.

28. Choo CL. Utilisation of matured green banana (*Musa Paradisiaca* var. *Awak*) flour and oat beta glucan as fibre ingredients in noodles. *Universiti Sains Malaysia*, 2007.
29. Wanasundera JPD dan Ravindran G. Nutritional assessment of yam (*Dioscorea alata*) tubers. *Plant Foods for Human Nutrition*, 1994; 46:33-39.
30. Gustaw W, Kordowska-Wiater M, dan Koziol J. The influence of selected prebiotics on the growth of lactic acid bacteria for bio-yogurt production. *Acta Sci. Pol., Technol. Aliment.* 2011; 10(4):455-466.
31. Gustaw W, Wiater MK, dan Koziol J. The influence of selected prebiotics on the growth of lactic acid bacteria for bio-yoghurt production. *Acta Sci. Pol., Technol. Aliment.* 10(4) 2011, 455-466.
32. Harti AS, Saptarini O, dan Lestari A. Kajian efek sinergistik probiotik (bakteri asam laktat) dan prebiotik (Maltodextrin 2% dan Fruktooligosakarida 2%) terhadap penurunan kadar kolesterol secara *in vitro* dan *in vivo*. STIKes Kusuma Husada Surakarta. 2001.
33. Boeni S. dan Pourahmad R. Use of inulin and probiotic lactobacilli in symbiotic yogurt production. *Annals of Biological Research*, 2012; 3 (7):3486-3491
34. Hui YH, editor. Handbook of food products manufacturing: health, meat, milk, poultry, seafood, and vegetables. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; 2007.
35. Hutkins RW dan Nannen NL. pH homeostatis in lactic acid bacteria. *J. Dairy Sci.* 1993;76:2354-2365.
36. Friend BA dan Shahani KM. Fermented dairy products. In: The Practice of Biotechnology: Current Comodity Products. New York: Pergamon Press; 1985.
37. Schrezenmeir J, de Vrese M. Probiotics, prebiotics, and synbiotics - Approaching a definition. *Am J Clin Nutr.* 2001;73S:361S–364S.

38. Lye HS, Rusul G, Liong MT. Removal of Cholesterol by Lactobacilli via Incorporation of and Conversion to Coprostanol. *J. Dairy Sci.* 2010; 93, 1383-1392.
39. Blaut M. Relationship of prebiotics and food to intestinal microflora. *European Journal of Nutrition* 2002;41:I/11-I/16 (Suppl 1).
40. Chen WJ, Anderson JW, dan Jennings D. Propionate may mediate the hypocholesterolemic effects of certain soluble plant fibers in cholesterol-fed rats. *Proc Soc Exp Biol Med* 1984; 175:215-8.
41. Pan XD, Chen FQ, Wu TX, Tang HG, dan Zhao ZY. Prebiotic oligosaccharides change the concentrations of short-chain fatty acids and the microbial population of mouse bowel. *J Zhejiang Univ Sci B*, 2009; 10(4):258-263.
42. Winarti S, Harmayani E, Marsono Y, dan Pranoto Y. Effect of inulin isolated from lesser yam (*Dioscorea esculenta*) on the growth of probiotics bacteria and SCFA formation during fermentation. *Int J Microbiology*, Januari 2013; 4(2): 53-63.
43. Sapers GM dan Hicks KB. Inhibition of enzymatic browning in fruits and vegetables. *Am. Chem. Soc.*, 1989; 405:29-43.
44. Singh U dan Bradbury JH. HPLC determination of vitamin A and vitamin D2 in South Pacific root. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2006; 45(1) : 87-94.
45. Djurdjević JD, Maćej O, dan Jovanović S. The influence of investigated factors on viscosity of stirred yogurt. *Journal of Agricultural Sciences*, 2002; 47(2): 219-231.
46. Brenntag Food & Nutrition Europe. Dietary fibers: technical and nutritional functionality. *EFSA Journal* 2010; 8(3):1462.
47. Isaac T, Arnold CJ, Whiting SJ, dan Dahl WJ. The effect of inulin-fortified thickened beverages on beverage acceptance, gastrointestinal function and calcium retention in dysphagic institutionalized young adults. *Saskatoon District Health and College*

of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan.

48. Moongngarm A. Chemical compositions and resistant starch content in starchy foods. *American Journal of Agricultural and Biological Sciences*, 2013; 8(2) : 107-113.
49. Augustin MA, Sanguansri P, dan Htoon A. Functional performance of a resistant starch ingredient modified using a microfluidiser. Food innovation: Emerging Science, Technologies and Applications (FIESTA) Conference, 2008; 9(2): 224-231.
50. Tester RF dan Morrison WR. Swelling and gelatinization of cereal starches: Effects of amylopectin, amylase, and lipids. *Cereal Chem.*, 1990; 67(6): 551-557.
51. Lee WJ dan Lucey JA. Formation and physical properties of yogurt. *Asian-Aust. J. Anim. Sci.* 2010; 23(9): 1127-1136.
52. Donovan S, Stiefbold C, dan Sprague K. Chemical properties of amino acids and identification of unknown amino acids. *Association for Biology Laboratory Education*, 1996. University of Oregon.

Lampiran 1. Prosedur Pembuatan Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Prosedur :

1. Bagi susu tanpa lemak segar dan susu skim bubuk sesuai formulasi.
2. Campur susu tanpa lemak segar dan susu skim bubuk dengan tepung pisang (perlakuan 1), tepung gembili (perlakuan 2), dan tanpa penambahan tepung (perlakuan kontrol).
3. Homogenisasi, kemudian pasteurisasi pada suhu 90°C selama 10 menit. Dinginkan hingga suhu 43°C.
4. Tambahkan inokulum *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus* yang telah ditumbuhkan di media susu, dengan perbandingan 1:1 (v/v) dan konsentrasi 2% (v/v). Aduk hingga rata.
5. Inkubasi dilakukan dalam inkubator dengan suhu 43°C selama 12 jam
6. Simpan di lemari pendingin pada suhu 4°C
7. Untuk setiap kelompok, dilakukan 3 kali pengulangan (prosedur tiap pengulangan mengikuti nomer 1-6)

Lampiran 2. Formulasi Bahan Pembuatan Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Bahan	+ FOS	+ Inulin	Kontrol
Susu tanpa lemak segar	100 ml	100 ml	100 ml
Susu skim bubuk	4 g	4 g	4 g
Tepung pisang	16.5 g	-	-
Tepung gembili (mengandung 2% inulin)	-	13.5 g	-
<i>Lactobacillus bulgaricus</i> : <i>Streptococcus thermophilus</i> = 1 : 1	2 ml	2 ml	2 ml

Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Normalitas Zat Gizi Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kadar Lemak	.195	18	.068	.868	18	.017
Total BAL	.286	18	.000	.733	18	.000
Serat	.245	18	.006	.817	18	.003
pH	.209	18	.036	.831	18	.004
Viskositas	.412	18	.000	.633	18	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 4. Hasil Uji Kadar Lemak Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Pengulangan		Kadar Lemak (%)	Rata-rata Kadar Lemak (%)
Kontrol	1	1	0.565	0.478100
		2	0.566	
	2	1	0.417	
		2	0.4456	
	3	1	0.426	
		2	0.449	
Pisang	1	1	0.372	0.408333
		2	0.409	
	2	1	0.449	
		2	0.438	
	3	1	0.374	
		2	0.408	
Gembili	1	1	0.405	0.424833
		2	0.457	
	2	1	0.429	
		2	0.488	
	3	1	0.366	
		2	0.404	

Lampiran 5. Hasil Uji Statistik Kadar Lemak Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Descriptives

Kelompok Perlakuan			Statistic	Std. Error
Kadar Lemak	Kontrol	Mean	.478100	.0280646
		99% Confidence Interval for Mean		
		Lower Bound	.364939	
		Upper Bound	.591261	
		5% Trimmed Mean	.476611	
		Median	.447300	
		Variance	.005	
		Std. Deviation	.0687440	
		Minimum	.4170	
		Maximum	.5660	
	Gembili	Mean	.424833	.0176360
		99% Confidence Interval for Mean		
		Lower Bound	.353723	
		Upper Bound	.495944	
		5% Trimmed Mean	.424593	
		Median	.417000	
		Variance	.002	
		Std. Deviation	.0431992	
		Minimum	.3660	
		Maximum	.4880	
	Pisang	Mean	.408333	.0129529
		99% Confidence Interval for Mean		
		Lower Bound	.356105	
		Upper Bound	.460561	
		5% Trimmed Mean	.408093	
		Median	.408500	
		Variance	.001	
		Std. Deviation	.0317280	
		Minimum	.3720	
		Maximum	.4490	

Test Statistics^{a,b}

	Kadar Lemak
Chi-Square	3.902
df	2
Asymp. Sig.	.142

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Lampiran 6. Hasil Uji Kadar Serat Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Pengulangan		Kadar Serat (%)	Rata-rata Kadar Serat (%)
	1	2		
Kontrol	1	1	0.0000	0.0000
		2	0.0000	
	2	1	0.0000	
		2	0.0000	
	3	1	0.0000	
		2	0.0000	
Pisang	1	1	0.0267	0.026483
		2	0.0609	
	2	1	0.0032	
		2	0.0048	
	3	1	0.0257	
		2	0.0376	
Gembili	1	1	0.0812	0.078400
		2	0.0845	
	2	1	0.0742	
		2	0.0776	
	3	1	0.0895	
		2	0.0634	

Lampiran 7. Hasil Uji Statistik Kadar Serat Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Descriptives^a

Kelompok Perlakuan			Statistic	Std. Error	
Serat	Gembili	Mean	.078400	.0037038	
		99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	.063466	
			Upper Bound	.093334	
		5% Trimmed Mean	.078617		
		Median	.079400		
		Variance	.000		
		Std. Deviation	.0090724		
		Minimum	.0634		
		Maximum	.0895		
Pisang		Mean	.026483	.0087959	
		99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-.008983	
			Upper Bound	.061950	
		5% Trimmed Mean	.025865		
		Median	.026200		
		Variance	.000		
		Std. Deviation	.0215454		
		Minimum	.0032		
		Maximum	.0609		

a. Serat is constant when Kelompok Perlakuan = Kontrol. It has been omitted.

Test Statistics^{a,b}

	Serat
Chi-Square	15.726
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Kontrol – Gembili)

Ranks

Kelompok Perlakuan		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Serat	Kontrol	6	3.50	21.00
	Gembili	6	9.50	57.00
Total		12		

Test Statistics^b

	Serat
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-3.077
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Kontrol – Pisang)

Ranks

Kelompok Perlakuan		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Serat	Kontrol	6	3.50	21.00
	Pisang	6	9.50	57.00
Total		12		

Test Statistics^b

	Serat
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-3.077
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Gembili - Pisang)

Ranks

Kelompok Perlakuan		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Serat	Gembili	6	9.50	57.00
	Pisang	6	3.50	21.00
Total		12		

Test Statistics^b

	Serat
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-2.882
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Lampiran 8. Hasil Uji Total Bakteri Asam Laktat Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Pengulangan		Total BAL (cfu/ml)	Rata-rata Total BAL (cfu/ml)
Kontrol	1	1	1.02×10^9	1.2167×10^7
		2	1.05×10^9	
	2	1	3.3×10^8	
		2	4.3×10^8	
	3	1	6.1×10^8	
		2	6.8×10^8	
Pisang	1	1	1.49×10^8	6.8667×10^8
		2	1.59×10^8	
	2	1	3.4×10^7	
		2	3.9×10^7	
	3	1	1.98×10^7	
		2	2.16×10^7	
Gembili	1	1	5.3×10^6	7.0400×10^7
		2	6.7×10^6	
	2	1	1.27×10^7	
		2	1.40×10^7	
	3	1	1.68×10^7	
		2	1.75×10^7	

Lampiran 9. Hasil Uji Statistik Total Bakteri Asam Laktat Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Descriptives

Kelompok Perlakuan			Statistic	Std. Error
Total BAL	Kontrol	Mean	12.167	2.0864
		99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 3.754	
			Upper Bound 20.579	
		5% Trimmed Mean	12.252	
		Median	13.350	
		Variance	26.119	
		Std. Deviation	5.1106	
		Minimum	5.3	
		Maximum	17.5	
Gembili		Mean	70.400	26.6337
		99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound -36.991	
			Upper Bound 177.791	
		5% Trimmed Mean	68.289	
		Median	36.500	
		Variance	4256.128	
		Std. Deviation	65.2390	
		Minimum	19.8	
		Maximum	159.0	
Pisang		Mean	686.667	121.3992
		99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 197.168	
			Upper Bound 1176.166	
		5% Trimmed Mean	686.296	
		Median	645.000	
		Variance	88426.667	
		Std. Deviation	297.3662	
		Minimum	330.0	
		Maximum	1050.0	

Test Statistics^{a,b}

	Total BAL
Chi-Square	15.158
df	2
Asymp. Sig.	.001

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Kontrol – Gembili)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Total BAL	Kontrol	6	3.50	21.00
	Gembili	6	9.50	57.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	Total BAL
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-2.882
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Kontrol – Pisang)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Total BAL	Kontrol	6	3.50	21.00
	Pisang	6	9.50	57.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	Total BAL
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-2.882
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Gembili - Pisang)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Total BAL	Gembili	6	3.50	21.00
	Pisang	6	9.50	57.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	Total BAL
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-2.882
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Lampiran 10. Hasil Uji Warna Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Pengulangan		Warna				Interpretasi
			X	Y	X	Y	
Kontrol	1	1	0.962092	-0.05127	0.936641	-0.0554	White light
		2	0.926194	-0.05744			
		3	0.921636	-0.05748			
	2	1	0.934102	-0.05799	0.934478	-0.05631	White light
		2	0.937597	-0.05709			
		3	0.931735	-0.05386			
	3	1	0.921793	-0.05655	0.933342	-0.05725	White light
		2	0.943443	-0.05768			
		3	0.934792	-0.05751			
Pisang	1	1	0.779608	0.011223	0.782416	0.010777	Orangish pink
		2	0.783439	0.010696			
		3	0.784201	0.010413			
	2	1	0.784803	0.007515	0.77442	0.010248	Orangish pink
		2	0.768571	0.013443			
		3	0.769886	0.009785			
	3	1	0.782246	0.008352	0.782135	0.009811	Orangish pink
		2	0.78171	0.010333			
		3	0.78245	0.010748			
Gembili	1	1	0.842202	-0.01221	0.844932	-0.01335	Yellowish orange
		2	0.853406	-0.01867			
		3	0.839188	-0.00916			
	2	1	0.842036	-0.00619	0.846581	-0.0108	Yellowish orange
		2	0.842929	-0.00979			
		3	0.854779	-0.01643			
	3	1	0.830112	-0.00245	0.832862	-0.00501	Yellowish orange
		2	0.833508	-0.00699			
		3	0.834966	-0.0056			

Lampiran 11. Hasil Uji Viskositas Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Pengulangan		Viskositas (cP)	Rata-rata Viskositas (cP)
Kontrol	1	1	8.704	7.01117
		2	8.029	
	2	1	7.528	
		2	7.428	
	3	1	5.249	
		2	5.129	
Pisang	1	1	239.9	230.08333
		2	210	
	2	1	210.9	
		2	239.9	
	3	1	239.9	
		2	239.9	
Gembili	1	1	11.078	9.75267
		2	9.718	
	2	1	9.118	
		2	9.178	
	3	1	9.448	
		2	9.976	

Lampiran 12. Hasil Uji Statistik Viskositas Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Descriptives

Kelompok Perlakuan			Statistic	Std. Error
Viskositas	Kontrol	Mean	7.01117	.605264
		99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 4.57066	Upper Bound 9.45168
		5% Trimmed Mean	7.02169	
		Median	7.47800	
		Variance	2.198	
		Std. Deviation	1.482587	
		Minimum	5.129	
		Maximum	8.704	
		Gembili		Mean
99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 8.55802			Upper Bound 10.94731
5% Trimmed Mean	9.71430			
Median	9.58300			
Variance	.527			
Std. Deviation	.725735			
Minimum	9.118			
Maximum	11.078			
Pisang				Mean
		99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 205.04497	Upper Bound 255.12170
		5% Trimmed Mean	230.65370	
		Median	239.90000	
		Variance	231.362	
		Std. Deviation	15.210577	
		Minimum	210.000	
		Maximum	239.900	

Test Statistics^{a,b}

	Viskositas
Chi-Square	15.316
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Kontrol – Gembili)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Viskositas	Kontrol	6	3.50	21.00
	Gembili	6	9.50	57.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	Viskositas
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-2.882
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Kontrol – Pisang)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Viskositas	Kontrol	6	3.50	21.00
	Pisang	6	9.50	57.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	Viskositas
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-2.934
Asymp. Sig. (2-tailed)	.003
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Gembili - Pisang)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Viskositas	Gembili	6	3.50	21.00
	Pisang	6	9.50	57.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	Viskositas
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-2.934
Asymp. Sig. (2-tailed)	.003
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Lampiran 13. Hasil Uji pH Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Perlakuan	Pengulangan		pH	Rata-rata pH
Kontrol	1	1	4.23	4.23
		2	4.23	
	2	1	4.23	
		2	4.23	
	3	1	4.23	
		2	4.23	
Pisang	1	1	4.83	4.8733
		2	4.83	
	2	1	4.77	
		2	4.77	
	3	1	5.02	
		2	5.02	
Gembili	1	1	5.71	5.72
		2	5.71	
	2	1	5.78	
		2	5.78	
	3	1	5.67	
		2	5.67	

Lampiran 14. Hasil Uji Statistik pH Yogurt Sinbiotik Tanpa Lemak

Descriptives^a

Kelompok Perlakuan			Statistic	Std. Error
pH	Gembili	Mean	5.7200	.02033
		99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	5.6380
		Upper Bound	5.8020	
		5% Trimmed Mean	5.7194	
		Median	5.7100	
		Variance	.002	
		Std. Deviation	.04980	
		Minimum	5.67	
		Maximum	5.78	
		Pisang	Pisang	Mean
99% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			4.6812
Upper Bound	5.0655			
5% Trimmed Mean	4.8709			
Median	4.8300			
Variance	.014			
Std. Deviation	.11673			
Minimum	4.77			
Maximum	5.02			

a. pH is constant when Kelompok Perlakuan = Kontrol. It has been omitted.

Test Statistics^{a,b}

	pH
Chi-Square	15.828
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Kontrol - Gembili)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
pH	Kontrol	6	3.50	21.00
	Gembili	6	9.50	57.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	pH
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-3.095
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Kontrol - Pisang)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
pH	Kontrol	6	3.50	21.00
	Pisang	6	9.50	57.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	pH
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-3.095
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan

Mann-Whitney Test (Gembili - Pisang)

Ranks

	Kelompok Perlakuan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
pH	Gembili	6	9.50	57.00
	Pisang	6	3.50	21.00
	Total	12		

Test Statistics^b

	pH
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	21.000
Z	-2.913
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.002 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok Perlakuan