

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

- 1) Proporsi terbesar pasien katarak senilis tanpa miopia yang menjalani operasi fakoemulsifikasi (96,3%) mencapai kategori tajam penglihatan baik (0,00-0,48).
- 2) Proporsi terbesar pasien katarak senilis dengan miopia tinggi yang menjalani operasi fakoemulsifikasi (66,7%) mencapai kategori tajam penglihatan baik (0,00-0,48).
- 3) Terdapat perbedaan yang bermakna antara tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi antara pasien katarak senilis tanpa miopia dengan miopia tinggi.

7.2 Saran

- 1) Perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan panjang aksial dengan tajam penglihatan pascaoperasi pasien katarak senilis dengan miopia tinggi.
- 2) Perlu dilakukan penelitian kualitatif mengenai faktor-faktor intraoperasi dan pascaoperasi yang dapat mempengaruhi tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi pasien katarak senilis.

- 3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai komplikasi yang dapat terjadi pada pasien katarak senilis dengan miopia tinggi yang menjalani operasi fakoemulsifikasi.
- 4) Perlu dilakukan pencatatan medis secara lengkap sehingga data preoperasi, intraoperasi dan pascaoperasi dapat diketahui.