

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada ras Deutro Melayu didapatkan pola ruge menggunakan klasifikasi Trobo ditemukan bagian yang dominan pada daerah ruge A kanan maupun kiri adalah berbentuk titik, sedangkan daerah ruge B, C dan D kanan maupun kiri pola ruge yang dominan adalah berbentuk gelombang.
2. Pada ras Australoid didapatkan pola ruge menggunakan klasifikasi Trobo ditemukan bagian yang dominan pada daerah ruge A kanan maupun kiri adalah berbentuk garis dan daerah ruge B dan D kanan maupun kiri dominan berbentuk gelombang. Sedangkan daerah ruge C kanan maupun kiri pola ruge yang dominan adalah berbentuk sudut.
3. Didapatkan perbedaan bermakna dari pola ruge palatal antara ras Deutro Melayu dan ras Australoid pada daerah ruge A kanan, A kiri, dan B kiri.
4. Didapatkan perbedaan bermakna dari ukuran pada seluruh daerah ruge palatal antara ras Deutro Melayu dan ras Australoid menggunakan pembagian daerah menurut klasifikasi Caldas.

7.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Perbedaan Pola Ruge Palatal pada ras Deutro Melayu dengan ras Australoid dengan metode yang berbeda contohnya foto intra oral dengan sampel yang sama untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai, sehingga bisa memperkuat hasil penelitian ini. Perlu juga dilakukan penelitian yang lebih luas mengenai pola dan ukuran ruge pada jenis kelamin, kelompok usia, dan antemortem-postmortem.