

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penderita Tb Paru yang di rawat lebih banyak laki-laki dari pada perempuan dengan paling banyak usia produktif dan bekerja sebagai buruh. Gejala dan tanda terbanyak yang dialami penderita TB paru yaitu batuk lebih dari 3 minggu dengan bentuk dada yang normal . Penyakit komorbid yang paling banyak pada penderita Tb rawat inap adalah HIV dan DM.

Terdapat efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obat Anti Tuberkulosis yang dikonsumsi penderita terhadap gangguan fungsi hati dan pengelihan penderita. Lama rawat inap penderita Tb paru terbanyak dengan lama rawat 1-2 minggu dengan menggunakan asuransi kesehatan. Komplikasi sering ditimbulkan pada pasien Tb Paru adalah pneumothorax, hemoptoe, syok sepsis, dan hepatitis, Penderita Tb rawat inap sebagian besar sembuh dengan perbaikan kondisi umum.

7.2 Saran

1. Perlu diadakan perbaikan catatan medik, baik catatan anamnesis, diagnosis maupun terapi yang diberikan agar dapat memudahkan dalam hal penelitian selanjutnya.
2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang Tb paru di RSUP Dr.Kariadi Semarang dimasa yang akan datang khususnya dibidang ilmu Penyakit Dalam dengan rentang waktu yang lebih lama.

