

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 KESIMPULAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Angka kejadian pneumonia pada pasien sepsis selama satu tahun dari 1 Januari – 31 Desember 2013 berdasarkan catatan medik di RSUP dr. Kariadi Semarang sebesar 42% (53 pasien). Dari jumlah tersebut ditemukan pasien meninggal 86.8% (46 pasien) dan hidup 13.2% (7 pasien) .
2. Angka kejadian pneumonia pada pasien sepsis terbanyak pada usi 41-60 tahun dan >60 tahun dengan presentase 41.51% di ICU selama periode 1 Januari – 31 Desember 2013.
3. Angka kejadian Pneumonia pada pasien Sepsis di rawat di ICU RSUP dr. Kariadi menunjukkan pasien laki-laki lebih besar dari pasien perempuan, yaitu 54.7% untuk laki-laki dan perempuan sebesar 45,3%.
4. Diagnosis awal terbanyak pneumonia pada pasien sepsis adalah gangguan pernafasan yaitu 16 pasien (30,2%).
5. Rentang skor APACHE II dari pasien Pneumonia yang dirawat di ICU periode 1 Januari – 31 Desember 2013 terbanyak rentang skor 16-20 sebanyak 16 pasien ( 30,2% ).

## 7.2 SARAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai data dasar di *Intensive Care Unit* (ICU) RSUP Dr.Kariadi khususnya pada kasus pneumonia dan sepsis serta dapat digunakan untuk penelitian slebih lanjut. Karena ditemukan bahwa angka kejadian pneumonia pada pasien sepsis (42%) di RSUP Dr.Kariadi Semarang lebih tinggi di banding penelitian di Swedia dengan angka kematian 25%, hasil data yang ditemukan dapat digunakan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian di ICU.