

## BAB VII

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Simpulan

1. Tidak ditemukan kejadian hipotensi (0%) setelah pemberian *preload* 500 cc cairan koloid HES 200 kD pada anestesi spinal pasien *sectio cesarea*.
2. Ditemukan dua kejadian hipotensi (0,9%) setelah pemberian *preload* 500 cc cairan kristaloid ringer laktat pada anestesi spinal pasien *sectio cesarea*.
3. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna kejadian hipotensi setelah pemberian *preload* 500 cc cairan koloid HES 200 kD dan cairan ringer laktat pada anestesi spinal pasien *sectio cesarea*.
4. Terdapat perbedaan bermakna penurunan tekanan darah antara kelompok RL dan HES 200 kD. Pada kelompok RL penurunan tekanan darah lebih baik dibandingkan dengan kelompok HES 200 kD. Sehingga dapat dikatakan bahwa cairan HES 200 kD lebih mampu menjaga stabilitas tekanan darah dibanding dengan cairan RL.

## 7.2 Saran

1. Pemakaian *preload* 500 cc Ringer Laktat dan HES 200 kD pada anestesi spinal pasien *sectio cesarea* dapat digunakan sebagai pencegah hipotensi dan menjaga stabilitas tekanan darah akibat anestesi spinal.
2. Penelitian lebih lanjut dengan angka sampel lebih banyak dan metode eksperimental dapat dilakukan dengan waktu pengukuran tekanan darah setelah anestesi spinal yang seragam sehingga lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya.