

## **BAB VII**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Simpulan**

- 1) Pasien katarak senilis dengan diabetes mellitus yang dapat mencapai tajam penglihatan baik pascaoperasi fakoemulsifikasi sebesar 77,5%.
- 2) Pasien katarak senilis tanpa diabetes mellitus yang dapat mencapai tajam penglihatan baik pascaoperasi fakoemulsifikasi sebesar 97,5%.
- 3) Terdapat perbedaan yang bermakna antara tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi pada pasien katarak senilis dengan DM dan tanpa DM

#### **7.2 Saran**

- 1) Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar
- 2) Perlu dilakukan penelitian dengan desain prospektif dan periode *follow up* yang lebih lama
- 3) Perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor perioperatif yang dapat mempengaruhi tajam penglihatan pascaoperasi pada pasien katarak senilis dengan DM dan tanpa DM
- 4) Perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan glaukoma dengan fakoemulsifikasi pada pasien katarak dengan DM
- 5) Kelengkapan pengisian catatan medik perlu ditingkatkan agar lebih banyak informasi yang dapat diperoleh