

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Jumlah pasien malaria falciparum menurut jenis kelamin banyak ditemukan pada laki-laki dengan persentase 80%, sedangkan perempuan 20%.
- 2) Gambaran klinis yang paling banyak ditemukan pada pasien malaria falciparum adalah demam dengan persentase 95% (5% terdapat riwayat demam sebelumnya) dan anemia dengan persentase 85%.
- 3) Pada kelompok malaria falciparum berat, komplikasi yang paling sering ditemukan adalah komplikasi ikterik (69,2%), gangguan ginjal akut (69,2) dan malaria cerebral (46,2).
- 4) Tatalaksana malaria falciparum sudah sesuai dengan standar pemberian terapi yang sudah ditentukan. Pasien malaria falciparum ringan menggunakan terapi ACT (contohnya: Arsuumoon, DHP), sedangkan malaria falciparum berat menggunakan Artesunat iv.
- 5) Sebanyak 38,5% pasien meninggal pada pasien malaria falciparum berat.

7.2 Saran

Meskipun bukan merupakan daerah endemis dari malaria, tetapi pengenalan gambaran klinis yang khas untuk malaria, khususnya malaria falciparum akan sangat membantu para tenaga kesehatan dalam hal penanganan penyakit malaria secara cepat, tepat dan rasional, guna untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria falciparum.

Bagi peneliti lain juga diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk gambaran klinis dan tatalaksana malaria falciparum guna untuk mengetahui perkembangan penyakit tersebut.