

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

1. Gambaran cairan serebrospinal abnormal pada setiap kelompok adalah:
  - a. Pada kelompok usia 1 bulan – 12 bulan gambaran cairan serebrospinal abnormal sebanyak 98 (43%)
  - b. Pada kelompok usia 12 bulan – 18 bulan gambaran cairan serebrospinal abnormal sebanyak 22 (47%)
  - a. Pada kelompok usia lebih dari 18 bulan gambaran cairan serebrospinal abnormal sebanyak 26 (37%).
2. Gambaran cairan serebrospinal abnormal yang mengindikasikan infeksi intra kranial dari keseluruhan sampel masih tinggi 157 (44%), sehingga tindakan lumbal pungsi pada kasus kejang disertai demam tetap harus dilakukan.

#### **7.2 Saran**

Saran penelitian ini adalah:

1. Prosedur Lumbal Pungsi tetap wajib dilakukan karena dalam penelitian ini menunjukkan 64% pasien yang dirawat dengan indikasi kejang disertai demam memiliki gambaran cairan serebrospinal yang abnormal yang berisiko mengalami infeksi intra kranial
2. Diharapkan penelitian selanjutnya menyertakan variabel perancu seperti pemberian obat penurun panas dan pemberian anti biotik.