

## BAB 7

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Simpulan

- 1) Jenis analgesik yang paling banyak digunakan pasca operasi orthopedi di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Januari – Juni 2013 adalah NSAID *ketorolac*.
- 2) Dosis analgesik yang paling banyak digunakan pasca operasi orthopedi di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Januari – Juni 2013 adalah NSAID *ketorolac* 30 mg/ 8 jam.
- 3) Metode pemberian analgesik yang paling banyak digunakan pasca operasi orthopedi di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Januari – Juni 2013 adalah NSAID *ketorolac* intravena.
- 4) Lama analgesik yang paling banyak digunakan pasca operasi orthopedi di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Januari – Juni 2013 adalah NSAID *ketorolac* selama 2 hari.
- 5) Jenis analgesik yang paling banyak digunakan intra operasi orthopedi di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Januari – Juni 2013 adalah opioid *fentanyl* dengan atau tanpa kombinasi.
- 6) Metode pemberian analgesik yang paling banyak digunakan intra operasi orthopedi di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Januari – Juni 2013 adalah opioid *fentanyl* dengan atau tanpa kombinasi melalui jalur intravena.

## **7.2 Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini peneliti tidak mengetahui VAS awal sebelum pemberian analgesik dan VAS akhir sesudah dua hari pemberian analgesik dari rekam medik anestesi sehingga tidak diketahui angka penurunan VAS dari masing-masing analgesik.

## **7.3 Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya diadakan penelitian mengenai rata-rata angka penurunan VAS dari masing-masing analgesik yang digunakan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.