

**HUBUNGAN LINGKAR PERGELANGAN TANGAN DENGAN
KADAR GLUKOSA DARAH PADA REMAJA PUTRI USIA
15-18 TAHUN DI SMA NEGERI 6 SEMARANG**

Artikel Penelitian

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro



disusun oleh
RIANI ARIFIN
22030110130066

**PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel penelitian dengan judul “Hubungan Lingkar Pergelangan Tangan dengan Kadar Glukosa Darah pada Remaja Putri Usia 15-18 Tahun di SMA Negeri 6 Semarang” telah dipertahankan dihadapan reviewer dan telah direvisi.

Mahasiswa yang mengajukan

Nama : Riani Arifin

NIM : 22030110130066

Fakultas : Kedokteran

Program Studi : Ilmu Gizi

Universitas : Diponegoro Semarang

Judul Proposal : Hubungan Lingkar Pergelangan Tangan dengan Kadar Glukosa Darah pada Remaja Putri Usia 15-18 Tahun di SMA Negeri 6 Semarang

Semarang, 30 September 2014

Pembimbing

Binar Panunggal, S.Gz, MPH

NIP. 198505162014041001

**The Relationship between wrist circumference with blood glucose level in female adolescents
15-18 Years Old at SMA Negeri 6 Semarang**

Riani Arifin¹, Binar Panunggal²

ABSTRACT

Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that occurs due to pancreas unable to produce insulin or because the body can not use available insulin properly. Adolescence is the period of transition from childhood to adulthood which is a key phase of human development. Therefore control blood glucose level is necessary to detect early occurrence of diabetes mellitus since adolescents. Wrist circumference is one of anthropometric measurements that is used as a predictor of diabetes mellitus. SMA Negeri 6 Semarang is one of schools where location is in Semarang city. This study aims to determine the relationship between wrist circumference with blood glucose levels in female adolescents aged 15-18 years at SMA Negeri 6 Semarang.

Method: Observational research with cross sectional design was conducted in SMA Negeri 6 Semarang with 69 students as subjects selected by consecutive sampling. Data collected include characteristic of subject, wrist circumference and blood glucose level. Wrist circumference measured by midline and blood samples were taken to measure fasting blood glucose levels. Data wrist circumferences and blood glucose levels were analyzed using Pearson test.

Result: This study found that 59,4% of subjects had blood glucose levels at 81-90 mg/dl and 55,1% of subjects had small wrist circumference. Wrist circumference does not related with blood glucose level ($r=-0,039$ $p=0,749$).

Conclusion: there was no relationship between wrist circumference with blood glucose levels in female adolescents aged 15-18 years at SMA Negeri 6 Semarang.

Keyword: wrist circumference, blood glucose level, diabetes mellitus

¹Student of Nutrition Science Department, Medical Faculty, Diponegoro University, Semarang

² Lecture of Nutrition Science Department, Medical Faculty, Diponegoro University, Semarang

Hubungan Lingkaran Pergelangan Tangan dengan Kadar Glukosa Darah pada Remaja Putri Usia 15-18 Tahun di SMA Negeri 6 Semarang

Riani Arifin¹, Binar Panunggal²

ABSTRAK

Latar Belakang : Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin atau karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang ada. Untuk mendeteksi dini kejadian diabetes melitus perlu dilakukan kontrol kadar glukosa darah sejak remaja. Lingkaran pergelangan merupakan salah satu antropometri yang digunakan sebagai prediktor diabetes melitus. SMA Negeri 6 Semarang merupakan salah satu sekolah yang berada di kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lingkaran pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah pada remaja putri usia 15-18 tahun di SMA Negeri 6 Semarang.

Metode : penelitian Observasional dengan desain *cross sectional*, bertempat di SMA Negeri 6 Semarang dengan jumlah sampel 69 subjek yang dipilih dengan *consecutive sampling*. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik subjek, lingkaran pergelangan tangan dan kadar glukosa darah puasa. Lingkaran pergelangan tangan diukur menggunakan *midline*. Pengambilan sampel darah dilakukan untuk pengukuran kadar glukosa darah puasa. Analisis bivariat dilakukan menggunakan uji korelasi *pearson*.

Hasil : Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 59,4% subjek mempunyai kadar glukosa darah pada range 81-90 mg/dl dan 55,1% lingkaran pergelangan tangan subjek termasuk dalam kategori kecil. Lingkaran pergelangan tangan tidak berhubungan dengan kadar glukosa darah ($r=-0,039$ $p=0,749$).

Simpulan : Tidak terdapat hubungan antara lingkaran pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah pada remaja putri usia 15-18 tahun di SMA Negeri 6 Semarang

Kata kunci : Lingkaran pergelangan tangan, kadar glukosa darah, diabetes melitus

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

²Dosen Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang

PENDAHULUAN

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin atau karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang ada.¹ Kejadian diabetes melitus secara global meningkat karena pertumbuhan populasi, penuaan, urbanisasi, aktifitas fisik yang kurang dan peningkatan prevalensi obesitas.² Berdasarkan hasil RISKESDAS tahun 2013 angka kejadian diabetes di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,1% pada tahun 2007 menjadi 2,1% pada tahun 2013. Pada tahun 2010 kota Semarang merupakan daerah dengan kejadian diabetes melitus tipe 2 tertinggi di Jawa Tengah prevalensinya sebesar 1,66%.³

Pada umumnya usia penderita diabetes melitus tipe 2 yaitu lebih dari 40 tahun, namun pada pertengahan tahun 1990 kejadian diabetes melitus tipe 2 pada remaja meningkat secara global. Pada tahun 2008 prevalensi diabetes melitus tipe 2 pada remaja di Amerika Serikat meningkat tiga kali lipat meskipun kejadian obesitas tidak meningkat dengan kejadian 2,3-50,9 per 100.000 populasi pada remaja usia 15-19 tahun.⁴

Diabetes melitus tipe-2 yang tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini dapat mengakibatkan komplikasi jangka panjang. Komplikasinya dapat berupa kerusakan mikrovaskuler dan makrovaskuler.¹ Perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah peningkatan prevalensi dan komplikasi agar kejadian diabetes melitus diketahui lebih awal. Mengontrol kadar glukosa darah merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mendeteksi dini kejadian diabetes melitus.⁵ Sejumlah studi telah mengkonfirmasi bahwa pengukuran kadar glukosa darah puasa dapat lebih sensitif untuk mendiagnosa diabetes pada populasi umum.⁶

Pengukuran antropometri juga digunakan sebagai salah satu parameter untuk mendeteksi suatu penyakit karena sensitif terhadap perubahan fisik yang berkaitan dengan penyakit tertentu. Lingkar pergelangan tangan merupakan pengukuran antropometri skeletal *frame size* yang sederhana dan baru-baru ini telah diteliti kaitannya dengan insulin pada anak dan remaja obesitas.⁷ Penelitian di Italia pada tahun 2011 menunjukkan bahwa lingkar pergelangan tangan yang diukur menggunakan pita *midline* berhubungan secara signifikan dengan kadar

glukosa darah puasa pada anak dan remaja obesitas. Menurut penelitian tersebut bagian lingkaran pergelangan tangan yang berhubungan dengan kadar glukosa darah puasa adalah jaringan tulang dari pergelangan tangan setelah dilakukan pengukuran lanjutan pada subjek menggunakan metode *Magnetic Resonance Imaging*.⁷ Penelitian lain yang dilakukan di Iran pada tahun 2001 dan penelitian lanjutan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa lingkaran pergelangan tangan berhubungan secara signifikan dengan kejadian diabetes melitus dan dapat menjadi prediktor diabetes melitus dan sindrom metabolik pada populasi dewasa.⁸

Penelitian tentang hubungan lingkaran pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah pada remaja putri usia 15-18 tahun atau yang berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) belum pernah dilakukan. SMA Negeri 6 Semarang merupakan sekolah yang termasuk dalam wilayah kota Semarang yang merupakan kota dengan prevalensi diabetes melitus tipe 2 tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2010 dan belum pernah dilakukan penelitian tentang pengukuran lingkaran pergelangan tangan dan kadar glukosa darah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan lingkaran pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah pada remaja putri usia 15-18 tahun di SMA Negeri 6 Semarang.

METODA

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Semarang Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan data dilakukan pada bulan September 2014. Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam bidang gizi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain *cross sectional*.

Populasi target adalah seluruh pelajar putri SMA di Semarang. Populasi terjangkau adalah seluruh pelajar putri di SMA Negeri 6 Semarang. Sampel penelitian ini adalah seluruh pelajar putri di SMA Negeri 6 Semarang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *consecutive sampling*. Sampel yang didapat sebanyak 69 subjek berdasarkan rumus besar sampel tunggal untuk estimasi proporsi suatu populasi.⁹ Kriteria inklusi meliputi sampel berjenis kelamin perempuan dengan

usia 15-18 tahun, tidak sedang mengonsumsi obat penurun gula darah, tidak terdapat kelainan/luka pada pergelangan tangan yang dapat mengganggu pengukuran lingkaran pergelangan tangan, serta bersedia menjadi subjek penelitian. Kriteria eksklusi penelitian adalah tidak datang saat pengambilan sampel darah dan subjek mengundurkan diri dari penelitian.

Variabel terikat adalah kadar glukosa darah. Pengukuran kadar glukosa darah subjek dilakukan dengan menilai kadar glukosa darah puasa yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Ideal Semarang yang diambil melalui pembuluh darah vena setelah sebelumnya subjek melakukan puasa selama 8-12 jam (mulai pukul 22.00 – 08.00). Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan dengan menggunakan metode enzimatis. Hasil pengukuran kadar glukosa darah puasa dengan satuan mg/dl dan skala rasio. Data kadar glukosa darah puasa disajikan dalam range yaitu 60-70 mg/dl, 71-80 mg/dl, 81-90 mg/dl, 91-100 mg/dl.

Variabel bebas adalah lingkaran pergelangan tangan. Pengukuran lingkaran pergelangan tangan dilakukan dalam posisi duduk tenang dengan lengan tangan kanan diletakkan di atas datar dan telapak tangan telungkup. Lingkaran pergelangan tangan diukur dengan pita *midline* secara horizontal yang diletakkan pada tonjolan ulna bagian distal melingkari pergelangan tangan.⁷ Dilakukan pengukuran lingkaran pergelangan tangan sebanyak 3 kali oleh enumerator yang sama untuk mendapatkan nilai rata-rata. Hasil pengukuran lingkaran pergelangan tangan dengan satuan sentimeter (cm) dan skala rasio. Kategori lingkaran pergelangan tangan untuk perempuan dibagi menjadi tiga yaitu Kecil jika subjek dengan tinggi badan <155 cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan <14 cm, subjek dengan tinggi badan 155-163 cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan <15,2 cm, subjek dengan tinggi badan >163cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan <15,9 cm; Kategori sedang jika subjek dengan tinggi badan <155 cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan 14-14,6 cm, subjek dengan tinggi badan 155-163 cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan 15,2-15,9 cm, subjek dengan tinggi badan >163 cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan 15,9-16,5 cm; Kategori besar jika subjek dengan tinggi badan <155 cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan >14,6 cm, subjek dengan tinggi badan 155-163 cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan

>15,9 cm, subyek dengan tinggi badan >163cm mempunyai lingkaran pergelangan tangan >16,5 cm.¹⁰

Data yang dikumpulkan meliputi nama, usia, ada/tidaknya riwayat penyakit DM pada orang tua, ada/tidaknya riwayat mengkonsumsi obat penurunan gula darah yang diperoleh melalui wawancara, data berat badan, tinggi badan, status gizi, lingkaran pergelangan tangan yang diperoleh melalui pengukuran antropometri dan data kadar glukosa darah puasa yang diperoleh dari hasil laboratorium. Subjek dikategorikan mempunyai riwayat DM pada orang tua jika salah satu atau kedua orang tua dari subjek menderita diabetes melitus. Status gizi subjek dikategorikan berdasarkan Indeks Massa Tubuh per usia menurut WHO 2007. Status gizi subjek dikategorikan Kurus jika Zscore < -2SD, Normal jika Zscore \geq -2SD s/d +1SD dan Overweight Jika Zscore > +1SD.¹¹

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Windows* 17.0. Analisa univariat dilakukan dengan memasukkan data secara terpisah dalam tabel distribusi frekuensi untuk mendeskripsikan data usia, status gizi, riwayat DM keluarga, lingkaran pergelangan tangan dan kadar glukosa darah puasa. Sebaran data dapat diketahui normalitasnya melalui uji *Kolmogorov Smirnov* dengan nilai kemaknaan $p > 0,05$ untuk sampel lebih dari 50 responden. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat dengan uji korelasi *Pearson* karena data berdistribusi normal.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Subjek

Penelitian telah dilakukan di SMA Negeri 6 Semarang dengan subjek pelajar putri. Sampel yang didapatkan sebesar 69 orang berusia 15 sampai 18 tahun. Karakteristik subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik subjek menurut usia, IMT, lingkaran pergelangan tangan dan kadar glukosa darah puasa.

Variabel	n	mean±SD
Usia (tahun)	69	16 ± 0,8
Indeks Massa Tubuh (kg/m ²)	69	20,27 ± 2,9
Lingkar pergelangan tangan (cm)	69	14,56 ± 0,7
Kadar glukosa darah puasa (mg/dl)	69	83,27 ± 6,1

Distribusi frekuensi subjek penelitian berdasarkan usia, Status gizi, Riwayat diabetes melitus keluarga, lingkaran pergelangan tangan dan kadar glukosa darah puasa dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi frekuensi subjek berdasarkan usia, Status gizi, Riwayat diabetes melitus keluarga, lingkaran pergelangan tangan dan kadar glukosa darah puasa

Variabel	n	Persentase
Usia		
15 tahun	21	30,4%
16 tahun	30	43,5%
17 tahun	15	21,7%
18 tahun	3	4,3%
Status Gizi		
Kurus = < -2SD	5	7,2%
Normal = ≥ -2SD s/d +1SD	54	78,3%
Overweight = > +1SD	10	14,5%
Riwayat DM Keluarga		
Ya	24	34,8%
Tidak	45	65,2%
Lingkar Pergelangan tangan		
Kecil	38	55,1%
Sedang	18	26,1%
Besar	13	18,8%
Kadar glukosa darah puasa		
60-70 mg/dl	2	2,9%
71-80 mg/dl	19	27,5%
81-90 mg/dl	41	59,4%
91-100 mg/dl	7	10,1%

Tabel 2. Menunjukkan usia subjek yang paling banyak adalah usia 16 tahun sebanyak 43,5%. Status gizi subjek yang paling banyak adalah status gizi normal dengan persentase sebanyak 78,3%. Terdapat 65,2% subjek yang tidak mempunyai riwayat DM pada keluarga. Lingkar pergelangan tangan subjek termasuk dalam kategori kecil sebesar 55,1%. Kadar glukosa darah puasa subjek sebanyak 59,4% termasuk dalam range 81-90 mg/dl. Data kadar glukosa darah tidak disajikan dalam kategori <100 mg/dl dan ≥100 mg/dl menurut *Internasional*

*Diabetes Federation*¹² karena semua data kadar glukosa darah puasa dalam penelitian ini <100 mg/dl, maka disajikan dalam bentuk range.


Tabel 3. Distribusi frekuensi kadar glukosa darah subjek berdasarkan status gizi dan Riwayat DM keluarga

	Kadar glukosa darah puasa							
	60-70 mg/dl		71-80 mg/dl		81-90 mg/dl		91-100 mg/dl	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Status Gizi								
Kurus	0	0%	1	20,0%	3	60%	1	20%
Normal	1	1,9%	13	24,1%	34	63%	6	11%
Overweight	1	10,0%	5	50,0%	4	40%	0	0%
Riwayat DM								
Ya	0	0%	10	41,7%	12	50%	2	8,3%
Tidak	2	4,4%	9	20%	29	64,4%	5	11,1%

Tabel 3 menunjukkan distribusi kadar glukosa darah berdasarkan status gizi dan riwayat DM pada keluarga. Menurut tabel tersebut sebanyak 60% subjek dengan status gizi kurus mempunyai kadar glukosa darah puasa dalam range 81-90 mg/dl. Sejumlah 63% subjek dengan status gizi normal juga mempunyai kadar glukosa darah puasa dalam range 81-90 mg/dl. Sedangkan 50% subjek dengan status gizi overweight mempunyai kadar glukosa darah puasa dalam range 71-80 mg/dl. Distribusi frekuensi subjek yang mempunyai riwayat dan tidak mempunyai riwayat DM pada keluarga sebanyak 50% dan 64,4% kadar glukosa darah puasanya berada dalam range 81-90 mg/dl.

Hubungan Lingkar Pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah

Berdasarkan analisis *pearson* menunjukkan tidak terdapat hubungan antara lingkar pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah ($r=-0,039$, $p=0,749$).



Gambar 1. Hubungan lingkar pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah

PEMBAHASAN

Subjek penelitian ini sebanyak 69 pelajar SMA putri dengan usia 15-18 tahun. Pada penelitian ini menggunakan subjek usia remaja karena telah diketahui bahwa beberapa parameter antropometri yang diukur pada subjek lanjut usia relevansinya lebih rendah dibandingkan dengan subjek non-lansia karena dalam proses penuaan terjadi perubahan fisiologi.

Beberapa pengukuran lingkar tubuh telah diteliti kaitannya dengan diabetes. Namun hanya beberapa penelitian yang menganalisis antropometri lingkar pergelangan tangan dengan diabetes melitus. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Capizzi di Italia pada 477 anak dan remaja overweight dan obesitas menunjukkan bahwa lingkar pergelangan tangan berhubungan dengan insulin dan kadar glukosa darah.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Jahangiri di Iran dengan 6393 subjek (3677 wanita, 2716 laki-laki) menunjukkan lingkar pergelangan tangan berhubungan secara signifikan dengan kejadian diabetes melitus. Pada penelitian tersebut lingkar pergelangan tangan berhubungan dengan kadar glukosa darah puasa pada subjek laki-laki dan perempuan.⁸ Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara lingkar pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah pada remaja putri usia 15-18 tahun.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan di Italia. Tidak adanya hubungan dalam penelitian ini dapat disebabkan karena

perbedaan subjek yang digunakan. Pada penelitian Capizzi menggunakan subjek anak dan remaja dengan status gizi overweight dan obesitas. Telah diketahui bahwa status gizi obesitas menjadi faktor utama berkembangnya resistensi insulin pada anak dan remaja. Anak dan remaja dengan status gizi obesitas mempunyai sensitivitas insulin 40% lebih rendah dibandingkan dengan anak non-obesitas. Sehingga kemampuan insulin menurunkan konsentrasi glukosa darah dengan cara menstimulasi pemakaian glukosa di jaringan otot, lemak dan menekan produksi glukosa oleh hati menurun.¹³ Sedangkan pada penelitian ini sebanyak 78,3% subjek mempunyai status gizi normal. Hal tersebut yang mungkin menyebabkan kadar glukosa darah puasa subjek pada penelitian ini dalam kategori normal.

Menurut penelitian Capizzi, bagian dari lingkaran pergelangan tangan yang berkaitan dengan insulin dan kadar glukosa darah adalah jaringan tulang yang dianalisis berdasarkan hasil uji *Magnetic Resonance Imaging* (MRI).⁷ Pada penelitian tersebut dapat membedakan area dari jaringan tulang dan jaringan adiposa serta menganalisis hubungannya dengan insulin dan kadar glukosa darah. Pada penelitian ini tidak dilakukan uji MRI sehingga tidak dapat menganalisis hubungan jaringan tulang di lingkaran pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah dan tidak dapat membedakan besarnya ukuran lingkaran pergelangan tangan karena area jaringan tulang atau jaringan adiposa.

Lingkaran pergelangan tangan merupakan pengukuran antropometri *skeletal frame size* tanpa terpengaruh oleh jaringan lemak. Hubungan lingkaran pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah dijelaskan melalui peran insulin yang berkaitan dengan peningkatan massa tulang. *Insulin-like growth factor 1* (IGF-1) merupakan insulin yang bertindak sebagai faktor pertumbuhan mempunyai peran dalam aktivitas osteoblas. IGF-1 mempunyai 40% struktur asam amino yang sama dengan insulin yang berperan dalam metabolisme glukosa. Hal tersebut yang mendasari bahwa insulin menjadi penghubung antara metabolisme glukosa dan jaringan tulang.^{14,15}

Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Shao Yuan di Taiwan yang menyatakan bahwa lingkaran pergelangan tangan berhubungan dengan kadar glukosa darah pada anak-anak usia 8-12 tahun dengan

nilai $p < 0,001$.¹⁶ Tidak adanya hubungan pada penelitian ini dapat disebabkan karena jumlah subjek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shao Yuan dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 2215 dengan 1189 subjek laki-laki dan 1026 perempuan serta pada penelitian tersebut didapatkan kadar glukosa darah puasa yang bervariasi. Sedangkan pada penelitian ini hanya terdapat 69 subjek dengan kadar glukosa darah dalam kategori normal. Pengukuran lingkaran pergelangan tangan pada penelitian Shao Yuan menggunakan pita midline sama seperti penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan di Iran oleh Jahangiri pada tahun 2001 dan penelitian lanjutan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa lingkaran pergelangan tangan berhubungan dengan kadar glukosa darah puasa pada subjek laki-laki dan wanita dewasa. Menurut penelitian tersebut kejadian diabetes melitus meningkat 50% setiap 1 cm peningkatan lingkaran pergelangan tangan pada wanita. Setelah 8,8 tahun penelitian awal, cut off lingkaran pergelangan tangan yang dapat memprediksi kejadian diabetes melitus pada wanita yaitu 15.7 cm dengan sensitivitas 80,6% dan spesifisitas 53%.⁸ Namun, pada penelitian tersebut tidak diketahui jaringan dari lingkaran pergelangan tangan yang berhubungan dengan kejadian diabetes karena pengukuran lingkaran pergelangan tangan hanya menggunakan pita. Hasil penelitian Jahangiri tersebut berbeda dengan penelitian ini karena perbedaan usia subjek dengan rata-rata usia 42 tahun pada subjek wanita dan usia 44 tahun pada subjek laki-laki. Pada penelitian ini menggunakan subjek yang masih dalam masa pertumbuhan yaitu 15-18 tahun dan tidak menggunakan subjek dengan usia di atas 40 tahun karena subjek dengan usia lanjut berkaitan dengan gangguan kerja insulin dalam mencapai sel target.¹⁷

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian ini adalah pengambilan data lingkaran pergelangan tangan hanya menggunakan pita *midline* tanpa dilakukan uji menggunakan *Magnetic Resonance Imaging* sehingga tidak dapat menganalisis area jaringan tulang dan adiposa dari lingkaran pergelangan tangan. Data kadar glukosa darah yang digunakan adalah kadar glukosa darah puasa yang mengharuskan subjek

untuk puasa terlebih dahulu sebelum pengambilan darah, hasil penilaian kadar glukosa darah tersebut dipengaruhi kejujuran subjek dalam melakukan puasa sebelum pengambilan darah.

SIMPULAN

Tidak terdapat hubungan antara lingkaran pergelangan tangan dengan kadar glukosa darah pada remaja putri usia 15-18 tahun di SMA Negeri 6 Semarang.

SARAN

Perlu dilakukan analisis lingkaran pergelangan tangan menggunakan *Magnetic Resonance Imaging* agar diketahui gambaran area jaringan tulang dan adiposa dari subjek serta dapat menganalisis hubungannya dengan kadar glukosa darah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, seluruh subjek penelitian, SMA Negeri 6 Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, teman-teman, serta berbagai pihak yang telah membantu. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Binar Panunggal, S.Gz, MPH selaku pembimbing dan para *reviewer*, dr. *Enny Probosari*, M.Si.Med dan Nurmasari Widyastuti, S.Gz, M.Si.Med atas kritik dan saran yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization. Definition and Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycemia. 2006
2. Wild Sarah, Roglic Gojka, Green Anders, Sicree Richard, King Hilary. Global Prevalence of Diabetes : Estimates for the year 2000 and projections for 2030. *Diabetes care* 2004;27:1047-53
3. Departemen Kementerian Kesehatan. Penyajian Pokok-Pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2013

4. Reinehr T. Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. *World J Diabetes* 2013; 4(6): 270-81
5. Hardiman Shinta L, Bernanthus Intan Nevita, Rustatu Puspa K, Susiyanti Eva. Waist Circumference as a Predictor for Blood glucose levels in adults. *Univ Med* 2009; 28(2):77-82
6. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes. *Diabetes care* 2014 January; 37 (1): 14-80
7. Capizzi Marco, Leto Gaetano, Petrone Antonio, Zampetti Simona, Papa Raffaele Edo, Osimani Marcello, et al. Wrist circumference is a clinical marker of insulin resistance in overweight and obese children and adolescents. *J Circulation* 2011 April 11;123:1757-62
8. Noudeh Younes Jahangiri, Hadaegh, Vatankhah Nasibeh, Momenan Amir Abbas, Saadat Navid, Kha`lili Davood, et al. Wrist circumference as a novel predictor of diabetes and prediabetes: results of cross sectional and 8.8-year follow-up studies. *J Clin Endocrin Metab* 2013 February; 98(2):777-84
9. Satroasmoro Sudigdo, Ismael Sofyan. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis. Dalam : Madiyono Bambang, Mz S Moeslichan, Satroasmoro Sudigdo, Budiman I, Purwanto S Harry. Perkiraan Besar Sampel. Edisi keempat. Jakarta. Sagung Seto; 2011.p.349;17*
10. National Institute of Health (US). *Calculating Body Frame Size. Washington: 2012*
11. World Health Organization. *Growth Reference 5-19 years. Geneva: WHO, 2007*
12. *Alberti George, Zimmet Paul, kaufman Francine, et al. The IDF Consensus Definition of The Metabolic Syndrome in Children and Adolescent; 2007 October; Brussels, Belgium:IDF;2007*
13. Chiarelli Francesco, Marcovecchio Maria Loredana. Insulin resistance and obesity in childhood. *Eur J Endocrinol* 2008. 159:67-74
14. Fulzele K, Riddle RC, DiGirolamo DJ, Cao X, Wan C, Chen D, Faugere MC, Aja S, Hussain MA, Bru`ning JC, Clemens TL. Insulin receptor signaling in

- osteoblasts regulates postnatal bone acquisition and body composition. *Cell*. 2010;23:142:309 –19.
15. Ferron Mathieu, Wei Jianwen, Yoshizawa Tatsuya, Fattore Andrea Del, Depinho Ronald A, Tetti Anna, et al. Insulin Signaling in Osteoblast integrates bone remodelling and energy metabolism. *J Cell* 2010 July 23; 142:296-308
 16. Chuang Shao Yuan, Pan Wen Harn. Predictability and Implications of anthropometric indices for metabolic abnormalities in children: nutrition and health survey in Taiwan Children, 2001-2002. *Asia Pac J Clin Nutr* 2009;18(2):272-79
 17. Fulop T, Larbi A, Douziech N. Insulin Receptor and Ageing. *Pathol Biol(Paris)*. 2003;51:574–80.

HASIL UJI SPSS

Frequencies

Statistics

		Usia	Indeks Massa Tubuh	Lingkar Pergelangan Tangan	Kadar glukosa Darah
N	Valid	69	69	69	69
	Missing	0	0	0	0
Mean		16,00	20,274	14,565	83,275
Std. Deviation		,840	2,9333	,7733	6,1474
Minimum		15	15,2	13,0	66,0
Maximum		18	29,1	16,7	98,0

Frequency Table

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	21	30,4	30,4	30,4
	16	30	43,5	43,5	73,9
	17	15	21,7	21,7	95,7
	18	3	4,3	4,3	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

IMT per Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurus	5	7,2	7,2	7,2
	Normal	54	78,3	78,3	85,5
	overweight	10	14,5	14,5	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Kategori Lingkar Pergelangan Tangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kecil	38	55,1	55,1	55,1
	Sedang	18	26,1	26,1	81,2
	Besar	13	18,8	18,8	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

kadar glukosa darah puasa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 60-70 mg/dl	2	2.9	2.9	2.9
71-80 mg/dl	19	27.5	27.5	30.4
81-90 mg/dl	41	59.4	59.4	89.9
91-100 mg/dl	7	10.1	10.1	100.0
Total	69	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
IMT per Usia * kadar glukosa darah puasa	69	100.0%	0	.0%	69	100.0%

IMT per Usia * kadar glukosa darah puasa Crosstabulation

			kadar glukosa darah puasa				Total
			60-70 mg/dl	71-80 mg/dl	81-90 mg/dl	91-100 mg/dl	
IMT per Usia	Kurus	Count	0	1	3	1	5
		% within IMT per Usia	.0%	20.0%	60.0%	20.0%	100.0%
	Normal	Count	1	13	34	6	54
		% within IMT per Usia	1.9%	24.1%	63.0%	11.1%	100.0%
	Overweight	Count	1	5	4	0	10
		% within IMT per Usia	10.0%	50.0%	40.0%	.0%	100.0%
Total	Count	2	19	41	7	69	

IMT per Usia * kadar glukosa darah puasa Crosstabulation

			kadar glukosa darah puasa				Total
			60-70 mg/dl	71-80 mg/dl	81-90 mg/dl	91-100 mg/dl	
IMT per Usia	Kurus	Count	0	1	3	1	5
		% within IMT per Usia	.0%	20.0%	60.0%	20.0%	100.0%
	Normal	Count	1	13	34	6	54
		% within IMT per Usia	1.9%	24.1%	63.0%	11.1%	100.0%
	Overweight	Count	1	5	4	0	10
		% within IMT per Usia	10.0%	50.0%	40.0%	.0%	100.0%
Total	Count	2	19	41	7	69	
	% within IMT per Usia	2.9%	27.5%	59.4%	10.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	6.552 ^a	6	.364
Likelihood Ratio	6.692	6	.350
Linear-by-Linear Association	5.232	1	.022
N of Valid Cases	69		

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Riwayat Keluarga DM * kadar glukosa darah puasa	69	100.0%	0	.0%	69	100.0%

Riwayat Keluarga DM * kadar glukosa darah puasa Crosstabulation

			kadar glukosa darah puasa				Total
			60-70 mg/dl	71-80 mg/dl	81-90 mg/dl	91-100 mg/dl	
Riwayat Keluarga DM	ya	Count	0	10	12	2	24
		% within Riwayat Keluarga DM	.0%	41.7%	50.0%	8.3%	100.0%
	tidak	Count	2	9	29	5	45
		% within Riwayat Keluarga DM	4.4%	20.0%	64.4%	11.1%	100.0%
Total		Count	2	19	41	7	69
		% within Riwayat Keluarga DM	2.9%	27.5%	59.4%	10.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	4.404 ^a	3	.221
Likelihood Ratio	4.926	3	.177
Linear-by-Linear Association	.850	1	.356
N of Valid Cases	69		

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70.

* This is a lower bound of the true significance.

a Lilliefors Significance Correction

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
IMT	69	100.0%	0	.0%	69	100.0%
Lingkar Pergelangan Tangan	69	100.0%	0	.0%	69	100.0%
GDP	69	100.0%	0	.0%	69	100.0%
Usia	69	100.0%	0	.0%	69	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
IMT	Mean	20.2736	.35313
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	19.5690	
	Upper Bound	20.9783	
	5% Trimmed Mean	20.1040	
	Median	19.7700	
	Variance	8.604	
	Std. Deviation	2.93332	
	Minimum	15.19	
	Maximum	29.07	
	Range	13.88	
	Interquartile Range	3.23	
	Skewness	.896	.289
	Kurtosis	.973	.570
Lingkar Pergelangan Tangan	Mean	14.5652	.09309
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	14.3795	
	Upper Bound	14.7510	
	5% Trimmed Mean	14.5643	
Median	14.6000		

	Variance		.598	
	Std. Deviation		.77329	
	Minimum		13.00	
	Maximum		16.67	
	Range		3.67	
	Interquartile Range		1.00	
	Skewness		.025	.289
	Kurtosis		-.061	.570
GDP	Mean		83.2754	.74006
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	81.7986	
		Upper Bound	84.7521	
	5% Trimmed Mean		83.4332	
	Median		83.0000	
	Variance		37.791	
	Std. Deviation		6.14741	
	Minimum		66.00	
	Maximum		98.00	
	Range		32.00	
	Interquartile Range		8.00	
	Skewness		-.382	.289
	Kurtosis		.150	.570
Usia	Mean		16.00	.101
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	15.80	
		Upper Bound	16.20	
	5% Trimmed Mean		15.95	
	Median		16.00	
	Variance		.706	
	Std. Deviation		.840	
	Minimum		15	
	Maximum		18	
	Range		3	
	Interquartile Range		2	

Skewness	.460	.289
Kurtosis	-.429	.570

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
IMT	.096	69	.190	.948	69	.006
Lingkar Pergelangan Tangan	.090	69	.200*	.981	69	.389
GDP	.091	69	.200*	.984	69	.533
Usia	.239	69	.000	.847	69	.000

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Correlations

		Lingkar Pergelangan Tangan	GDP
Lingkar Pergelangan Tangan	Pearson Correlation	1	-.039
	Sig. (2-tailed)		.749
	N	69	69
GDP	Pearson Correlation	-.039	1
	Sig. (2-tailed)	.749	
	N	69	69