

## **BAB VII**

### **SIMPULAN DAN HASIL**

#### **7.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna terhadap pembesaran gingiva antara penderita hipertensi yang menggunakan kaptopril dengan yang tidak menggunakan kaptopril.
2. Terdapat perbedaan yang bermakna terhadap laju aliran saliva tampung 1 menit antara penderita hipertensi yang menggunakan kaptopril dengan yang tidak menggunakan kaptopril.

#### **7.2 Saran**

Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, yaitu dengan meneliti lama penggunaan kaptopril terhadap pembesaran gingiva serta penurunan laju aliran saliva untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lama penggunaan kaptopril terhadap pembesaran gingiva serta penurunan laju aliran saliva. Selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan variabel lain yang juga merupakan penyebab pembesaran gingiva dan penurunan laju aliran saliva, misalnya usia, jenis kelamin, merokok, penggunaan alat ortodonti atau prostetis serta jenis obat yang dikonsumsi seperti fenitoin, siklosporin, *calcium channel blocker*, antidepresan trisiklik, antihistamin, obat anti parkinson dan anti kejang.