

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Karakteristik ibu bersalin dengan infeksi HIV terhadap luaran maternal didapatkan hasil yaitu 80.4% tidak mengalami ketuban pecah dini sedangkan 19.6% mengalami ketuban pecah dini, 91.3% tidak mengalami prematuritas sedangkan 8.7% mengalami prematuritas, 91.3% melakukan persalinan dengan cara seksio sesarea sedangkan 8.7% mengalami persalinan dengan cara pervaginam dan semua ibu bersalin dengan infeksi HIV tidak ada yang mengalami perdarahan post partum, infeksi nifas dan kematian maternal. Karakteristik ibu bersalin dengan infeksi HIV terhadap luaran neonatal didapatkan hasil yaitu 78.3% mempunyai berat badan normal sedangkan 21.7% mengalami berat badan lahir rendah, semua bayi tidak ada yang mengalami asfiksia neonatal dan kematian neonatal.
2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah sel CD4 ibu bersalin dengan infeksi HIV terhadap luaran maternal.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah sel CD4 ibu bersalin dengan infeksi HIV terhadap luaran neonatal.

4. Jumlah persalinan pasien dengan infeksi HIV di RSUP Dr. Kariadi Semarang pada tahun 2012 – 2014 didapatkan 12 orang ibu pada tahun 2012, 22 orang ibu pada tahun 2013 dan 12 orang ibu pada tahun 2014.

7.2 Saran

7.2.1 Bagi pelayanan kesehatan

Bagi petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sel CD4 kepada semua ibu yang mempunyai riwayat HIV dan melakukan pemeriksaan jumlah sel CD4 pada ibu hamil yang akan bersalin yang mempunyai riwayat HIV di RSUP Dr. Kariadi Semarang agar memiliki data yang lengkap. Penyimpanan catatan medis di ruang rekam medis pun diharapkan dapat disimpan lebih baik agar tidak ada yang hilang dan dalam pengkodean nomor catatan medis lebih spesifik agar tidak ada lagi kesalahan pemberian koding.

7.2.2 Bagi masyarakat

Bagi para ibu dan keluarga sebaiknya lebih memperhatikan keadaan kesehatan diri sendiri terhadap penyakit yang diderita, melakukan skrining HIV dan memperhatikan kehamilan dengan rutin memeriksakan kehamilan minimal 4 kali, jika sudah terdiagnosis HIV diharapkan ibu dapat mengkonsumsi obat antiretroviral secara rutin dan juga dibutuhkan peran keluarga untuk selalu mendukung, menjaga dan memberikan perhatian lebih pada ibu hamil dengan infeksi HIV.

7.2.3 Bagi penelitian

Untuk penelitian selanjutnya variabel yang dianalisis diperluas lagi tidak hanya jumlah sel CD4. Tempat penelitian dapat dilakukan tidak hanya di satu rumah sakit tetapi di beberapa rumah sakit dalam suatu wilayah. Desain penelitian selanjutnya diharapkan memakai desain kohort.