

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penderita TBEP yang dirawat inap di Bangsal Penyakit Dalam RSUP Dr.Kariadi lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 18-28 tahun. Lokasi terbanyak infeksi TBEP pada TB pleuritis. Gejala klinis terbanyak penderita TBEP berupa batuk, demam, dan nyeri. Tanda klinis TB pleuritis terbanyak pada sesak nafas.

Diagnosis TBEP terbanyak pada pemeriksaan radiologi yang berupa foto toraks dengan gambaran infiltrat paru. Komplikasi penyakit yang terjadi pada TB pleuritis berupa fibrosis. Lama rawat inap penderita TBEP terbanyak pada lama rawat inap > 2 minggu dan hasil pengobatan lebih banyak dinyatakan adanya perbaikan dan pulang.

7.2 Saran

1. Perlunya kelengkapan catatan medik baik dalam anamnesis pasien mengenai gejala dan tanda klinis pasien dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan biopsi dan mikrobiologi.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyakit TBEP di RSUP Dr. Kariadi Semarang di tahun kedepannya khususnya di bidang Penyakit Dalam agar lebih mengetahui prevalensi perjalanan penyakit TBEP