

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 SIMPULAN

1. Prevalensi dispepsia fungsional pada remaja awal di Semarang sebesar 2,4%
2. Prevalensi ansietas pada remaja awal di Semarang sebesar 41,9%
3. Prevalensi depresi pada remaja awal di Semarang sebesar 5,2%
4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dispepsia fungsional dengan ansietas dan depresi
 - a. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dispepsia fungsional dengan ansietas
 - b. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dispepsia fungsional dengan depresi
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara mual dengan depresi

7.1 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah subyek penelitian yang lebih besar.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara wawancara untuk mendapatkan data dari subyek penelitian.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas edukasi mengenai tata cara pengisian kuesioner