

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Peresepan *spironolactone* kepada pasien gagal jantung yang dirawat inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Januari - Maret 2014 yang sesuai kriteria inklusi penelitian ini sebesar 76,6% dan yang tidak mendapat sebesar 23,4%.
2. Jumlah pasien gagal jantung yang dirawat inap periode Januari - Desember 2014 adalah sebesar 1.284 pasien
3. Prevalensi pasien gagal jantung yang dirawat inap berdasar jenis kelamin hampir sama. Berdasarkan usia paling tinggi pada kelompok usia dewasa, diikuti usia tua, dan remaja.
4. Persentase peresepan jenis obat gagal jantung lain cukup variatif dimana yang paling tinggi furosemid dan terendah propanolol, irbesartan dan dobutamin.

7.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan data rekam medik yang dicatat karena bias dari hasil pencatatan rekam medik cukup besar.
2. Seluruh pemeriksaan penunjang yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dengan baik dan benar, bila memungkinkan dirangkap lebih dari satu.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan hingga ke rawat jalan agar didapatkan data peresepan obat yang lebih sesuai kondisi sebenarnya dan lebih menggambarkan keadaan pasien gagal jantung secara menyeluruh.