

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1. Simpulan

- 7.1.1. DDD/100 pasien hari pada kasus bedah digestif sebelum pembuatan PPAB adalah 13,13 dan setelah pembuatan PPAB adalah 11,18
- 7.1.2. DDD/100 pasien hari antibiotik profilaksis pada kasus bedah digestif sebelum pembuatan PPAB lebih tinggi dibandingkan dengan setelah pembuatan PPAB
- 7.1.3. DDD/100 pasien hari pada kasus bedah digestif sebelum pembuatan PPAB adalah 35,38 dan setelah pembuatan PPAB adalah 51,13
- 7.1.4. DDD/100 pasien hari pada kasus bedah digestif sebelum pembuatan PPAB lebih rendah dibandingkan dengan setelah pembuatan PPAB.

7.2. Saran

- 7.2.1. Edukasi kepada calon tenaga medis sejak dari pembelajaran awal
- 7.2.2. Dibutuhkan sosialisasi PPAB dan pelatihan tenaga medis mengenai pencegahan resistensi antibiotik.
- 7.2.3. Untuk peneliti selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut kuantitas penggunaan antibiotik setelah sosialisasi
- 7.2.4. Untuk peneliti selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut kuantitas penggunaan antibiotik sejak saat hari dimana operasi berlangsung