

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Efek analgetik ketorolak lebih kecil jika dibandingkan dengan morfin dilihat dengan nilai VAS yang lebih tinggi pada kelompok diberikan ketorolak.
2. Pada skor VAS dengan pemberian morfin berada pada kisaran 0 sampai 4 dengan hasil statistik pada jam ke-0 yaitu $0,25 \pm 0,532$, pada jam ke-6 yaitu $1,79 \pm 1,444$, pada jam ke-12 yaitu $1,75 \pm 1,511$ dan pada jam ke -24 yaitu $1,25 \pm 1,113$.
3. Pada skor VAS dengan pemberian ketorolak berada pada kisaran 0 sampai 6 dengan hasil statistik pada jam ke-0 yaitu $0,83 \pm 0,637$, jam ke-6 yaitu $3,29 \pm 1,805$, jam ke-12 yaitu $3,67 \pm 1,129$ dan pada jam ke-24 yaitu $2,92 \pm 1,213$.
4. Perbandingan skor VAS pada uji beda morfin dan ketorolak didapatkan $p=0,001$ pada jam ke-0, $p=0,006$ pada jam ke-6, $p=0,000$ pada jam ke-12 dan $p=0,000$, terdapat perbedaan bermakna(signifikan) $p<0,05$ pada penelitian ini.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemilihan obat analgetik secara tepat diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada pasien dengan status

ASA III dan IV dengan jenis operasi yang berbeda. Pengambilan data juga lebih detail dan rinci dengan waktu pemantauan yang lebih lama.