

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Terdapat perbedaan yang bermakna antara keterlibatan organ ginjal pada pasien leptospirosis ikterik 98,3% dengan pasien leptospirosis anikterik 73,1%.
2. Terdapat perbedaan yang bermakna antara keterlibatan organ hepar pada pasien leptospirosis ikterik 100% dengan pasien leptospirosis anikterik 76,9%.
3. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara keterlibatan organ jantung pada pasien leptospirosis ikterik 32,8% dengan pasien leptospirosis anikterik 23,1%.
4. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara keterlibatan organ paru pada pasien leptospirosis ikterik 32,8% dengan pasien leptospirosis anikterik 23,1%.
5. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara keterlibatan hematologi pada pasien leptospirosis ikterik 74,1% dengan pasien leptospirosis anikterik 53,8%.
6. Pada penelitian ini, pembagian pasien ikterik dan anikterik tidak dapat digunakan sebagai penentu berat ringannya penyakit leptospirosis

7.2 Saran

Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk menentukan kriteria yang lebih tepat dalam membedakan leptospirosis berat dengan leptospirosis ringan.