

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

- ✓ Hampir keseluruhan ibu memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang ISPA sebesar 85,2 %, sedangkan sisanya memiliki tingkat pengetahuan tinggi (14,8%).
- ✓ Sebagian besar ibu masih kurang baik dalam melakukan pengelolaan awal ISPA pada anak sebanyak 56,5%, sedangkan sisanya telah melakukan pengelolaan dengan baik.
- ✓ Sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan ibu yang rendah sebesar 68,5% , sedangkan sisanya memiliki tingkat pendidikan ibu yang tinggi.
- ✓ Sebagian besar responden memiliki tingkat penghasilan keluarga kurang sebanyak 77,9%, sedangkan sisanya memiliki tingkat penghasilan keluarga yang cukup.
- ✓ Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu dengan pengelolaan awal ISPA pada anak.
- ✓ Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu dengan pengelolaan awal ISPA pada anak.
- ✓ Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat penghasilan keluarga dengan pengelolaan awal ISPA pada anak.

7.2 Saran

A. Bagi Masyarakat

Pengetahuan menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan suatu tindakan pengelolaan. Dengan demikian, anggota keluarga khususnya Ibu bisa lebih proaktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang ISPA supaya dapat melakukan pengelolaan ISPA yang tepat untuk anak.

B. Bagi Akademik

Diharapkan kepada institusi pendidikan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan referensi mengenai ISPA dan cara pengelolaannya.

C. Bagi Pelayanan Kesehatan

Diperlukan adanya penyusunan kegiatan dalam rangka memberikan edukasi atau penyuluhan kesehatan mengenai ISPA mengingat bahwa wilayah kerja Puskesmas Rowosari merupakan daerah dengan tingkat kejadian ISPA yang tinggi. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang ISPA sehingga dapat melakukan pengelolaan yang baik dan turut aktif dalam menurunkan angka kejadian ISPA yang merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak.

D. Bagi penelitian selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut pada populasi umum dengan sampel yang lebih besar. Selain itu dapat dilakukan juga penelitian untuk mengetahui perbandingan antara pengelolaan awal ISPA pada anak di daerah perkotaan dengan daerah pinggir kota. Melengkapi karakteristik responden, sepertinya menambahkan usia ibu.