

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Distribusi usia penderita gagal jantung kongestif adalah 15 – 34 tahun sebanyak 6 penderita, 35 – 54 tahun sebanyak 23 penderita, 55 – 74 tahun sebanyak 52 penderita, dan >75 tahun sebanyak 7 penderita.
2. Distribusi jenis kelamin penderita gagal jantung kongestif adalah laki-laki sebanyak 54 penderita, dan perempuan sebanyak 34 penderita.
3. Terdapat hubungan antara kejadian efusi pleura pada penderita gagal jantung kongestif.

6.2 Saran

1. Perlu diadakannya pemeriksaan lebih lanjut pada penderita gagal jantung kongestif yang mengalami efusi pleura.
2. Perlu diadakan perbaikan catatan medik, baik catatan anamnesis, diagnosis, maupun terapi yang diberikan agar dapat memudahkan dalam penelitian selanjutnya.
3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang gagal jantung kongestif di RSUP Dr. Kariadi Semarang di masa yang akan datang khususnya di bidang ilmu penyakit jantung dan kardiovaskuler dengan waktu yang lebih lama.
4. Bagi peneliti selanjutnya perlu penelitian sejenis dengan besar sampel yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih optimal dan reliabel.

5. Saran lain bagi penelitian selanjutnya, hendaknya memakai rancangan penelitian yang lebih bagus kekuatan korelasinya daripada *cross sectional* sehingga hasil yang diperoleh lebih valid, misalnya dengan rancangan penelitian *cohort* atau *case control*.