

HUBUNGAN POLA ASUH ANAK DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI (0-12 BULAN) DI KELURAHAN SABDODADI KECAMATAN BANTUL

(2005 - Skripsi)

Oleh: DARI SETIYAWATININGSIH -- E2A303044

Diare masih merupakan problem kesehatan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia, karena angka kesakitan dan kematiannya masih tinggi. Diperkirakan 80 % kematian akibat diare terjadi pada anak dua tahun pertama kehidupannya. Sekitar 40 - 60 % diare pada bayi disebabkan oleh rotavirus yang disebarkan melalui *fecal oral* terutama oleh makanan yang tercemar, dan juga bayi dengan gangguan gizi, perawatan/perilaku yang kurang sehat serta *personal hygiene* kurang (pola asuh anak). Di Kabupaten Bantul diare masih menduduki peringkat ketiga (9,4 %) sebagai penyebab kematian bayi dan balita. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pola asuh anak dengan kejadian diare pada bayi (0-12 bulan) di Kelurahan Sabdodadi, Bantul. Jenis penelitian ini adalah penelitian *survey* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi adalah semua bayi umur (0-12 bulan) yang ada diwilayah Kelurahan Sabdodadi dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebesar 85 sampel. Uji statistik menggunakan analisis *bivariat chi-square test*, taraf signifikan 95%, dan untuk mengetahui keeratan hubungan menggunakan koefisien kontingensi. Hasil penelitian diperoleh karakteristik ibu berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar SLTA (50,6%), status tidak bekerja dan pendapatan lebih besar dari Rp. 385.000 (71,8%). Karakteristik bayi diketahui jenis kelamin sebagian besar perempuan (55,3%), umur kurang dari 9 bulan (58,8 %) dan status gizi baik (90,6 %). Pola asuh makan sebagian besar baik (55,3 %), pola perawatan dasar anak masih kurang (57,6 %) dan *personal hygiene* baik (51,8 %). Persentase kejadian diare sebesar 44,7 %. Dari uji statistik terbukti ada hubungan yang bermakna pola asuh makan dengan kejadian diare pada bayi ($p=0,001$ $C=0,365$). Ada hubungan yang bermakna pola perawatan dasar dengan kejadian diare pada bayi ($p=0,001$ $C=0,361$). Ada hubungan yang bermakna yang bermakna *personal hygiene* dengan kejadian diare pada bayi ($p=0,000$ $C=0,484$). Dari hasil penelitian disarankan bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan khususnya bagi ibu yang mempunyai bayi tentang diare, penyebab dan penanggulangannya, serta untuk masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan pola asuh anak dan perilaku hidup sehat.

Kata Kunci: Diare, pola asuh, bayi (0-12 bulan)

RELATIONSHIP BETWEEN INFANT CARING PATTERN AND THE OCCURENCE OF DIARRHOEA ON INFANT (0-12 MONTHS)IN SABDODADI VILLAGE, BANTUL

Abstract

In developing country, diarrhoea is of major health problem including Indonesia, therefore the percentage of morbidity and mortality caused by diarrhoea is quite high. The data indicate that 80 % of mortality on infant is occurrence due to diarrhoea on the age of two years old. The occurrence of diarrhoea on infant, around 40-60 % usually caused by rotavirus through fecal-oral especially by food contamination, to lack of nutrition, the less than of health behaviour and also personal hygiene. In the province of Bantul, these cases going up third level (9,4 %) caused mortality on infant and child by diarrhoea.

The purpose of this research is to find out the relationship berteen infant caring pattern and the occurrence of diarhoea on infant (0-12 month) in Sabdodadi village, Bantul. This research used survey method with cross sectional approachment. The population and sample of this research is all age on infant (0-12 months) exist in region Sabdodadi village with inclusion criterion that is 85 sample. The result indicate thet : the parent's education up to senior hihg school (50,65 %), the mother who doesn't have job (68,2), the average personal income monthly on every family is about Rp. 385,000, the age of female infant less than 9 month(58,8 %). This analisys data used bivariat chi-square test with the level of significance 95 %. The result of this research showing that there is relationship between low quality food that given parent and the occurrence of diarrhoea ($p=0,001$ $C=0,365$), relationship between infant caring pattern and the occurance of diarrhoea ($p=0,001$ $C=0,361$) and also relationship between personal hygiene and the occurrence of diarrhoea ($p=0,000$ $C=0,484$). The result of this research suggested to health officer to increase counselling and to give more information about diarrhoea especially for the mothe to pay more attention personal hygiene and the way to look after the baby and also to increase for health behavior and sanitation

Keyword : Diarrhoea, infant caring pattern, 0-12 months