

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Derajat fibrosis hepar pada tikus wistar yg dilakukan ligasi duktus koledokus pada kelompok kombinasi UDCA-Glutathione lebih rendah secara bermakna dibandingkan dengan kontrol.
2. Derajat fibrosis hepar pada tikus wistar yg dilakukan ligasi duktus koledokus pada kelompok terapi tunggal UDCA tidak didapatkan perubahan yang bermakna dibandingkan dengan kontrol.
3. Derajat fibrosis hepar pada tikus wistar yg dilakukan ligasi duktus koledokus pada kelompok kombinasi UDCA-Glutathione lebih rendah secara bermakna dibandingkan dengan kelompok terapi UDCA tunggal.

6.2 Saran

1. Perlu diadakan penelitian lanjut dengan menambahkan kelompok perlakuan terapi glutathione tunggal untuk dinilai obat manakah yang memiliki efektifitas tertinggi.
2. Perlu diadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan dosis yang lebih bervariasi, sampel yang lebih banyak serta waktu yang lebih panjang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian lebih lanjut mengenai tatalaksana kolestasis.