

BEBERAPA FAKTOR RISIKO KANKER SERVIKS UTERI (Studi Pada Penderita Kanker Serviks Uteri Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang Pada Bulan Agustus-September 2004)

(2004 - Skripsi)

Oleh: KHASBIYAH -- E2A000043

Kanker serviks uteri adalah tumor ganas primer yang berasal dari sel epitel skuamosa. Sebelum terjadinya kanker, akan didahului oleh keadaan yang disebut lesi prakanker atau *neoplasia intraepitel serviks (NIS)*. Sebagian besar penderita kanker serviks uteri datang berobat pada stadium lanjut, karena pada stadium awal penyakit ini tidak menimbulkan gejala. Kanker ini merupakan penyebab kematian utama kanker pada wanita di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor risiko kejadian kanker serviks uteri. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan desain kasus kontrol, pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan komputer. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Dokter Kariadi (RSDK) Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 100 yang terbagi menjadi sampel kelompok kasus dan sampel kelompok kontrol. Data analisis dilakukan dengan *uji Chi Square* pada $\alpha=0,05$ dan odds ratio. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar penderita kanker serviks uteri berpendidikan tamat SD (28%), dengan paritas ≥ 3 (52%). Kebanyakan penderita melakukan hubungan seksual yang pertama kali pada umur dibawah 20 tahun (74%) dengan satu pasangan seksual (82%). Setelah mengendalikan faktor perancu yakni umur dan tingkat pendidikan didapatkan hasil statistik bahwa ada hubungan yang bermakna antara paritas ($p=0,000018$, $OR=8,11$) dan umur pertama kali melakukan hubungan seksual ($p=0,00858$, $OR=5,85$) dengan kejadian kanker serviks uteri. Sedangkan pada variabel jumlah pasangan seksual, penggunaan alat kontrasepsi oral, dan sirkumsisi pasangan seksual gagal memperlihatkan hubungan karena didapatkan nilai $p>0,05$. Mempunyai paritas tidak lebih dari 3 dan melakukan hubungan seksual yang pertama kali pada umur di atas 20 tahun adalah salah satu upaya untuk mengurangi risiko kejadian kanker serviks uteri

Kata Kunci: Faktor risiko, Kanker serviks uteri.

*SEVERAL RISK FACTORS OF CERVICAL CANCER (Studi On Cervical Cancer Patients In
?Dokter Kariadi? Hospital Semarang August-September 2004)*

Abstract

Cervical cancer is primary cancer comes from squamosa epitel cell. Before it occurs, Neoplasia Epitel Cervix (NEC) or Precancer Lesion would come first. Indonesia, most of its sufferers come for treatment at prolonged stadium. Because its simptoms don't show at early stadium.

The aim of this research was to know several risk factors of cervical cancer. This was an analytic research with case control design. Data collected from secondary data of medical record by questionair then processed by epi info program version 6. The research was done at ?Dokter Kariadi? Hospital (RSDK) with 100 samples which were devided into sample of case and sample of control. Data was analyzed by Chi Square test at $\alpha=0,05$ and odds ratio.

The result showed that most of cervical cancer patients were elementary shcool graduated (28%) with parity ≥ 3 (52%). Most of the patients had their first intercourse under 20 years (74%) with one sexual partner (82%).

After controlling the counfounding factor were age education stage, the statistic result that there is sygnificancy correlation between parity ($p=0,000018$, $OR=8,11$) and age of first intercourse ($p=0,00858$, $OR=5,85$) with cervical cancer incidence. Whereas the variable of amount of sexual partner, oral contraception usage and sexual partner circumcision of this research were fail to show correlation because p value $\geq 0,05$.

Having less than 3 parity and do first intercourse above 20 years are way to reduce cervical cancer risk.

Keyword : Risk factor, Cervical cancer.