

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Tidak ada hubungan yang signifikan antara frekuensi merokok dengan derajat keparahan akne vulgaris pada mahasiswa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dilakukan saran sebagai berikut

1. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan rancangan *cross sectional*, jumlah sampel yang lebih banyak dan mengetahui dengan pasti hubungan antara frekuensi merokok terhadap kejadian akne vulgaris.
2. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan lamanya merokok, jumlah batang rokok dan jenis rokok terhadap kejadian akne vulgaris.
3. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap hubungan frekuensi merokok dengan kejadian akne vulgaris, sebaiknya subjek penelitian perokok dapat dilakukan pada laki-laki dan perempuan.

4. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh usia terhadap hubungan frekuensi merokok dengan kejadian akne vulgaris, sebaiknya dilakukan berbagai kalangan usia, tidak hanya usia muda.
5. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas hidup terhadap hubungan frekuensi merokok dengan kejadian akne vulgaris.